

# Álgebra II

## Relaciones de Ejercicios

FACULTAD  
DE  
CIENCIAS  
UNIVERSIDAD DE GRANADA



Los Del DGIIM, [losdeldgiim.github.io](https://losdeldgiim.github.io)

Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas  
Universidad de Granada



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0).

Eres libre de compartir y redistribuir el contenido de esta obra en cualquier medio o formato, siempre y cuando des el crédito adecuado a los autores originales y no persigas fines comerciales.

# Álgebra II Relaciones de Ejercicios

Los Del DGIIM, [losdeldgiim.github.io](https://losdeldgiim.github.io)

Arturo Olivares Martos

Granada, 2025



# Índice general

<b>1. Relaciones de Ejercicios</b>	<b>5</b>
1.1. Combinatoria y Teoría de Grafos . . . . .	5
1.2. Grupos: generalidades y ejemplos . . . . .	51
1.3. Subgrupos, Generadores, Retículos y Grupos cíclicos . . . . .	75
1.4. Grupos cociente. Teoremas de isomorfismo. Productos . . . . .	98
1.5. Grupos resolubles . . . . .	127
1.6. $G$ -conjuntos y $p$ -grupos . . . . .	143
1.7. Clasificación de grupos abelianos finitos . . . . .	149



# 1. Relaciones de Ejercicios

## 1.1. Combinatoria y Teoría de Grafos

**Ejercicio 1.1.1.** Diez personas están sentadas alrededor de una mesa circular. Cada persona estrecha la mano a todos los demás excepto a la persona sentada directamente enfrente de la mesa. Dibuja un grafo que modele la situación.

La situación se puede modelar con el grafo de la Figura 1.1.  
Su matriz de adyacencia es:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

**Ejercicio 1.1.2.** Seis hermanos (Alonso, Bernardo, Carlos, Daniel, Enrique y Fernando) tienen que emparejarse para compartir habitación en el próximo curso escolar. Cada uno de ellos ha elaborado una lista con los nombres de aquellos con los que quiere emparejarse:

- Lista de Alonso: Daniel.
- Lista de Bernardo: Alonso, Enrique.
- Lista de Carlos: Daniel, Enrique.
- Lista de Daniel: Carlos.
- Lista de Enrique: Daniel, Bernardo, Fernando.
- Lista de Fernando: Alonso, Bernardo.

Dibuja el grafo dirigido que modela esta situación.

La situación se puede modelar con el grafo de la Figura 1.2, donde cada persona viene representada con un vértice con su inicial.




Figura 1.1: Situación del Ejercicio 1.1.1.




Figura 1.2: Situación del Ejercicio 1.1.2.




Figura 1.3: Grafos para el ejercicio 1.1.3.




Figura 1.4: Grafo  $K_4$ .

**Ejercicio 1.1.3.** Expresa en forma matricial los grafos de la Figura 1.3.

La matriz de adyacencia del grafo 1.3a es:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

La matriz de adyacencia del grafo 1.3b es:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

**Ejercicio 1.1.4.** Sea  $G$  un grafo completo con cuatro vértices. Construye todos sus subgrafos salvo isomorfismo.

El grafo completo con cuatro vértices es  $K_4$ , representado en la Figura 1.4.

Para evitar pérdida de subgrafos, sabiendo que  $K_4$  tiene 4 vértices, se pueden construir los siguientes subgrafos:

- No consideramos los subgrafos con 0 vértices.
- Tan solo hay un subgrafo con un vértice.



Figura 1.5: Subgrafos de  $K_4$  con 2 vértices,  $|V| = 2$ .




Figura 1.6: Subgrafos de  $K_4$  con 3 vértices,  $|V| = 3$ .

- Los subgrafos con dos vértices se encuentran en la Figura 1.5.
- Los subgrafos con tres vértices se encuentran en la Figura 1.6.
- Los subgrafos con cuatro vértices se encuentran en la Figura 1.7.

**Ejercicio 1.1.5.** ¿Son isomorfos los grafos de la Figura 1.8? ¿Y los de la Figura 1.9? ¿Y los de la Figura 1.10?

Veamos que los grafos de la Figura 1.8 son isomorfos. Sea  $G(V, E)$  el grafo 1.8a y  $G'(V', E')$  el grafo 1.8b. Las biyecciones  $h_E : E \rightarrow E'$  y  $h_V : V \rightarrow V'$  vienen dadas por:

$$\begin{aligned}
 h_V : V &\rightarrow V' \\
 A &\mapsto A \\
 B &\mapsto B \\
 C &\mapsto D \\
 D &\mapsto C \\
 E &\mapsto E
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 h_E : E &\rightarrow E' \\
 e = \{u, v\} &\mapsto e' = \{h_V(u), h_V(v)\}
 \end{aligned}$$






Figura 1.7: Subgrafos de  $K_4$  con 4 vértices,  $|V| = 4$ .




(a) Grafo 1.8a.




(b) Grafo 1.8b.

Figura 1.8: Primer par de grafos para el ejercicio 1.1.5.



(a) Grafo 1.9a.




(b) Grafo 1.9b.

Figura 1.9: Segundo par de grafos para el ejercicio 1.1.5.


Respecto al par de grafos de la Figura 1.9, sabemos que no son isomorfos puesto que no tienen la misma sucesión de grafos; pues notando por  $G(E, V)$  al grafo 1.9a y  $G'(E', V')$  al grafo 1.9b, se tiene que:

$$D_4(G) = 2 \neq 1 = D_4(G')$$

Por último, veamos que los grafos de la Figura 1.10 son isomorfos. Sea  $G(V, E)$  el grafo 1.10a y  $G'(V', E')$  el grafo 1.10b. Las biyecciones  $h_E : E \rightarrow E'$  y  $h_V : V \rightarrow V'$



(a) Grafo 1.10a.



(b) Grafo 1.10b.

Figura 1.10: Tercer par de grafos para el ejercicio 1.1.5.

vienen dadas por:

$$\begin{aligned}
 h_V : V &\rightarrow V' \\
 A &\mapsto A \\
 B &\mapsto D \\
 C &\mapsto C \\
 D &\mapsto B \\
 E &\mapsto E \\
 F &\mapsto F
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 h_E : E &\longrightarrow E' \\
 e = \{u, v\} &\longmapsto e' = \{h_V(u), h_V(v)\}
 \end{aligned}$$

**Ejercicio 1.1.6.** Demostrar que, en cualquier grafo, el número de vértices de grado impar es par. (Así, en un grupo de personas, el número total de personas que estrechan la mano de un número impar de otras personas es siempre par).

Sea el grafo  $G(V, E)$  con  $V$  el conjunto de vértices y  $E$  el conjunto de aristas. Sea  $I$  el conjunto de vértices de grado impar:

$$I = \{v \in V \mid \deg(v) \text{ es impar}\}.$$

Usamos ahora el Lema de Apretón de Manos, descomponiendo  $V$  en dos conjuntos disjuntos,  $I$  y su complemento  $\bar{I}$ :

$$\sum_{v \in V} \deg(v) = \sum_{v \in I} \deg(v) + \sum_{v \notin I} \deg(v) = 2|E| \implies \sum_{v \in I} \deg(v) = 2|E| - \sum_{v \notin I} \deg(v).$$

Por tanto, como  $2|E|$  es par, y la suma y resta de números pares es par, tenemos que:

$$\sum_{v \in I} \deg(v) \text{ es par}$$

Por la definición de  $I$ , sabemos que dicha sumatoria es una suma de números impares cuya suma es par. Por tanto, como la suma de dos números impares es par, y la suma de un número par y un número impar es impar, tenemos que la cantidad de elementos en  $I$  ha de ser par.

$$|I| \text{ es par}$$

**Ejercicio 1.1.7.** Demostrar que si cada vértice de un grafo  $G$  es de grado 2, cada componente conexa de  $G$  es un ciclo.

Fijada una componente conexa del grafo  $G$ , seleccionamos un vértice suyo fijo, sea este  $v_0$ . Como  $\deg v_0 = 2$ , este tendrá dos vértices adyacentes, por lo que seleccionamos uno de ellos; sea este  $v_1$ . Como  $\deg v_1 = 2$ , entonces también tendrá dos vecinos, pero uno de ellos ya lo hemos visitado ( $v_0$ ), por lo que seleccionamos el otro vecino; sea este  $v_3$ .

Repitiendo dicho algoritmo seleccionando vértices que no hayamos seleccionado, eventualmente llegaremos a  $v_0$  (ya que en caso contrario  $V$  no sería finito). Por tanto, habríamos construido un ciclo. Además, como la elección está fijada y se trata de una componente conexa, habremos recorrido todos los vértices de la componente conexa luego, efectivamente, la componente conexa es un ciclo.




Figura 1.11: Grafo para el ejercicio 1.1.8.

**Ejercicio 1.1.8.** Los siguientes hechos se conocen de las personas A, B, C, D, E, F, G:

- A habla inglés.
- B habla inglés y español.
- C habla inglés, italiano y ruso.
- D habla japonés y español.
- E habla alemán e italiano.
- F habla francés, japonés y ruso.
- G habla francés y alemán.

Demostrar que cada par de personas entre estas siete puede comunicarse (con la ayuda de intérpretes, si es necesario, tomados de los cinco restantes).

Construiremos un grafo, en el que dos personas están conectadas por una arista si hablan el mismo idioma. Dicho grafo es el de la Figura 1.11. Como se trata de un grafo conexo, dada una persona  $p$ , podemos llegar a cualquier otra persona  $q$  mediante un camino simple (que representan los intérpretes). Por tanto, cada par de personas puede comunicarse.

**Ejercicio 1.1.9.** Demuestra que en todo grafo con más de un vértice existen dos vértices con el mismo grado.

Supongamos un grafo  $G(V, E)$  con  $|V| > 1$ . Como hay  $|V|$  vértices, el grado máximo posible es  $|V| - 1$  (que representaría que dicho vértice está conectado con todos los demás). Por tanto, los posibles grados son:

$$0, 1, 2, \dots, |V| - 1.$$

No obstante, veamos que no todos son posibles; ya que si hay un vértice de grado 0, entonces no puede haber vértices de grado  $|V| - 1$  (pues dichos vértices no podrían estar conectados con el vértice de grado 0). Por tanto, hay  $|V|$  vértices y el número de grados posibles es menor que  $|V|$ ; por lo que, por el principio del palomar, hay al menos dos vértices con el mismo grado.

**Ejercicio 1.1.10.** Prueba que si un grafo  $G$  contiene solo dos vértices de grado impar entonces ambos han de encontrarse en la misma componente conexa.

Por reducción al absurdo, supongamos que los dos vértices de grado impar se encuentran en componentes conexas distintas; y consideramos  $G'(V', E')$  la componente conexa que contiene a uno de ellos (sin pérdida de generalidad, sea  $v_1$ ) y  $G''(V'', E'')$  la componente conexa que contiene al otro (sea  $v_2$ ). Como componentes conexas que son, podemos considerarlos como subgrafos de  $G$ , por lo que  $G'$  (se podría trabajar análogamente con  $G''$ ) cumple el Lema del Apretón de Manos:

$$\sum_{v \in V'} \deg(v) = 2|E'| \implies \left( \sum_{\substack{v \in V' \\ v \neq v_1}} \deg(v) \right) + \deg(v_1) = 2|E'|$$

No obstante, la sumatoria sabemos que es una suma de grados pares (pues todos los vértices de  $G'$  son de grado par, salvo  $v_1$ ), por lo que es par; y la suma de un número par y un número impar es impar; por lo que no es posible que su suma valga  $2|E'|$  (que es par). Por tanto, por reducción al absurdo, los dos vértices de grado impar han de encontrarse en la misma componente conexa.

**Ejercicio 1.1.11.** ¿Existe algún grafo regular de grado 5 con 25 vértices?

No, por el Ejercicio 1.1.6 (25 es impar).

**Ejercicio 1.1.12.** ¿Existe un grafo completo con 595 lados?

En un grafo completo, sabemos que:

$$|E| = \frac{|V|(|V| - 1)}{2}.$$

Suponiendo que fuese posible, como  $|E| = 595$ , tendríamos que:

$$595 = \frac{|V|(|V| - 1)}{2} \implies |V|^2 - |V| - 1190 = 0 \implies |V| = \frac{1 \pm \sqrt{1 + 4 \cdot 1190}}{2} = \frac{1 \pm 69}{2} \implies |V| = 35$$

Por tanto, sí es posible, y este es el grafo  $K_{35}$ .

**Ejercicio 1.1.13.** ¿Existe un grafo con 6 vértices cuyos grados sean 1, 2, 2, 3, 4 y 4 respectivamente?

Buscamos saber si dicha sucesión es gráfica. Para ello, aplicamos el Algoritmo de Havel-Hakimi:

4	4	3	2	2	1	Eliminamos el 4 y restamos uno a los 4 términos siguientes
	3	2	1	1	1	Eliminamos el 3 y restamos uno a los 3 términos siguientes
		1	0	0	1	Reordenamos los términos
		1	1	0	0	Eliminamos el 1 y restamos uno al término siguiente
		0	0	0		



Figura 1.12: Grafo con sucesión de grados 0, 0, 0.



Figura 1.13: Grafo con sucesión de grados 1, 1, 0, 0.

Llegados a este punto, como la sucesión 0, 0, 0 es gráfica, entonces la sucesión 1, 2, 2, 3, 4, 4 también lo es. Reconstruimos para ello el grafo; partiendo de la sucesión 0, 0, 0, cuyo grafo es el de la Figura 1.12.

La siguiente sucesión es 1, 1, 0, 0, que resultó en la sucesión **0**, 0, 0; por lo que hemos de añadir un vértice de grado 1 que se conecte con uno de los vértices de grado 0; obteniendo el grafo de la Figura 1.13.

La siguiente sucesión es 3, 2, 1, 1, 1, que resultó en la sucesión **1**, **0**, **0**, 1; por lo que hemos de añadir un vértice de grado 3 que se conecte con un vértice de grado 1 y dos de grado 0; obteniendo el grafo de la Figura 1.14.

La siguiente sucesión es 4, 4, 3, 2, 2, 1, que resultó en la sucesión **3**, **2**, **1**, **1**, 1; por lo que hemos de añadir un vértice de grado 4 que se conecte con un vértice de grado 3, uno de grado 2 y dos de grado 1; obteniendo el grafo de la Figura 1.15.

**Ejercicio 1.1.14.** En cada uno de los siguientes casos, dibuja un grafo de Euler que verifique las condiciones, o prueba que tal grafo no existe:

1. Con un número par de vértices y un número par de lados.  
Además de  $K_{n,m}$  con  $m, n$  pares; el grafo de la Figura 1.16 cumple con las condiciones.
2. Con un número par de vértices y un número impar de lados.  
El grafo de la Figura 1.17 cumple con las condiciones.
3. Con un número impar de vértices y un número par de lados.  
Además de  $K_5$ , el grafo de la Figura 1.18 cumple con las condiciones.
4. Con un número impar de vértices y un número impar de lados.  
Además de  $K_3$ , el grafo de la Figura 1.19 cumple con las condiciones.

**Ejercicio 1.1.15.** Encuentra un circuito de Euler para los grafos de la Figura 1.20.

Para el grafo de la Figura 1.20a, un circuito de Euler es:

$$A \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow G \rightarrow H \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow H \rightarrow I \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow I \rightarrow J \rightarrow F \rightarrow C \rightarrow A$$

Para el grafo de la Figura 1.20b, un circuito de Euler es:

$$B \rightarrow A \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow E \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow F \rightarrow E \rightarrow D \rightarrow B$$




Figura 1.14: Grafo con sucesión de grados 3, 2, 1, 1, 1.




Figura 1.15: Grafo con sucesión de grados 4, 4, 3, 2, 2, 1.




Figura 1.16: Grafo para el Ejercicio 1.1.14.1.




Figura 1.17: Grafo para el Ejercicio 1.1.14.2.




Figura 1.18: Grafo para el Ejercicio 1.1.14.3.




Figura 1.19: Grafo para el Ejercicio 1.1.14.4.




Figura 1.20: Grafos para el ejercicio 1.1.15.




Figura 1.21: Grafos para el ejercicio 1.1.16.

**Ejercicio 1.1.16.** Encuentra un camino de Euler para los grafos de la Figura 1.21.

Para el grafo de la Figura 1.21a, un circuito de Euler es:

$$D \rightarrow C \rightarrow G \rightarrow D \rightarrow F \rightarrow I \rightarrow G \rightarrow F \rightarrow C \rightarrow A \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow H \rightarrow E \rightarrow G \rightarrow J \rightarrow H \rightarrow G$$

Para el grafo de la Figura 1.21b, un circuito de Euler es:

$$A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A \rightarrow F \rightarrow D \rightarrow B \rightarrow F \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow G \rightarrow H \rightarrow F$$

**Ejercicio 1.1.17.** Encontrar un circuito de Euler en el grafo de la Figura 1.22 y un camino de Euler en el grafo de la Figura 1.23.

Para el grafo de la Figura 1.22, un circuito de Euler es:

$$A \rightarrow G \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow L \rightarrow K \rightarrow J \rightarrow L \rightarrow I \rightarrow H \rightarrow B \rightarrow I \rightarrow J \rightarrow E \rightarrow D \rightarrow C \rightarrow J \rightarrow B \rightarrow A$$

Para el grafo de la Figura 1.23, un camino de Euler es:

$$E \rightarrow B \rightarrow F \rightarrow E \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow G \rightarrow C \rightarrow H \rightarrow G \rightarrow F \rightarrow A$$




Figura 1.22: Primer grafo para el ejercicio 1.1.17.




Figura 1.23: Segundo grafo para el ejercicio 1.1.17.

**Ejercicio 1.1.18.** ¿Para qué valores de  $n$  el grafo  $K_n$  es un circuito de Euler?

El grafo  $K_n$  sabemos que es conexo y, al ser completo, todos los vértices tienen grado  $n - 1$ . Además, para que un grafo conexo sea de Euler, todos sus vértices han de tener grado par. Por tanto,  $n - 1$  ha de ser par, es decir,  $n$  ha de ser impar. Por tanto, el grafo  $K_n$  es un circuito de Euler si y solo si  $n$  es impar.

**Ejercicio 1.1.19.** Un viajante vive en la ciudad A y se supone que visita las ciudades B, C y D antes de volver a A. Encontrar la ruta más corta que consuma este viaje si las distancias entre las cuatro ciudades son, en Km:

- 120 entre A y B.
- 70 entre B y C.
- 140 entre A y C.
- 180 entre A y D.
- 100 entre B y D.
- 110 entre C y D.

Representamos el problema mediante el grafo de la Figura 1.24, que es  $K_4$  con las distancias entre las ciudades. Se trata del problema del Viajante del comercio, un problema NP-completo para el que no se conoce una solución y que ya fue estudiado en Algorítmica. Sin embargo, el trabajar solo con 4 nodos, podemos aplicar fuerza bruta para estudiar todos los caminos, sin mucha dificultad. Observemos que elegir un camino que salga de A, pase por todos los nodos y vuelva a A es equivalente




Figura 1.24: Grafo para el ejercicio 1.1.19.

a elegir 3 nodos de un conjunto de 3 nodos, por lo que tenemos  $V_3^3 = P_3 = 3!$  posibilidades:

1.  $B - C - D$
2.  $B - D - C$
3.  $C - B - D$
4.  $C - D - B$
5.  $D - B - C$
6.  $D - C - B$

Sin embargo, observemos que nos da igual el orden (si recorremos el camino  $uvw$  o el  $wvu$ , es el mismo coste) en el que los visitamos, por lo que nos quedamos con 3 posibilidades (al ser los caminos 1 y 6, 2 y 4; y 3 y 5 iguales):

1.  $B - C - D = 120 + 70 + 110 + 180 = 480$
2.  $B - D - C = 120 + 100 + 110 + 140 = 470$
3.  $C - B - D = 180 + 100 + 70 + 140 = 490$

Concluimos que el camino óptimo es:  $A - B - D - C$ , con un coste de 470.

**Ejercicio 1.1.20.** El grafo línea  $L(G)$  de un un grafo  $G$  se define como sigue: Los vértices de  $L(G)$  son los lados de  $G$ ,  $V(L(G)) = E(G)$ ; y dos vértices en  $L(G)$  son adyacentes si y solo si los lados correspondientes en  $G$  comparten un vértice. Demostrar:

1. Si  $G$  es un grafo conexo regular de grado  $r$ , entonces  $L(G)$  es un grafo de Euler.

Por ser  $G$  un grafo conexo, tenemos que todos los vértices están conectados; y por tanto lo están también los lados de  $G$ . Es decir, dados dos lados cualesquiera de  $G$ , siempre podemos encontrar una sucesión de vértices adyacentes que los conecten; por lo que  $L(G)$  es conexo.

Veamos ahora que el grado de cada vértice de  $L(G)$  es par. Dado un vértice  $e$  de  $L(G)$ , este representa un lado de  $G$  que conecta dos vértices de  $G$ , sea  $\gamma_G(e) = \{v_1, v_2\}$ . Por cada lado de  $G$  incidente a  $v_1$  o  $v_2$  (excepto  $e$ ), hay un vértice adyacente a  $e$  en  $L(G)$ ; por lo que:

$$\deg_{L(G)}(e) = \deg_G(v_1) + \deg_G(v_2) - 2$$




Figura 1.25: Primer grafo para el ejercicio 1.1.21.

donde se resta 2 por el lado  $e$  que comparten  $v_1$  y  $v_2$ . Por ser  $G$  regular de grado  $r$ , tenemos que:

$$\deg_{L(G)}(e) = r + r - 2 = 2r - 2 = 2(r - 1)$$

Por tanto, como  $e$  es un vértice arbitrario de  $L(G)$ , tenemos de hecho que  $L(G)$  es regular de grado  $2(r - 1)$ , es decir, todos los vértices de  $L(G)$  tienen grado par. Por tanto,  $L(G)$  es un grafo de Euler.

2. Si  $G$  es un grafo de Euler entonces  $L(G)$  es Hamiltoniano.

Supongamos que  $G$  es un grafo de Euler, por lo que podemos encontrar una sucesión de lados  $e_1, e_2, \dots, e_n$  que recorren todos los lados de  $G$  una vez sin repetir ninguno. Por la definición de  $L(G)$ , cada vértice de  $L(G)$  representa un lado de  $G$ ; por lo que la sucesión de lados de  $G$  se convierte en una sucesión de vértices de  $L(G)$  que recorre todos los vértices de  $L(G)$  una vez sin repetir ninguno. Además, esto es posible porque dos lados adyacentes en  $G$  comparten un vértice, por lo que serán vértices adyacentes en  $L(G)$ . Por tanto,  $L(G)$  es Hamiltoniano.

**Ejercicio 1.1.21.** De entre los grafos de la Figura 1.25 y la Figura 1.26, ¿cuáles contienen un circuito de Hamilton?




Figura 1.26: Segundo grafo para el ejercicio 1.1.21.




Figura 1.27: Grafo para el ejercicio 1.1.22.1.

Respecto al grafo de la Figura 1.25, se comprueba que no cumple ninguna de las condiciones suficientes para ser Hamiltoniano; aunque sí cumple todas las condiciones necesarias. Por tanto, hemos de buscar el circuito de Hamilton a ciegas. Este es:

$$A \rightarrow K \rightarrow V \rightarrow P \rightarrow H \rightarrow E \rightarrow J \rightarrow O \rightarrow T \rightarrow U \rightarrow Q \rightarrow L \rightarrow F \rightarrow G \rightarrow M \rightarrow R \rightarrow S \rightarrow N \rightarrow I \rightarrow H \rightarrow D \rightarrow C \rightarrow A$$

Respecto al grafo de la Figura 1.26, este no es Hamiltoniano.

**Ejercicio 1.1.22.**

1. Prueba, utilizando el algoritmo explicado en clase, que la sucesión  $4 \geq 4 \geq 4 \geq 3 \geq 3 \geq 3 \geq 2 \geq 1$  es gráfica y, utilizando dicho algoritmo, encuentra un grafo que tenga como sucesión de grados la correspondiente.

Aplicamos el Algoritmo de Havel-Hakimi, y posteriormente construimos el grafo correspondiente, que se muestra en la Figura 1.27.

4	4	4	3	3	3	2	1	Eliminamos el 4 y restamos uno a los 4 términos siguientes
	3	3	2	2	3	2	1	Reordenamos los términos
	3	3	3	2	2	2	1	Eliminamos el 3 y restamos uno a los 3 términos siguientes
		2	2	1	2	2	1	Reordenamos los términos
		2	2	2	2	1	1	Eliminamos el 2 y restamos uno a los 2 términos siguientes
			1	1	2	1	1	Reordenamos los términos
			2	1	1	1	1	Eliminamos el 2 y restamos uno a los 2 términos siguientes
				0	0	1	1	

2. El grafo con matriz de adyacencia  $M$  dada por:

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

es de Euler o en él hay un camino de Euler entre dos vértices. Razona cuál es la situación y encuentra, en su caso, el circuito o el camino de Euler que existe.

Sabemos que el grado del vértice  $v_i$  es la suma de los elementos de la fila  $i$  de la matriz de adyacencia. Calculando los grados de los vértices, obtenemos que todos son pares a excepción de los vértices  $v_1$  y  $v_8$ , por lo que hay un camino de Euler entre ellos. Este lo construimos con el algoritmo de Fleury, obteniendo el camino:

$$v_1 \rightarrow v_2 \rightarrow v_3 \rightarrow v_4 \rightarrow v_6 \rightarrow v_7 \rightarrow v_8 \rightarrow v_5 \rightarrow v_2 \rightarrow v_7 \rightarrow v_1 \rightarrow v_6 \rightarrow \\ \rightarrow v_3 \rightarrow v_1 \rightarrow v_4 \rightarrow v_7 \rightarrow v_5 \rightarrow v_6 \rightarrow v_2 \rightarrow v_4 \rightarrow v_8$$

**Ejercicio 1.1.23.**

1. En el grafo  $G$  cuya matriz de adyacencia es

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

determina el número de aristas y la sucesión de grados de los vértices y, caso de que  $G$  sea de Euler, describe un circuito de Euler en él usando el algoritmo apropiado.

Tenemos que:

$$\begin{array}{cccc} \deg v_1 = 4 & \deg v_2 = 2 & \deg v_3 = 4 & \deg v_4 = 4 \\ \deg v_5 = 2 & \deg v_6 = 4 & \deg v_7 = 2 & \deg v_8 = 4 \end{array}$$

Por tanto, usando el Lema del Apretón de Manos, tenemos que:

$$\sum_{v \in V} \deg v = 4 + 2 + 4 + 4 + 2 + 4 + 2 + 4 = 26 = 2|E| \implies |E| = 13$$

La sucesión de grados por tanto es:

$$0, 0, 3, 0, 5$$

Realizando un recorrido del grafo, vemos que el grafo es conexo; y como todos sus vértices tienen grado par, es de Euler. Por tanto, aplicamos el algoritmo de Fleury para encontrar un circuito de Euler, obteniendo el circuito:

$$v_1 \rightarrow v_2 \rightarrow v_8 \rightarrow v_6 \rightarrow v_1 \rightarrow v_4 \rightarrow v_3 \rightarrow v_6 \rightarrow v_4 \rightarrow v_8 \rightarrow v_7 \rightarrow v_3 \rightarrow v_5 \rightarrow v_1$$

2. Calcula el número de vértices de un grafo plano, conexo y regular de grado 5 con 20 caras.

Por ser plano y conexo, tenemos que:

$$|V| + 20 = |E| + 2$$

Por el Lema del Apretón de Manos, tenemos que:

$$\sum_{v \in V} \deg v = 2|E| \implies 5|V| = 2|E|$$

Resolvemos por tanto el siguiente sistema:

$$\begin{aligned} |V| + 20 &= |E| + 2 \\ 5|V| &= 2|E| \implies |E| = 5/2 \cdot |V| \end{aligned}$$

Por tanto, tenemos que:

$$|V| + 20 = 5/2 \cdot |V| + 2 \implies |V| = 18 \cdot 2/3 = 12$$

**Ejercicio 1.1.24.**

1. La siguiente matriz es la matriz de incidencia o adyacencia de un grafo. Razona qué caso es y dibuja el correspondiente grafo.

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

¿Es el grafo anterior de Euler o Hamilton? Razona la respuesta y da un circuito de Euler o Hamilton en caso de que los haya.

Como no se trata de una matriz cuadrada, no puede ser de adyacencia, por lo que se trata de una matriz de incidencia. El grafo correspondiente es el de la Figura 1.28.




Figura 1.28: Grafo para el ejercicio 1.1.24.1.

Los grados de los vértices son la suma de las filas de la matriz de incidencia, obteniendo:

$$\begin{array}{cccc} \deg v_1 = 2 & \deg v_2 = 2 & \deg v_3 = 3 & \deg v_4 = 2 \\ \deg v_5 = 3 & \deg v_6 = 2 & \deg v_7 = 2 & \end{array}$$

Por tanto, no se trata de un grafo de Euler (pues hay vértices de grado impar), pero sí tiene un camino de Euler entre los vértices  $v_3$  y  $v_5$ , que es:

$$v_3 \xrightarrow{e_4} v_4 \xrightarrow{e_3} v_1 \xrightarrow{e_1} v_2 \xrightarrow{e_2} v_3 \xrightarrow{e_5} v_5 \xrightarrow{e_6} v_6 \xrightarrow{e_8} v_7 \xrightarrow{e_7} v_5$$

Además, no es un grafo de Hamilton, pues contiene una arista puente. Esto implica que no se podrá construir un circuito (aunque no sabemos nada sobre camino) de Hamilton en él.

2. Aplica el algoritmo para comprobar si la siguiente sucesión

$$6 \geq 4 \geq 4 \geq 3 \geq 3 \geq 3 \geq 3 \geq 3$$

es, o no es, una sucesión gráfica y, en caso de serlo, también aplica el algoritmo para encontrar un grafo que la tenga como sucesión de grados.

No se trata de una sucesión gráfica, pues la suma de los grados es impar, lo que contradice el Lema del Apretón de Manos:

$$\sum_{v \in V} \deg v = 6 + 4 + 4 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 29$$

**Ejercicio 1.1.25.** Razona cuál es la respuesta correcta en cada una de las siguientes cuestiones (todos los grafos a los que se hace referencia son simples, no tienen lazos ni lados paralelos):

1. El grafo completo  $K_n$ :
  - a) Es siempre de Euler.
  - b) Es siempre de Hamilton.
  - c) Dependiendo de  $n$  puede ser, o no, de Hamilton o de Euler.

Sabemos que  $K_n$  es conexo y que todos sus vértices tienen grado  $n - 1$ . Por tanto, en primer lugar vemos que:

$$K_n \text{ es de Euler} \iff n \text{ es impar}$$

Por otro lado, sabemos que, para cada par de vértices no adyacentes, se verifica que:

$$\deg v_i + \deg v_j = n - 1 + n - 1 = 2n - 2 \geq n \iff n \geq 2$$

Por tanto, sabemos que  $K_n$  con  $n \geq 2$  es de Hamilton. Aunque  $K_1$  sí es de Hamilton,  $K_2$  no lo es. Por tanto, tenemos que:

$$K_n \text{ es de Hamilton} \quad \forall n \in \mathbb{N} \setminus \{2\}$$

Por tanto, la respuesta correcta es la **c**).

2. He encontrado un grafo plano y conexo con 200 vértices y:

- a) Un número par de caras y un número impar de lados.
- b) Un número par de lados y un número impar de caras.
- c) Un número par de lados y caras.

Por ser plano y conexo, sabemos que:

$$200 + |C| = |E| + 2$$

Por tanto, o bien  $|E|$  y  $|C|$  son ambos pares, o ambos impares. Por tanto, la respuesta correcta es la **c**).

3. Tengo un grafo con un solo vértice de grado impar  $v$ :

- a) Puedo encontrar un camino que empiece en ese vértice  $v$ , recorra todos los lados del grafo solo una vez y vuelva a él.
- b) Si añado un lado que conecte ese vértice con otro cualquiera del grafo, pongamos  $w$ , puedo encontrar un camino que empiece en  $v$ , recorra todos los lados del grafo (incluido el que he añadido) solo una vez y termine en  $w$ .
- c) Es imposible tener un grafo como ese.

Por el Ejercicio 1.1.6, sabemos que el número de vértices de grado impar en un grafo es par. Por tanto, la respuesta correcta es la **c**).

4. En un grafo plano con cinco componentes conexas y 24 lados:

- a) El número de vértices y el número de caras son opuestos módulo 30.
- b) El número de vértices y el número de caras son congruentes módulo 30.
- c) Ninguna de las anteriores es cierta.

Por ser plano, tenemos que:

$$|V| + |C| = 24 + 1 + 5 = 30$$

Por tanto, la respuesta correcta es la **a**).

5. Dado un grafo regular de grado 1, entonces:

- a) El grafo no puede ser conexo.
- b) El grafo tiene tantas componentes conexas como vértices.
- c) El grafo tiene tantas componentes conexas como lados.

La respuesta correcta es la **c**).

6. Un grafo regular conexo de grado 11 con veinte vértices:

- a) Es siempre de Euler.
- b) Es siempre de Hamilton.
- c) Ninguna de las dos respuestas anteriores es cierta.

Como es regular de grafo 11 (impar), sabemos que no es de Euler. Por otro lado, sabemos que, para cada par de vértices no adyacentes, se verifica que:

$$\deg v_i + \deg v_j = 11 + 11 = 22 \geq 20$$

Por tanto, sabemos que es de Hamilton. Por tanto, la respuesta correcta es la **b**).

7. Elija la respuesta correcta:

- a) Sólo hay dos grafos con cuatro vértices y cuatro lados no isomorfos.
- b) Todos los grafos con cuatro vértices y cuatro lados son isomorfos.
- c) Sólo hay tres grafos con cuatro vértices y cuatro lados no isomorfos.

En el Ejercicio 1.1.4 vimos que la respuesta correcta es la **a**).

8. Un grafo cuya matriz de adyacencia es

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

- a) Es de Euler.
- b) No es de Euler pero hay un camino de Euler entre dos vértices.
- c) No es de Euler pero sus componentes conexas sí lo son.

No es de Euler, pues no es conexo. Sus componentes conexas, formadas por los vértices  $\{v_1, v_2, v_3\}$  y  $\{v_4, v_5, v_6, v_7\}$  respectivamente, sí son de Euler por ser conexas y tener todos los grados pares. Por tanto, la respuesta correcta es la **c**).

9. Un grafo cuya matriz de incidencia es

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- a) Es de Hamilton.
- b) No es de Hamilton pero sus componente conexas sí lo son.
- c) No es de Hamilton y tampoco lo son sus componentes conexas.

Este grafo es conexo (el vértice  $v_3$  está conectado con todos los demás). Además, como  $\text{deg } v_5 = 1$ , sabemos que no es de Hamilton. Por tanto, la respuesta correcta es la **c**).

10. La siguiente matriz

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

- a) Puede ser la matriz de adyacencia de un grafo pero no la de incidencia.
- b) Puede ser la matriz de incidencia de un grafo pero no la de adyacencia.
- c) No puede ser la matriz de adyacencia ni la de incidencia de un grafo.

Como  $a_{13} = 0 \neq 1 = a_{31}$ , la matriz no es simétrica y por tanto no puede ser la matriz de adyacencia de un grafo. Por otro lado, como la suma de la tercera columna es 3, si se tratase de la matriz de incidencia, tendríamos una arista que conecta tres vértices, lo que no es posible en un grafo simple. Por tanto, la respuesta correcta es la **c**).

**Ejercicio 1.1.26.**

1. Prueba, utilizando el algoritmo explicado en clase, que la sucesión dada por  $3 \geq 3 \geq 2 \geq 2 \geq 2 \geq 2 \geq 2$  es gráfica y, utilizando dicho algoritmo, encuentra un grafo en que los grados de sus vértices sean los términos de esa sucesión. Prueba que el grafo es plano y que satisface el teorema de la característica de Euler.

Aplicamos el Algoritmo de Havel-Hakimi, y posteriormente construimos el grafo correspondiente, que se muestra en la Figura 1.29.




Figura 1.29: Grafo para el ejercicio 1.1.26.1.




Figura 1.30: Grafo  $G_1$  para el ejercicio 1.1.26.2.

3	3	2	2	2	2	2	Eliminamos el 3 y restamos uno a los 3 términos siguientes
	2	1	1	2	2	2	Reordenamos los términos
	2	2	2	2	1	1	Eliminamos el 2 y restamos uno a los 2 términos siguientes
		1	1	2	1	1	Reordenamos los términos
			2	1	1	1	Eliminamos el 2 y restamos uno a los 2 términos siguientes
				0	0	1	1

2. Considera los grafos  $G_1$  dado por el diagrama de la Figura 1.30 y  $G_2$  con matriz de incidencia

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Estudia si son o no isomorfos, si son o no planos, si son o no de Euler o si hay un camino de Euler (en caso afirmativo aplica el algoritmo para calcular un circuito o un camino de Euler) y si son o no de Hamilton (encontrando el camino en caso afirmativo).

Estudiamos cada aspecto:

- No son isomorfos, puesto que  $G_1$  no tiene vértices de grado 2 y  $G_2$  sí ( $v_5$ ).
- En ambos casos, tanto para  $G_1$  como para  $G_2$ , tenemos que:

$$|V| = 5 \quad |E| = 8$$

Además, tenemos que:

- Para  $K_5$ :  $|V| = 5$ ,  $|E| = 10$ .
- Para  $K_{3,3}$ :  $|V| = 6$ ,  $|E| = 9$ .




Figura 1.31: Representación plana de  $G_1$  (Figura 1.30).

Como  $|E| = 8 < 9, 10$ , y toda contracción de un grafo reduce el número de aristas, sabemos que ningún subgrafo de ninguno de los dos podrá contraerse a  $K_5$  o a  $K_{3,3}$ . Por tanto, por el Teorema de Kuratowski, sabemos que ambos son planos. De hecho, en la Figura 1.31 se muestra la representación plana de  $G_1$  (Figura 1.30).

- Ninguno de ellos es de Euler, puesto que tienen vértices de grado impar.
- $G_1$  no tiene ningún camino de Euler, puesto que hay más de dos vértices de grado impar.  $G_1$ , no obstante, sí tiene un camino de Euler de  $v_1$  a  $v_4$ :

$$v_1 \xrightarrow{e_1} v_2 \xrightarrow{e_3} v_4 \xrightarrow{e_2} v_1 \xrightarrow{e_8} v_3 \xrightarrow{e_4} v_2 \xrightarrow{e_5} v_5 \xrightarrow{e_7} v_3 \xrightarrow{e_6} v_4$$

- Respecto al circuito de Hamilton, estudiamos en primer lugar  $G_1$ . Sus grados son:

$$\deg v_1 = 3 \quad \deg v_2 = 3 \quad \deg v_3 = 3 \quad \deg v_4 = 4 \quad \deg v_5 = 3$$

Por tanto, dados dos vértices cualesquiera no adyacentes, se verifica que:

$$\deg v_i + \deg v_j \geq 6 \geq 5 \implies G_1 \text{ es de Hamilton}$$

Un posible recorrido de Hamilton para  $G_1$  es:

$$1 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 5 \rightarrow 4 \rightarrow 1$$

Por otro lado, estudiamos  $G_2$ . Sus grados son:

$$\deg v_1 = 3 \quad \deg v_2 = 4 \quad \deg v_3 = 4 \quad \deg v_4 = 3 \quad \deg v_5 = 2$$

Por tanto, dados dos vértices cualesquiera no adyacentes, se verifica que:

$$\deg v_i + \deg v_j \geq 5 \geq 5 \implies G_2 \text{ es de Hamilton}$$

Un posible recorrido de Hamilton para  $G_2$  es:

$$v_1 \xrightarrow{e_1} v_2 \xrightarrow{e_5} v_5 \xrightarrow{e_7} v_3 \xrightarrow{e_6} v_4 \xrightarrow{e_2} v_1$$



Figura 1.32: Grafos para el ejercicio 1.1.27.2.

**Ejercicio 1.1.27.**

1. Si  $G$  es un grafo completo con 6 vértices entonces:

- a)  $G$  es regular de grado 5.
- b)  $G$  tiene 20 aristas.
- c)  $G$  es de Euler y de Hamilton.

Sabemos que  $K_6$  es regular de grado 5 y:

$$|E| = \frac{6 \cdot 5}{2} = 15$$

Además, aunque sí es de Hamilton, no es de Euler, por lo que la respuesta correcta es la **a**).

2. Sea  $G'$  un subgrafo completo (pleno) de un grafo  $G$ . Entonces:

- a) Si  $G$  es de Euler también  $G'$  es de Euler.
- b) Si  $G$  es de Hamilton también  $G'$  es de Hamilton.
- c) Ninguna de las anteriores.

Consideramos el contraejemplo de la Figura 1.32. El grafo  $G$  de la Figura 1.32a es de Euler y de Hamilton, pero su subgrafo completo  $G'$  de la Figura 1.32b no es ni de Euler ni de Hamilton. Por tanto, la respuesta correcta es la **c**).

3. Seleccione la respuesta correcta:

- a) Sólo hay dos grafos con cuatro vértices y 5 lados no isomorfos.
- b) Todos los grafos con cuatro vértices y 5 lados son isomorfos.
- c) Todos los grafos con cuatro vértices y cinco lados son de Euler.

En el Ejercicio 1.1.4 vimos que la respuesta correcta es la **b**).

4. Sea  $G$  un grafo plano conexo regular de grado 6 con 15 caras. Entonces:

- a)  $G$  tiene 13 vértices.
- b) El número de vértices es el triple del de aristas.
- c) No existe un tal grafo.

Por ser plano y conexo, sabemos que:

$$|V| + 15 = |E| + 2$$

Por ser regular de grado 6, sabemos que:

$$2|E| = 6|V| \implies |E| = 3|V|$$

Por tanto, sustituyendo en la primera ecuación, obtenemos:

$$|V| + 15 = 3|V| + 2 \implies |V| = \frac{13}{2}$$

Por tanto, la respuesta correcta es la **c**).

5. Salvo isomorfismos, grafos con 50 vértices y 1225 aristas:

- a) Solo hay 1.
- b) Hay 2.
- c) No existen grafos en esas condiciones.

Tan solo hay uno, y se trata de  $K_{50}$ , por lo que la respuesta correcta es la **a**).

**Ejercicio 1.1.28.**

1. Considera la sucesión 4, 4, 4, 4, 4.

- a) Utiliza el algoritmo dado en clase para probar que la sucesión es una sucesión gráfica y para dibujar un grafo  $G$  que la tenga como sucesión gráfica.

Aplicamos el Algoritmo de Havel-Hakimi, y posteriormente construimos el grafo correspondiente, que se muestra en la Figura 1.33 y se observa que  $G = K_5$ .

4	4	4	4	4	Eliminamos el 4 y restamos uno a los 4 términos siguientes
3	3	3	3	3	Eliminamos el 3 y restamos uno a los 3 términos siguientes
	2	2	2	2	Eliminamos el 2 y restamos uno a los 2 términos siguientes
		1	1	1	Eliminamos el 1 y restamos uno al término siguiente
			0	0	

- b) Calcula las matrices incidencia y adyacencia del grafo  $G$  obtenido en el apartado anterior.

La matriz de adyacencia es:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$




Figura 1.33: Grafo  $G$  del ejercicio 1.1.28.1.

La matriz de incidencia es:

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

- c) ¿Es  $G$  de Euler o tiene un camino de Euler? En caso afirmativo, utiliza el algoritmo dado en clase para calcular el circuito o el camino de Euler. Sí es de Euler, puesto que todos los vértices son de grado par. Un posible circuito de Euler es:

$$v_1 \rightarrow v_3 \rightarrow v_5 \rightarrow v_2 \rightarrow v_4 \rightarrow v_1 \rightarrow v_2 \rightarrow v_3 \rightarrow v_4 \rightarrow v_5 \rightarrow v_1$$

- d) ¿Es  $G$  de Hamilton? En caso afirmativo calcula el circuito de Hamilton. Sí, puesto que para cada par de vértices no adyacentes, se verifica que:

$$\deg v_i + \deg v_j = 4 + 4 = 8 \geq 5$$

Un posible circuito de Hamilton es:

$$v_1 \rightarrow v_2 \rightarrow v_3 \rightarrow v_4 \rightarrow v_5 \rightarrow v_1$$

- e) ¿Es  $G$  plano? En caso afirmativo comprueba la fórmula de la característica de Euler.

No, ya se ha demostrado que  $G = K_5$  no es plano; ya que  $|V| = 5$ ,  $|E| = 10$  pero:

$$|E| \not\leq 3|V| - 6$$

2. Demuestra que si  $G$  es un grafo de Euler con  $n$  vértices que solo tiene 2 vértices de grado 2 entonces  $|E| \geq 2n - 2$ .

Sean  $v_1, v_2 \in V$  los vértices de grado 2. Por ser de Euler, tenemos que  $\deg v$  es par para todo  $v \in V$ . Por tanto, como  $v_1$  y  $v_2$  son los únicos vértices de grado 2, tenemos que:

$$\deg v \geq 4 \quad \forall v \in V \setminus \{v_1, v_2\}$$




Figura 1.34: Grafo para el ejercicio 1.1.29.

Por tanto, tenemos que:

$$\begin{aligned}
 |E| &= \frac{1}{2} \sum_{v \in V} \deg v = \frac{1}{2} \left( 2 + 2 + \sum_{v \in V \setminus \{v_1, v_2\}} \deg v \right) \\
 &\geq \frac{1}{2} (2 + 2 + 4(n - 2)) = 2n - 2
 \end{aligned}$$

**Ejercicio 1.1.29.**

1. Considera el subconjunto  $X = \{(12), (13), (23)\} \subset S_3$  y el siguiente grafo  $G$ : Los vértices de  $G$  son los elementos de  $S_3$  y hay un lado entre dos vértices  $x$  e  $y$  si  $xy^{-1} \in X$ .

a) Dibuja el grafo.

Calculemos en primer lugar los lados. Dados  $x, y \in S_3$ , tenemos que:

$$\varepsilon(xy^{-1}) = \varepsilon(x)\varepsilon(y^{-1}) = \varepsilon(x)\varepsilon(y)$$

Veamos ahora que hay un lado entre dos vértices  $x, y \in S_3$  si y solo si  $\varepsilon(x) \neq \varepsilon(y)$ .

$\Rightarrow$ ) Supongamos que hay un lado entre  $x, y \in S_3$ ; por lo que  $xy^{-1} \in X$ .

Por tanto:

$$\varepsilon(xy^{-1}) = \varepsilon(x)\varepsilon(y) \in \varepsilon(X) = \{-1\} \implies \varepsilon(x) \neq \varepsilon(y)$$

$\Leftarrow$ ) Supongamos que  $\varepsilon(x) \neq \varepsilon(y)$ . Por tanto,  $\varepsilon(xy^{-1}) = \varepsilon(x)\varepsilon(y) = -1$ . Como las únicas permutaciones de  $S_3$  impares son las transposiciones, tenemos que  $xy^{-1} \in X$ .

Por tanto, el grafo es el de la Figura 1.34. Tenemos efectivamente que se trata de  $K_{3,3}$ , siendo las dos particiones de  $S_3$  los conjuntos de permutaciones con signatura par e impar, respectivamente.

b) Calcula sus matrices de incidencia y adyacencia.

Numeramos los vértices de  $G$  como sigue:

$$\{(12), (13), (23), (id), (123), (132)\}$$

La matriz de adyacencia es:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

La matriz de incidencia es:

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- c) ¿Es de Euler o tiene un camino de Euler? En caso afirmativo aplica el algoritmo dado en clase para calcular un ciclo o un camino de Euler.

No es de Euler ni hay un camino de Euler, puesto que hay más de dos vértices de grado impar.

- d) ¿Es de Hamilton? En caso afirmativo calcula el ciclo de Hamilton.

Sí es de Hamilton, puesto que para cada par de vértices no adyacentes, se verifica que:

$$\deg v_i + \deg v_j = 3 + 3 = 6 \geq 6 = |V|$$

Un posible ciclo de Hamilton es:

$$(id) \rightarrow (12) \rightarrow (123) \rightarrow (23) \rightarrow (132) \rightarrow (13) \rightarrow (id)$$

- e) ¿Es plano? En caso afirmativo comprueba la fórmula de Euler.

No es plano, puesto que es el mismo  $K_{3,3}$ .

2. Si  $G$  es un grafo con  $n$  vértices y  $m$  lados. Prueba que  $m \leq \frac{n(n-1)}{2}$  y que se da la igualdad si y solo si  $G = K_n$  es el grafo completo.

Por el Lema del Apretón de Manos, sabemos que:

$$\sum_{v \in V} \deg v = 2|E| \implies m = |E| = \frac{\sum_{v \in V} \deg v}{2}$$




Figura 1.35: Octaedro para el ejercicio 1.1.30.

Por otro lado, sabemos que el grado máximo de un vértice en un grafo con  $n$  vértices es  $n - 1$  (ya que en caso contrario sería necesario que hubiese lados paralelos o lazos, algo que no consideramos). Por tanto, tenemos que:

$$m \leq \frac{\sum_{v \in V} (n - 1)}{2} = \frac{\sum_{i=1}^n (n - 1)}{2} = \frac{n(n - 1)}{2}$$

Además, se da la igualdad si y solo si  $G$  es el grafo regular de  $n$  vértices y grado  $n - 1$ , es decir,  $K_n$ .

**Ejercicio 1.1.30.** Demuestra, utilizando el algoritmo explicado en clase, que la sucesión gráfica asociada a un octaedro (poliedro regular con 6 vértices, 8 caras y 12 aristas) es gráfica y, utilizando dicho algoritmo, encuentra un grafo  $G$  en que los grados de sus vértices sean los términos de esa sucesión. Encuentra las matrices de adyacencia e incidencia de  $G$ .

Comprueba que el grafo  $G$  es plano y estudia si es de Euler y, en caso afirmativo, determina por algún algoritmo explicado en clase un circuito de Euler para  $G$ . ¿Es  $G$  un grafo de Hamilton? Razona la respuesta.

En primer lugar, dibujamos el octaedro, que se muestra en la Figura 1.35, para poder así obtener la sucesión gráfica asociada, que es:

$$4, 4, 4, 4, 4, 4$$

Aplicamos el Algoritmo de Havel-Hakimi, y obtenemos el grafo de la Figura 1.36.

4	4	4	4	4	4	Eliminamos el 4 y restamos uno a los 4 términos siguientes
	3	3	3	3	4	Reordenamos los términos
	4	3	3	3	3	Eliminamos el 4 y restamos uno a los 4 términos siguientes
		2	2	2	2	Eliminamos el 2 y restamos uno a los 2 términos siguientes
			1	1	2	Reordenamos los términos
				2	1	Eliminamos el 2 y restamos uno a los 2 términos siguientes
				0	0	




Figura 1.36: Grafo para el ejercicio 1.1.30.

La matriz de adyacencia es:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

La matriz de incidencia es:

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

El grafo es plano, puesto que se da una representación en la que no se cruzan aristas. Además, es de Euler, puesto que todos los vértices son de grado par. Un posible circuito de Euler es:

$$v_1 \rightarrow v_3 \rightarrow v_6 \rightarrow v_4 \rightarrow v_3 \rightarrow v_5 \rightarrow v_4 \rightarrow v_2 \rightarrow v_5 \rightarrow v_1 \rightarrow v_2 \rightarrow v_6 \rightarrow v_1$$

Además, el grafo también es de Hamilton, puesto que para cada par de vértices no adyacentes, se verifica que:

$$\deg v_i + \deg v_j = 4 + 4 = 8 \geq 6 = |V|$$

De hecho, un posible circuito de Hamilton es:

$$v_1 \rightarrow v_5 \rightarrow v_2 \rightarrow v_4 \rightarrow v_3 \rightarrow v_6 \rightarrow v_1$$

**Ejercicio 1.1.31.** Razona cuál es la respuesta correcta en cada una de las siguientes cuestiones (todos los grafos a los que se hace referencia son simples, no tienen lazos ni lados paralelos):




Figura 1.37: Grafo plano para el ejercicio 1.1.31.2.

1. La sucesión  $70, 69, 68, \dots, 3, 2, 1$ .

- a) Es una sucesión gráfica y su grafo asociado es el completo  $K_{70}$ .
- b) Es una sucesión gráfica pero su grafo asociado no es  $K_{70}$ .
- c) No es una sucesión gráfica.

Supongamos que es gráfica. Entonces, tenemos que:

$$\sum_{v \in V} \deg v = \sum_{i=1}^{70} i = \frac{70 \cdot 71}{2} = 35 \cdot 71 \text{ impar}$$

Por tanto, no puede ser gráfica, ya que la suma de los grados de los vértices debe ser par. Por tanto, la respuesta correcta es la **c**).

2. Tengo un grafo conexo con 6 vértices y 9 lados:

- a) Puedo asegurar que es plano.
- b) Puedo asegurar que no es plano.
- c) Puede ser plano o no serlo.

Tenemos que  $|E| = 9 \leq 12 = 3|V| - 6$ , por lo que puede ser plano. De hecho, el grafo de la Figura 1.37 es plano y  $K_{3,3}$  no lo es, mientras que ambos son conexos con 6 vértices y 9 lados. Por tanto, la respuesta correcta es la **c**).

3. La sucesión  $4, 4, 4, 4$ :

- a) No es una sucesión gráfica pero si le añadimos al final un 2 sí lo es.
- b) No es una sucesión gráfica pero si le añadimos al final un 3 sí lo es.
- c) No es una sucesión gráfica pero si le añadimos al final un 4 sí lo es.

No es gráfica, puesto que si hay 4 vértices el mayor grado posible es 3. No obstante, si le añadimos un 4 al final, sí es gráfica, ya que es la sucesión correspondiente a  $K_5$ . Por tanto, la respuesta correcta es la **c**).

4. Puedo encontrar un grafo plano conexo con:




Figura 1.38: Grafo  $G$  del ejercicio 1.1.31.5.

- a) Un número impar de vértices, un número impar de lados y un número impar de caras.
- b) Un número par de vértices, un número par de lados y un número impar de caras.
- c) Un número impar de vértices, un número par de lados y un número impar de caras.

Sabemos que:

$$|V| + |F| = 2 + |E|$$

Por tanto, de entre las tres opciones, la única que puede cumplir la fórmula de Euler es la **c**).

5. La sucesión 4, 2, 2, 2, 2:

- a) Es la sucesión de grados de un grafo de Euler y de Hamilton.
- b) Es la sucesión de grados de un grafo de Hamilton y no de Euler.
- c) Es la sucesión de grados de un grafo de Euler y no de Hamilton.

El grafo de la Figura 1.38 tiene la sucesión de grados dada. Este es de Euler, con el circuito:

$$v_1 \rightarrow v_3 \rightarrow v_2 \rightarrow v_1 \rightarrow v_4 \rightarrow v_5 \rightarrow v_1$$

No obstante, no es de Hamilton. Por tanto, la respuesta correcta es la **c**).

6. Un grafo regular de grado 7:

- a) Tiene que tener al menos 8 vértices y un número impar de lados.
- b) Tiene que tener al menos 8 vértices pero puede tener un número impar o par de lados.
- c) Lo único que puedo afirmar sobre él es que tiene un número par de vértices.

Efectivamente, tiene que tener al menos 8 vértices. Respecto del número de lados, por el Lema del Apretón de Manos tenemos que:

$$2|E| = 7|V|$$

Por tanto, podemos afirmar que ha de tener un número par de vértices. El grafo  $K_8$  es regular de grado 7 y tiene 28 lados. El grafo regular de grado 7 con 10 vértices tiene 35 aristas, por lo que la respuesta correcta es la **b**).

**Ejercicio 1.1.32.** Considera el grupo simétrico  $S_4$  y el subgrupo suyo  $H = \langle (1\ 2\ 3) \rangle$ .

1. Construye el conjunto cociente  $S_4/H \sim$  de clases laterales por la izquierda  $xH$ .

Por el Teorema de Lagrange, sabemos que:

$$[S_4 : H] = \frac{|S_4|}{|H|} = \frac{4!}{3} = 8$$

Por tanto, hemos de encontrar 8 clases laterales por la izquierda distintas:

$$\begin{aligned} 1H &= \{1, (1\ 2\ 3), (1\ 3\ 2)\} = (1\ 2\ 3)H = (1\ 3\ 2)H \\ (1\ 2)H &= \{(1\ 2), (2\ 3), (1\ 3)\} = (2\ 3)H = (1\ 3)H \\ (1\ 4)H &= \{(1\ 4), (1\ 2\ 3\ 4), (1\ 3\ 2\ 4)\} = (1\ 2\ 3\ 4)H = (1\ 3\ 2\ 4)H \\ (2\ 4)H &= \{(2\ 4), (1\ 4\ 2\ 3), (1\ 3\ 4\ 2)\} = (1\ 4\ 2\ 3)H = (1\ 3\ 4\ 2)H \\ (3\ 4)H &= \{(3\ 4), (1\ 2\ 4\ 3), (1\ 4\ 3\ 2)\} = (1\ 2\ 4\ 3)H = (1\ 4\ 3\ 2)H \\ (1\ 2\ 4)H &= \{(1\ 2\ 4), (1\ 4)(2\ 3), (1\ 3\ 4)\} = (1\ 4)(2\ 3)H = (1\ 3\ 4)H \\ (1\ 4\ 2)H &= \{(1\ 4\ 2), (2\ 3\ 4), (1\ 3)(2\ 4)\} = (2\ 3\ 4)H = (1\ 3)(2\ 4)H \\ (1\ 4\ 3)H &= \{(1\ 4\ 3), (1\ 2)(3\ 4), (2\ 4\ 3)\} = (1\ 2)(3\ 4)H = (2\ 4\ 3)H \end{aligned}$$

Por tanto, el conjunto cociente es:

$$S_4/H \sim = \{1H, (1\ 2)H, (1\ 4)H, (2\ 4)H, (3\ 4)H, (1\ 2\ 4)H, (1\ 4\ 2)H, (1\ 4\ 3)H\}$$

2. Para cada clase  $xH$  denotamos  $m(xH)$  al máximo común divisor de los órdenes de los elementos en  $xH$ . Considera el grafo  $G$  con vértices las clases  $xH$  y en el que hay un lado entre  $xH$  e  $yH$  si  $m(xH)$  divide a  $m(yH)$  o  $m(yH)$  divide a  $m(xH)$ . Identifica el grafo  $G$  dando la sucesión de grados de sus vértices y su matriz de adyacencia. ¿Es  $G$  de Euler, de Hamilton o plano?

Calculamos  $m(xH)$  para cada clase:

$$\begin{aligned} m(1H) &= m((1\ 2\ 4)H) = m((1\ 4\ 2)H) = m((1\ 4\ 3)H) = 1 \\ m((1\ 2)H) &= m((1\ 4)H) = m((2\ 4)H) = m((3\ 4)H) = 2 \end{aligned}$$

Por tanto el grafo resultante es el grafo completo de 8 vértices; es decir,  $K_8$ . La sucesión de grados de sus vértices es:

$$\{D_0(K_8), D_1(K_8), \dots, D_7(K_8)\} = \{0, \dots, 0, 8\}$$

Su matriz de adyacencia es:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$




Figura 1.39: Grafo  $G$  del ejercicio 1.1.33.

No es de Euler, puesto que tiene vértices de grado impar. Tampoco es plano, puesto que puede contraerse a  $K_5$ . No obstante, sí es de Hamilton, puesto que para cada par de vértices no adyacentes, se verifica que:

$$\deg v_i + \deg v_j = 8 + 8 = 16 \geq 8 = |V|$$

De hecho, un posible ciclo de Hamilton es:

$$1H \rightarrow (12)H \rightarrow (14)H \rightarrow (24)H \rightarrow (34)H \rightarrow (124)H \rightarrow (142)H \rightarrow (143)H \rightarrow 1H$$

3. Considera el subgrafo  $G'$  obtenido a partir de  $G$  eliminando la clase  $1H$ , ¿es  $G'$  de Euler? En caso afirmativo aplica el algoritmo dado en clase para calcular un circuito de Euler.

Tras eliminar la clase  $1H$ , obtenemos el grafo completo  $K_7$ , que es de Euler puesto que todos sus vértices tienen grado 6 (par).

**Ejercicio 1.1.33.** Se considera el grupo  $Q_2^{\text{abs}} = \langle x, y \mid x^4 = 1, x^2 = y^2, yx = x^{-1}y \rangle$  y el grafo  $G$  cuyos vértices son los elementos de  $Q_2^{\text{abs}}$  y en el que, para cualquier  $a \in Q_2^{\text{abs}}$ , hay un lado entre  $a$  y  $ax$  y también un lado entre  $a$  y  $ay$ .

1. Comprueba que  $G$  es un grafo regular dando la sucesión de grados de sus vértices y calcula su matriz de adyacencia.

Calculamos los elementos de  $Q_2^{\text{abs}}$ :

$$Q_2 = \{1, x, x^2, x^3, y, xy, x^2y, x^3y\}$$

El grafo es el de la Figura 1.39.

La matriz de adyacencia es:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Por tanto, su sucesión de grados es:

$$0, 0, 0, 0, 8, 0, 0, 0$$

Se trata por tanto de un grafo regular de grado 4 y 8 vértices. En particular, vemos que se trata de  $K_{4,4}$ , con la descomposición:

$$Q_2^{\text{abs}} = \{1, x^2, x^3y, xy\} \cup \{x, x^3, x^2y, y\}$$

2. Razona si  $G$  es un grafo de Hamilton o plano.

Para cada par de vértices no adyacentes, se verifica que:

$$\deg v_i + \deg v_j = 4 + 4 = 8 \geq 8 = |V|$$

Por tanto,  $G$  es de Hamilton, con un posible circuito:

$$1 \rightarrow x \rightarrow x^2 \rightarrow x^3 \rightarrow x^3y \rightarrow x^2y \rightarrow xy \rightarrow y \rightarrow 1$$

No obstante, no es plano, ya que  $K_{4,4}$  puede contraerse a  $K_{3,3}$ .

3. Razona si  $G$  es un grafo de Euler y, en caso afirmativo, aplica el algoritmo dado en clase para calcular un circuito de Euler.

Sí es de Euler, puesto que todos los vértices son de grado par. Un posible circuito de Euler es:

$$1 \rightarrow x \rightarrow x^2 \rightarrow x^3 \rightarrow x^3y \rightarrow x^2y \rightarrow xy \rightarrow y \rightarrow 1 \rightarrow x^3 \rightarrow xy \rightarrow x \rightarrow x^3y \rightarrow y \rightarrow x^2 \rightarrow x^2y \rightarrow 1$$

**Ejercicio 1.1.34.** Se considera el grupo  $D_4 = \langle r, s \mid r^4 = 1, s^2 = 1, sr = r^{-1}s \rangle$  y el grafo  $G$  cuyos vértices son los elementos de  $D_4$  y en el que, para cualquier  $a \in D_4$ , hay un lado entre  $a$  y  $ar$  y también un lado entre  $a$  y  $as$ .

1. Comprueba que  $G$  es un grafo regular dando la sucesión de grados de sus vértices y calcula su matriz de adyacencia.

Calculamos los elementos de  $D_4$ :

$$D_4 = \{1, r, r^2, r^3, s, rs, r^2s, r^3s\}$$




Figura 1.40: Grafo  $G$  del ejercicio 1.1.34.

El grafo es el de la Figura 1.40.

Su matriz de adyacencia es:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Por tanto, su sucesión de grados es:

$$0, 0, 0, 8, 0, 0, 0, 0$$

Se trata por tanto de un grafo regular de grado 3 y 8 vértices.

2. Razona si  $G$  es un grafo de Hamilton o plano.

Sí es de Hamilton, con un posible circuito:

$$1 \rightarrow r \rightarrow r^2 \rightarrow r^3 \rightarrow r^3s \rightarrow r^2s \rightarrow rs \rightarrow s \rightarrow 1$$

Además, en la Figura 1.40 se puede ver que  $G$  es plano.

3. Razona si  $G$  es un grafo de Euler y, en caso afirmativo, aplica el algoritmo dado en clase para calcular un circuito de Euler.

No es de Euler, puesto que hay más de dos vértices de grado impar.

**Ejercicio 1.1.35.** Se considera el grupo  $D_5 = \langle r, s \mid r^5 = 1, s^2 = 1, sr = r^{-1}s \rangle$  y el grafo  $G$  cuyos vértices son los elementos de  $D_5$  y en el que, para cualquier  $a \in D_5$ , hay un lado entre  $a$  y  $ar$  y también un lado entre  $a$  y  $as$ .

1. Calcula la sucesión de grados de  $G$  y razona si  $G$  es un grafo de Euler, de Hamilton o plano.




Figura 1.41: Grafo  $G$  del ejercicio 1.1.35.

Calculamos los elementos de  $D_5$ :

$$D_5 = \{1, r, r^2, r^3, r^4, s, rs, r^2s, r^3s, r^4s\}$$

El grafo es el de la Figura 1.41.

Tenemos que la sucesión de grados es:

$$0, 0, 0, 10, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0$$

Por tanto, se trata de un grafo regular de grado 3 y 10 vértices. Como hay más de dos vértices de grado impar, no es de Euler ni hay un camino de Euler. Además, en la Figura 1.41 se puede ver que  $G$  es plano. También es de Hamilton, con un posible circuito:

$$rs \rightarrow r^2s \rightarrow r^3s \rightarrow r^4s \rightarrow r^4 \rightarrow r^3 \rightarrow r^2 \rightarrow r \rightarrow 1 \rightarrow s \rightarrow rs$$

2. Considera un nuevo grafo  $G'$  obtenido añadiendo a  $G$  un nuevo vértice adyacente a todos los de  $G$ . Razona si  $G'$  es un grafo de Euler y, en caso afirmativo, aplica algún algoritmo dado en clase para calcular un circuito de Euler.

El grafo  $G'$  sí será de Euler, puesto que todos los vértices anteriores tendrán grado 4 y el nuevo vértice tendrá grado 10. Por tanto, será de Euler.

**Ejercicio 1.1.36.** Razona cuál es la respuesta correcta en cada una de las siguientes cuestiones. Todos los grafos a los que se hace referencia son simples (es decir, no tienen lazos ni lados paralelos).

1. La matriz

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

es la de adyacencia de un grafo que:




Figura 1.42: Grafo del ejercicio 1.1.36.1.

- a) Es de Euler.
- b) No es de Hamilton.
- c) Es plano.

El grafo en cuestión se encuentra en la Figura 1.42. Sabemos que no es de Euler por tener vértices de grado impar. No obstante, sí es de Hamilton, con el circuito:

$$v_1 \rightarrow v_2 \rightarrow v_3 \rightarrow v_4 \rightarrow v_5 \rightarrow v_1 \rightarrow v_3 \rightarrow v_5 \rightarrow v_4 \rightarrow v_2 \rightarrow v_1$$

Por último, veamos si es plano sabiendo que  $|E| = 9$  y  $|V| = 5$ . Como  $|V| = 5 < 6$ , ningún subgrafo suyo se puede contraer a  $K_{3,3}$ ; y como  $|E| = 9 < 10$ , no se puede contraer a  $K_5$ ; y por tanto es plano. Por tanto, la respuesta correcta es la **c**).

2. Un grafo plano conexo regular de grado 8 con 23 caras:

- a) No existe.
- b) Tiene 12 aristas.
- c) Tiene 9 vértices.

Por ser un grafo plano conexo, sabemos que:

$$|V| + 23 = 2 + |E|$$

Por ser regular de grado 8, sabemos que:

$$2|E| = 8|V| \implies |E| = 4|V|$$

Por tanto, sustituyendo en la primera ecuación, obtenemos:

$$|V| + 23 = 2 + 4|V| \implies 3|V| = 21$$

Por tanto,  $|V| = 7$ ; pero esto no es posible si es regular de grado 8. Por tanto, la respuesta correcta es la **a**).




Figura 1.43: Grafo del ejercicio 1.1.36.4.

3. Se tiene que:

- a) Un grafo que es de Euler y de Hamilton siempre es plano.
- b) Un grafo que es plano y de Euler siempre es de Hamilton.
- c) Ninguna de las respuestas anteriores es cierta.

La opción a) es falsa, y como contraejemplo podemos emplear  $K_5$ , que es de Euler y de Hamilton, pero no es plano. La opción b) es falsa, y como contraejemplo podemos emplear el grafo de la Figura 1.38, que es plano y de Euler, pero no es de Hamilton. Por tanto, la respuesta correcta es la c).

4. Se tiene que:

- a) La sucesión 5, 5, 4, 2, 2, 2 es la sucesión gráfica de un grafo plano.
- b) La sucesión 5, 5, 4, 4, 4, 4 es la sucesión gráfica de un grafo de Hamilton.
- c) La sucesión 5, 4, 4, 3, 3, 3 es la sucesión gráfica de un grafo de Euler.

En primer lugar, la sucesión de la opción a) no es gráfica, por lo que esta opción no es correcta. La sucesión de la opción c) tampoco es gráfica (puesto que el número de vértices de grado impar debe ser par), por lo que tampoco es correcta. Para comprobar que la sucesión de la opción b) es la asociada a un grafo de Hamilton, lo vemos representado en la Figura 1.43, y el circuito de Hamilton es:

$$v_1 \rightarrow v_2 \rightarrow v_3 \rightarrow v_4 \rightarrow v_6 \rightarrow v_5 \rightarrow v_1$$

**Ejercicio 1.1.37.** Considera el grupo simétrico  $S_4$  y el subgrupo suyo  $H = \langle (1\ 2\ 3) \rangle$ .

1. Construye el conjunto cociente  $S_4 / \sim_H$  de clases laterales por la derecha  $Hx$ ,  $x \in S_4$ .

Por el Teorema de Lagrange, sabemos que:

$$[S_4 : H] = |S_4 / \sim_H| = \frac{|S_4|}{|H|} = \frac{4!}{3} = 8$$




Figura 1.44: Grafo  $G$  del ejercicio 1.1.37.

Por tanto, hemos de encontrar 8 clases laterales por la derecha distintas:

$$\begin{aligned}
 H1 &= \langle (1\ 2\ 3) \rangle = \{1, (1\ 2\ 3), (1\ 3\ 2)\} = H(1\ 2\ 3) = H(1\ 3\ 2) \\
 H(1\ 2) &= \{(1\ 2), (1\ 3), (2\ 3)\} = H(1\ 3) = H(2\ 3) \\
 H(1\ 4) &= \{(1\ 4), (1\ 4\ 2\ 3), (1\ 4\ 3\ 2)\} = H(1\ 4\ 2\ 3) = H(1\ 4\ 3\ 2) \\
 H(2\ 4) &= \{(2\ 4), (1\ 2\ 4\ 3), (1\ 3\ 2\ 4)\} = H(1\ 2\ 4\ 3) = H(1\ 3\ 2\ 4) \\
 H(3\ 4) &= \{(3\ 4), (1\ 2\ 3\ 4), (1\ 3\ 4\ 2)\} = H(1\ 2\ 3\ 4) = H(1\ 3\ 4\ 2) \\
 H(1\ 2\ 4) &= \{(1\ 2\ 4), (1\ 3)(2\ 4), (2\ 4\ 3)\} = H(1\ 3)(2\ 4) = H(2\ 4\ 3) \\
 H(1\ 3\ 4) &= \{(1\ 3\ 4), (2\ 3\ 4), (1\ 2)(3\ 4)\} = H(2\ 3\ 4) = H(1\ 2)(3\ 4) \\
 H(1\ 4\ 2) &= \{(1\ 4\ 2), (1\ 4\ 3), (1\ 4)(2\ 3)\} = H(1\ 4\ 3) = H(1\ 4)(2\ 3)
 \end{aligned}$$

Por tanto, el conjunto cociente es:

$$S_4 / \sim_H = \{H1, H(1\ 2), H(1\ 4), H(2\ 4), H(3\ 4), H(1\ 2\ 4), H(1\ 3\ 4), H(1\ 4\ 2)\}$$

- Para cada clase  $Hx$  denotamos  $n(Hx)$  al mínimo común múltiplo de los órdenes de los elementos en  $Hx$ . Considera el grafo  $G$  con vértices las clases  $Hx$  y en el que hay un lado entre  $Hx$  e  $Hy$  si  $n(Hx)$  divide a  $n(Hy)$  o  $n(Hy)$  divide a  $n(Hx)$ . Identifica el grafo  $G$  dando la sucesión de grados de sus vértices y su matriz de adyacencia. ¿Es  $G$  de Euler, de Hamilton o plano?

Tenemos que:

$$\begin{aligned}
 n(H1) &= 3 & n(H(1\ 2)) &= 2 \\
 n(H(1\ 4)) &= n(H(2\ 4)) = n(H(3\ 4)) &= 4 \\
 n(H(1\ 2\ 4)) &= n(H(1\ 3\ 4)) = n(H(1\ 4\ 2)) &= 6
 \end{aligned}$$

El grafo es el de la Figura 1.44.

La sucesión de grados de dicho grafo  $G$  es:

$$\{D_0(G), D_1(G), D_2(G), D_3(G), D_4(G), D_5(G), D_6(G), D_7(G)\} = \{0, 0, 0, 4, 3, 0, 1, 0\}$$

Su matriz de Adyacencia, considerando la numeración

$$H1, H(1\ 2), H(1\ 4), H(2\ 4), H(3\ 4), H(1\ 2\ 4), H(1\ 3\ 4), H(1\ 4\ 2)$$

es la siguiente:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Como vemos, este grafo sí es plano. Además, como tiene vértices de grado impar, no es de Euler. Por último, tampoco es de Hamilton, pues el vértice  $H(1\ 2)$  divide al grafo en dos componentes conexas, por lo que habría que pasar por él dos veces para hacer un circuito de Hamilton.

3. Considera, si es posible, un subgrafo  $G'$  de  $G$  obtenido al suprimir una arista entre dos vértices de  $G$  de grado impar. ¿Es  $G'$  de Euler? ¿Hay un camino de Euler entre dos vértices de  $G'$ ? En caso afirmativo aplica algún algoritmo dado en clase para calcular un circuito o camino de Euler en  $G'$ .

Supongamos que quitamos la arista entre  $H(2\ 4)$  y  $H(1\ 4)$ . Entonces, todos los vértices de  $G'$  tendrán grado par a excepción de dos de ellos,  $H(3\ 4)$  y  $H1$ . Por tanto,  $G'$  no es de Euler pero sí admite un camino de Euler entre esos dos nodos. Este por ejemplo sería:

$$H(3\ 4) \rightarrow H(1\ 2) \rightarrow H(1\ 4) \rightarrow H(3\ 4) \rightarrow H(2\ 4) \rightarrow H(1\ 2) \rightarrow H(1\ 4\ 2) \rightarrow H1 \rightarrow H(1\ 3\ 4) \rightarrow H(1\ 4\ 2) \rightarrow H(1\ 2\ 4) \rightarrow H(1\ 3\ 4) \rightarrow H(1\ 2) \rightarrow H(1\ 2\ 4) \rightarrow H1$$

**Ejercicio 1.1.38.** Se considera el grupo  $A_4$  y su subgrupo  $H = \langle (1\ 2)(3\ 4) \rangle$ . Se considera el grafo  $G$  con vértices las clases laterales por la izquierda de  $H$  en  $A_4$ ,  $xH$ , y en el que hay un lado entre  $xH$  e  $yH$  si  $m(xH)$  divide a  $m(yH)$  o  $m(yH)$  divide a  $m(xH)$ , donde  $m(Hx)$  denota el máximo común divisor de los órdenes de los elementos en  $xH$ . Razone cuál de las siguientes es la respuesta correcta:

- a)  $G$  es plano pero no es de Hamilton.
- b)  $G$  no es plano y tiene dos vértices conectados por un camino de Euler.
- c)  $G$  es de Hamilton pero no es de Euler.

Por el Teorema de Lagrange, sabemos que:

$$[A_4 : H] = |A_4 / H \sim| = \frac{|A_4|}{|H|} = \frac{12}{2} = 6$$




Figura 1.45: Grafo  $G$  del ejercicio 1.1.38.

Por tanto, hemos de encontrar 6 clases laterales por la izquierda distintas:

$$\begin{aligned}
 1H &= \{1, (1\ 2)(3\ 4)\} = (1\ 2)(3\ 4)H \\
 (1\ 3)(2\ 4)H &= \{(1\ 3)(2\ 4), (1\ 4)(2\ 3)\} = (1\ 4)(2\ 3)H \\
 (1\ 2\ 3)H &= \{(1\ 2\ 3), (1\ 3\ 4)\} = (1\ 3\ 4)H \\
 (1\ 2\ 4)H &= \{(1\ 2\ 4), (1\ 4\ 3)\} = (1\ 4\ 3)H \\
 (1\ 3\ 2)H &= \{(1\ 3\ 2), (2\ 3\ 4)\} = (2\ 3\ 4)H \\
 (1\ 4\ 2)H &= \{(1\ 4\ 2), (2\ 4\ 3)\} = (2\ 4\ 3)H
 \end{aligned}$$

Por tanto, el conjunto cociente es:

$$A_4 /_H \sim = \{1H, (1\ 3)(2\ 4)H, (1\ 2\ 3)H, (1\ 2\ 4)H, (1\ 3\ 2)H, (1\ 4\ 2)H\}$$

Tenemos que:

$$\begin{aligned}
 m(1H) &= 1 & m((1\ 3)(2\ 4)H) &= 2 \\
 m((1\ 2\ 3)H) &= m((1\ 2\ 4)H) = m((1\ 3\ 2)H) = m((1\ 4\ 2)H) &= 3
 \end{aligned}$$

El grafo es el de la Figura 1.45. Sabemos que no es de Hamilton por tener un vértice de grado 1. Además, no es plano, pues un subgrafo suyo es  $K_5$ . Aunque no es de Euler por tener vértices de grado impar, sí tiene un camino de Euler entre  $(1\ 3)(2\ 4)H$  y  $1H$ , puesto que son los únicos vértices de grado impar. Por tanto, la respuesta correcta es la **b**).

**Ejercicio 1.1.39.** Considera el grupo simétrico  $S_4$  y el subgrupo suyo  $H = \langle (1\ 2\ 3\ 4) \rangle$ .

1. Construye el conjunto cociente  $S_4 /_H \sim$  de clases laterales por la izquierda  $xH$ . ¿Es  $H < S_4$ ?

Por el Teorema de Lagrange, sabemos que:

$$[S_4 : H] = |S_4 /_H \sim| = \frac{|S_4|}{|H|} = \frac{4!}{4} = 6$$

Por tanto, hemos de encontrar 6 clases laterales por la izquierda distintas:

$$\begin{aligned} 1H &= \{1, (1\ 2\ 3\ 4), (1\ 3)(2\ 4), (1\ 4\ 3\ 2)\} = (1\ 2\ 3\ 4)H = (1\ 3)(2\ 4)H = (1\ 4\ 3\ 2)H \\ (1\ 2)H &= \{(1\ 2), (2\ 3\ 4), (1\ 3\ 2\ 4), (1\ 4\ 3)\} = (2\ 3\ 4)H = (1\ 3\ 2\ 4)H = (1\ 4\ 3)H \\ (1\ 3)H &= \{(1\ 3), (1\ 2)(3\ 4), (2\ 4), (1\ 4)(2\ 3)\} = (1\ 2)(3\ 4)H = (2\ 4)H = (1\ 4)(2\ 3)H \\ (1\ 4)H &= \{(1\ 4), (1\ 2\ 3), (1\ 3\ 4\ 2), (2\ 4\ 3)\} = (1\ 2\ 3)H = (1\ 3\ 4\ 2)H = (2\ 4\ 3)H \\ (2\ 3)H &= \{(2\ 3), (1\ 3\ 4), (1\ 2\ 4\ 3), (1\ 4\ 2)\} = (1\ 3\ 4)H = (1\ 2\ 4\ 3)H = (1\ 4\ 2)H \\ (3\ 4)H &= \{(3\ 4), (1\ 2\ 4), (1\ 4\ 2\ 3), (1\ 3\ 2)\} = (1\ 2\ 4)H = (1\ 4\ 2\ 3)H = (1\ 3\ 2)H \end{aligned}$$

Por tanto, el conjunto cociente es:

$$S_4 /_H \sim = \{1H, (1\ 2)H, (1\ 3)H, (1\ 4)H, (2\ 3)H, (3\ 4)H\}$$

2. Para cada clase  $xH$  denotamos  $m(xH)$  al máximo común divisor de los órdenes de los elementos en  $xH$ . Considera el grafo  $G$  con vértices las clases  $xH$  y en el que hay un lado entre dos clases  $xH$  e  $yH$  si  $m(xH) = m(yH)$ . Identifica el grafo  $G$  dando la sucesión de grados de sus vértices y su matriz de adyacencia. ¿Es  $G$  de Euler, de Hamilton o plano?

Calculamos  $m(xH)$  para cada clase:

$$\begin{aligned} m(1H) &= m((1\ 2)H) = m((1\ 4)H) = m((2\ 3)H) = m((3\ 4)H) = 1 \\ m((1\ 3)H) &= 2 \end{aligned}$$

Por tanto, el grafo consiste de  $K_5$  con un vértice adicional ( $(1\ 3)H$ ) aislado. Por tanto, el grafo no es plano, ni de Euler ni de Hamilton. La sucesión de grados de dicho grafo  $G$  es:

$$\{D_0(G), D_1(G), D_2(G), D_3(G), D_4(G), D_5(G)\} = \{1, 0, 0, 0, 5, 0\}$$

Su matriz de Adyacencia, considerando la numeración

$$1H, (1\ 2)H, (1\ 4)H, (2\ 3)H, (3\ 4)H, (1\ 3)H$$

es la siguiente:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

3. Considera el subgrafo  $G'$  obtenido a partir de  $G$  eliminando la clase  $(1\ 3)H$ . ¿Es  $G'$  de Euler?

El grafo resultante es  $K_5$ , que sabemos que sí es de Euler.

**Ejercicio 1.1.40.** Razona cuál es la respuesta correcta en cada una de las siguientes cuestiones. Todos los grafos a los que se hace referencia son simples (es decir, no tienen lazos ni lados paralelos).

1. Se tiene que:

a) Hay un grafo conexo regular de grado 6 con 22 caras y 24 aristas.

Como menciona caras, suponemos que es plano. Por tanto, tenemos que:

$$|V| + 22 = 2 + 24 \implies |V| = 4$$

Comprobemos ahora que se cumple el Lema del Apretón de Manos:

$$\sum_{v \in V} \deg v = 6 \cdot |V| = 24 \neq 48 = 2 \cdot |E|$$

Por tanto, esta opción no es correcta.

b) La sucesión 4, 4, 4, 3, 3 es la sucesión gráfica de un grafo plano que tiene un camino de Euler entre dos vértices.

Esta opción es correcta; ya que se trata de  $K_5$  quitándole una arista. Como  $K_5$  es de Euler, el camino buscado será el ciclo de Euler de  $K_5$  sin cerrarlo.

c) Un grafo conexo y plano es de Euler si y solo si es de Hamilton.

Esta opción es incorrecta, puesto que  $K_4$  es conexo, plano y de Hamilton, pero no es de Euler.

2. La matriz

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

es la de adyacencia de un grafo:

a) Con 11 aristas y que es de Euler y de Hamilton.

b) Que es conexo y plano pero no de Hamilton.

c) Que no es de Hamilton ni plano ni de Euler.

El grafo descrito es  $K_5$  al que le hemos añadido un vértice adicional conectado mediante una única arista a uno de los vértices de  $K_5$ . Como dicho vértice tiene grado 1, entonces el grafo no es de Euler ni de Hamilton. Además, como un subgrafo suyo es  $K_5$ , en particular dicho subgrafo se puede contraer a  $K_5$ , por lo que tampoco es plano. Por tanto, la opción correcta es la c).

**Ejercicio 1.1.41** (Parcial DGIIM 2024/24). Considera el grupo simétrico  $S_4$  y el subgrupo suyo  $H = \langle (1\ 3\ 4) \rangle$ .

1. Construye el conjunto cociente  $S_4 / \sim_H$  de clases laterales por la derecha  $Hx$ ,  $x \in S_4$ .

Por el Teorema de Lagrange, sabemos que:

$$[S_4 : H] = |S_4 / \sim_H| = \frac{|S_4|}{|H|} = \frac{4!}{3} = 8$$

Por tanto, hemos de encontrar 8 clases laterales por la derecha distintas:

$$\begin{aligned} H1 &= \{1, (1\ 3\ 4), (1\ 4\ 3)\} = H(1\ 3\ 4) = H(1\ 4\ 3) \\ H(1\ 2) &= \{(1\ 2), (1\ 2\ 3\ 4), (1\ 2\ 4\ 3)\} = H(1\ 2\ 3\ 4) = H(1\ 2\ 4\ 3) \\ H(1\ 3) &= \{(1\ 3), (1\ 4), (3\ 4)\} = H(1\ 4) = H(3\ 4) \\ H(2\ 3) &= \{(2\ 3), (1\ 3\ 2\ 4), (1\ 4\ 3\ 2)\} = H(1\ 3\ 2\ 4) = H(1\ 4\ 3\ 2) \\ H(2\ 4) &= \{(2\ 4), (1\ 3\ 4\ 2), (1\ 4\ 2\ 3)\} = H(1\ 3\ 4\ 2) = H(1\ 4\ 2\ 3) \\ H(1\ 2\ 3) &= \{(1\ 2\ 3), (1\ 2\ 4), (1\ 2)(3\ 4)\} = H(1\ 2\ 4) = H(1\ 2)(3\ 4) \\ H(1\ 3\ 2) &= \{(1\ 3\ 2), (1\ 4)(2\ 3), (2\ 4\ 3)\} = H(1\ 4)(2\ 3) = H(2\ 4\ 3) \\ H(1\ 4\ 2) &= \{(1\ 4\ 2), (2\ 3\ 4), (1\ 3)(2\ 4)\} = H(2\ 3\ 4) = H(1\ 3)(2\ 4) \end{aligned}$$

Por tanto, el conjunto cociente es:

$$S_4 / \sim_H = \{H1, H(1\ 2), H(1\ 3), H(2\ 3), H(2\ 4), H(1\ 2\ 3), H(1\ 3\ 2), H(1\ 4\ 2)\}$$

2. Para cada clase  $Hx$  denotamos  $n(Hx)$  al mínimo común múltiplo de los órdenes de los elementos en  $Hx$ . Considera el grafo  $G$  con vértices las clases  $Hx$  y en el que hay un lado entre  $Hx$  y  $Hy$  si  $n(Hx)$  divide a  $n(Hy)$  o  $n(Hy)$  divide a  $n(Hx)$ . Identifica el grafo  $G$  dando la sucesión de grados de sus vértices y su matriz de adyacencia.

Calculamos  $n(Hx)$  para cada clase:

$$\begin{aligned} n(H1) &= 3 & n(H(1\ 3)) &= 2 \\ n(H(1\ 2)) &= n(H(2\ 3)) = n(H(2\ 4)) &= 4 \\ n(H(1\ 2\ 3)) &= n(H(1\ 3\ 2)) = n(H(1\ 4\ 2)) &= 6 \end{aligned}$$

El grafo es el de la Figura 1.46.

La sucesión de grados de dicho grafo  $G$  es:

$$\{D_0(G), D_1(G), D_2(G), D_3(G), D_4(G), D_5(G), D_6(G), D_7(G)\} = \{0, 0, 0, 4, 3, 0, 1, 0\}$$

Su matriz de Adyacencia, considerando la numeración

$$H1, H(1\ 3), H(2\ 4), H(1\ 2), H(2\ 3), H(1\ 2\ 3), H(1\ 3\ 2), H(1\ 4\ 2)$$

es la siguiente:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$




Figura 1.46: Grafo  $G$  del ejercicio 1.1.41.

3. ¿Hay alguna condición suficiente que asegure que  $G$  es de Hamilton? ¿Y necesaria para ser plano? ¿Es  $G$  de Euler, de Hamilton o plano?

No, no verifica ninguna de las dos, puesto que  $G$  no es de Hamilton. No obstante, sí es plano, por lo que verifica las condiciones necesarias para ser plano. Por último, puesto que tiene vértices de grado impar, no es de Euler.

4. Considera el subgrafo  $G'$  de  $G$  obtenido al suprimir la arista entre las clases  $H(2 3)$  y  $H(2 4)$ . ¿Es  $G'$  de Hamilton, plano o de Euler? ¿Hay un camino de Euler entre dos vértices de  $G'$ ? En caso afirmativo aplica algún algoritmo dado en clase para calcular un circuito o camino de Euler en  $G'$ .

Sigue sin ser de Euler ni de Hamilton, aunque sí es plano. De nuevo, sí hay un camino de Euler entre  $H(1 2)$  y  $H1$ . Este sería:

$$\begin{aligned}
 &H(1 2) \rightarrow H(2 4) \rightarrow H(1 3) \rightarrow H(1 2) \rightarrow H(2 3) \rightarrow H(1 3) \rightarrow H(1 4 2) \rightarrow H1 \rightarrow \\
 &\rightarrow H(1 3 2) \rightarrow H(1 4 2) \rightarrow H(1 2 3) \rightarrow H(1 3) \rightarrow H(1 3 2) \rightarrow H(1 2 3) \rightarrow H1
 \end{aligned}$$

## 1.2. Grupos: generalidades y ejemplos

**Ejercicio 1.2.1.** Describir explícitamente la tabla de multiplicar de los grupos  $\mathbb{Z}_n^\times$  para  $n = 4$ ,  $n = 6$  y  $n = 8$ , donde por  $\mathbb{Z}_n^\times$  denotamos al grupo de las unidades del anillo  $\mathbb{Z}_n$ .

Sabemos que, fijado  $n \in \mathbb{N}$ , las unidades del anillo  $\mathbb{Z}_n$  son:

$$\mathcal{U}(\mathbb{Z}_n) = \mathbb{Z}_n^\times = \{a \in \mathbb{Z}_n \mid \text{mcd}(a, n) = 1\}$$

Describamos entonces a continuación las tablas de multiplicar de los grupos  $\mathbb{Z}_4^\times$ ,  $\mathbb{Z}_6^\times$  y  $\mathbb{Z}_8^\times$ .

- Para  $n = 4$ :

$\cdot$	1	3
1	1	3
3	3	1

- Para  $n = 6$ :

$\cdot$	1	5
1	1	5
5	5	1

- Para  $n = 8$ :

$\cdot$	1	3	5	7
1	1	3	5	7
3	3	1	7	5
5	5	7	1	3
7	7	5	3	1

**Ejercicio 1.2.2.** Describir explícitamente la tabla de multiplicar de los grupos  $\mathbb{Z}_p^\times$  para  $p = 2$ ,  $p = 3$ ,  $p = 5$  y  $p = 7$ .

- Para  $p = 2$ :

$\cdot$	1
1	1

- Para  $p = 3$ :

$\cdot$	1	2
1	1	2
2	2	1

- Para  $p = 5$ :

$\cdot$	1	2	3	4
1	1	2	3	4
2	2	4	1	3
3	3	1	4	2
4	4	3	2	1

- Para  $p = 7$ :

·	1	2	3	4	5	6
1	1	2	3	4	5	6
2	2	4	6	1	3	5
3	3	6	2	5	1	4
4	4	1	5	2	6	3
5	5	3	1	6	4	2
6	6	5	4	3	2	1

**Ejercicio 1.2.3.** Calcular el inverso de 7 en los grupos  $\mathbb{Z}_{11}^\times$  y  $\mathbb{Z}_{37}^\times$ .

Para calcular el inverso de un elemento  $a$  en un grupo  $\mathbb{Z}_n^\times$ , basta con encontrar un elemento  $b$  tal que  $ab = 1$  en  $\mathbb{Z}_n$ .

- Para  $\mathbb{Z}_{11}^\times$ :

$$7 \cdot 8 = 56 = 1 \implies 7^{-1} = 8$$

- Para  $\mathbb{Z}_{37}^\times$ :

$$7 \cdot 16 = 112 = 1 \implies 7^{-1} = 16$$

**Ejercicio 1.2.4.** Describir explícitamente los grupos  $\mu_n$  (de raíces  $n$ -ésimas de la unidad) para  $n = 3$ ,  $n = 4$  y  $n = 8$ , dando su tabla de multiplicar.

- Para  $n = 3$ :

$$\begin{aligned} \mu_3 &= \left\{ 1, \xi_3, \xi_3^2 \mid \xi_3 = \cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) + i \operatorname{sen}\left(\frac{2\pi}{3}\right) \right\} = \\ &= \left\{ 1, -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2} \right\} \end{aligned}$$

·	1	$\xi_3$	$\xi_3^2$
1	1	$\xi_3$	$\xi_3^2$
$\xi_3$	$\xi_3$	$\xi_3^2$	1
$\xi_3^2$	$\xi_3^2$	1	$\xi_3$

- Para  $n = 4$ :

$$\begin{aligned} \mu_4 &= \left\{ 1, \xi_4, \xi_4^2, \xi_4^3 \mid \xi_4 = \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) + i \operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{2}\right) \right\} = \\ &= \left\{ 1, \xi_4, \xi_4^2, \xi_4^3 \mid \xi_4 = i \right\} = \{1, i, -1, -i\} \end{aligned}$$

·	1	$i$	-1	-i
1	1	$i$	-1	-i
$i$	$i$	-1	-i	1
-1	-1	-i	1	$i$
-i	-i	1	$i$	-1

▪ Para  $n = 8$ :

$$\begin{aligned} \mu_8 &= \left\{ 1, \xi_8, \xi_8^2, \xi_8^3, \xi_8^4, \xi_8^5, \xi_8^6, \xi_8^7 \mid \xi_8 = \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) + i \operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{4}\right) \right\} = \\ &= \left\{ 1, \xi_8, \xi_8^2, \xi_8^3, \xi_8^4, \xi_8^5, \xi_8^6, \xi_8^7 \mid \xi_8 = \frac{1}{\sqrt{2}} + i \frac{1}{\sqrt{2}} \right\} = \\ &= \left\{ 1, \frac{1}{\sqrt{2}} + i \frac{1}{\sqrt{2}}, i, -\frac{1}{\sqrt{2}} + i \frac{1}{\sqrt{2}}, -1, -\frac{1}{\sqrt{2}} - i \frac{1}{\sqrt{2}}, -i, \frac{1}{\sqrt{2}} - i \frac{1}{\sqrt{2}} \right\} \end{aligned}$$

$\cdot$	1	$\xi_8$	$\xi_8^2$	$\xi_8^3$	$\xi_8^4$	$\xi_8^5$	$\xi_8^6$	$\xi_8^7$
1	1	$\xi_8$	$i$	$\xi_8^3$	-1	$\xi_8^5$	- $i$	$\xi_8^7$
$\xi_8$	$\xi_8$	$i$	$\xi_8^3$	-1	$\xi_8^5$	- $i$	$\xi_8^7$	1
$\xi_8^2$	$i$	$\xi_8^3$	-1	$\xi_8^5$	- $i$	$\xi_8^7$	1	$\xi_8$
$\xi_8^3$	$\xi_8^3$	-1	$\xi_8^5$	- $i$	$\xi_8^7$	1	$\xi_8$	$i$
$\xi_8^4$	-1	$\xi_8^5$	- $i$	$\xi_8^7$	1	$\xi_8$	$i$	$\xi_8^3$
$\xi_8^5$	$\xi_8^5$	- $i$	$\xi_8^7$	1	$\xi_8$	$i$	$\xi_8^3$	-1
$\xi_8^6$	- $i$	$\xi_8^7$	1	$\xi_8$	$i$	$\xi_8^3$	-1	$\xi_8^5$
$\xi_8^7$	$\xi_8^7$	1	$\xi_8$	$i$	$\xi_8^3$	-1	$\xi_8^5$	- $i$

**Ejercicio 1.2.5.** En el conjunto  $\mathbb{Q}^\times := \{q \in \mathbb{Q} \mid q \neq 0\}$  de los números racionales no nulos, se considera la operación de división, dada por  $(x, y) \mapsto x/y = xy^{-1}$ . ¿Nos da esta operación una estructura de grupo en  $\mathbb{Q}^\times$ ?

Veamos qué condiciones han de cumplirse para que se tenga la propiedad asociativa. Sean  $a, b, c \in \mathbb{Q}^\times$ , entonces:

$$\frac{a/b}{c} = \frac{a}{b/c} \iff \frac{a}{bc} = \frac{ac}{b} \iff ab = abc^2 \iff 1 = c^2$$

Por tanto, tomando por ejemplo  $2, 3, 4 \in \mathbb{Q}^\times$  no se tiene la propiedad asociativa, por lo que no se tiene un grupo.

**Ejercicio 1.2.6.** Sea  $G$  un grupo en el que  $x^2 = 1$  para todo  $x \in G$ . Demostrar que el grupo  $G$  es abeliano.

Dados  $x, y \in G$ , se tiene que:

$$\begin{aligned} (xy)(xy) &= (xy)^2 = 1 \implies (xy)^{-1} = xy \\ xy &= (xy)^{-1} = y^{-1}x^{-1} = yx \end{aligned}$$

Por tanto,  $xy = yx$  para todo  $x, y \in G$ , por lo que  $G$  es abeliano.

**Ejercicio 1.2.7.** Sea  $G$  un grupo. Demostrar que son equivalentes:

1.  $G$  es abeliano.
2.  $\forall x, y \in G$  se verifica que  $(xy)^2 = x^2y^2$ .
3.  $\forall x, y \in G$  se verifica que  $(xy)^{-1} = x^{-1}y^{-1}$ .

*Demostración.*

1  $\implies$  2) Dados  $x, y \in G$ , se tiene que:

$$(xy)^2 = xyxy \stackrel{(*)}{=} x^2y^2$$

donde en  $(*)$  se ha usado que  $G$  es abeliano.

2  $\implies$  1) Dados  $x, y \in G$ , se tiene que:

$$\begin{aligned} (xy)^2 &= (xy)(xy) = xyxy \\ &\stackrel{(*)}{=} x^2y^2 \end{aligned}$$

donde en  $(*)$  se ha usado la hipótesis. Por la propiedad cancelativa, se tiene que:

$$xyxy = x^2y^2 \implies xy = yx$$

Como se tiene para todo  $x, y \in G$ , entonces  $G$  es abeliano.

1  $\implies$  3) Dados  $x, y \in G$ , se tiene que:

$$(xy)^{-1} = y^{-1}x^{-1} \stackrel{(*)}{=} x^{-1}y^{-1}$$

donde en  $(*)$  se ha usado que  $G$  es abeliano.

3  $\implies$  1) Dados  $x, y \in G$ , tenemos que:

$$(xy)^{-1} \stackrel{(*)}{=} x^{-1}y^{-1} = (yx)^{-1} \implies ((xy)^{-1})^{-1} = ((yx)^{-1})^{-1} \implies xy = yx$$

donde en  $(*)$  se ha usado la hipótesis. Por tanto, como se tiene para todo  $x, y \in G$ , entonces  $G$  es abeliano.

□

**Ejercicio 1.2.8.** Demostrar que si en un grupo  $G$ ,  $x, y \in G$  verifican que  $xy = yx$  entonces, para todo  $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ , se tiene que  $(xy)^n = x^n y^n$ .

Demostramos por inducción sobre  $n$ .

- Caso base:  $n = 1$ .

$$(xy)^1 = xy = yx = x^1 y^1$$

- Paso inductivo: Supuesto cierto para  $n$ , veamos que se cumple para  $n + 1$ .

$$\begin{aligned} (xy)^{n+1} &= (xy)^n(xy) = x^n y^n xy \\ &= x^n xy^n x = x^{n+1} y^{n+1} \end{aligned}$$

Por tanto, por inducción, se tiene que  $(xy)^n = x^n y^n$  para todo  $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ .

**Ejercicio 1.2.9.** Demostrar que el conjunto de las aplicaciones  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ , tales que  $f(x) = ax + b$  para algún  $a, b \in \mathbb{R}$ ,  $a \neq 0$ , es un grupo con la composición como ley de composición.

Definimos el conjunto siguiente:

$$G = \{f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid \exists a, b \in \mathbb{R}, a \neq 0 \text{ tales que } f(x) = ax + b \forall x \in \mathbb{R}\}$$

En primer lugar, hemos de comprobar que  $G$  es cerrado bajo la composición de funciones, algo que tendremos gracias a ser  $\mathbb{R}$  cerrado para el producto y la suma. Dados  $f, g \in G$ , entonces existen  $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ ,  $a, c \neq 0$  tales que:

$$f(x) = ax + b, \quad g(x) = cx + d$$

Entonces, se tiene que:

$$\begin{aligned} (f \circ g)(x) &= f(g(x)) = a(cx + d) + b = acx + ad + b \in G \\ (g \circ f)(x) &= g(f(x)) = c(ax + b) + d = acx + cb + d \in G \end{aligned}$$

Por tanto,  $G$  es cerrado bajo la composición de funciones. Ahora, tomando  $a = 1$  y  $b = 0$ , se tiene que  $\text{Id}_{\mathbb{R}} \in G$ . Veamos que  $(G, \circ, \text{Id}_{\mathbb{R}})$  es un grupo.

- Asociatividad: Se tiene de forma directa por serlo la composición de funciones.
- Elemento neutro: Se tiene de forma directa.
- Elemento inverso: Dado  $f \in G$ , entonces existen  $a, b \in \mathbb{R}$ ,  $a \neq 0$  tales que  $f(x) = ax + b$ . Entonces, definimos su elemento inverso como:

$$f^{-1}(z) = a^{-1}(z - b) \in G$$

Comprobémoslo (notemos que tan solo hace falta comprobar que  $f \circ f^{-1} = \text{Id}_{\mathbb{R}}$ , puesto que en la definición no se impone  $f^{-1} \circ f = \text{Id}_{\mathbb{R}}$ ):

$$(f \circ f^{-1})(z) = a(a^{-1}(z - b)) + b = z \quad \forall z \in \mathbb{R}$$

Por tanto, para todo  $f \in G$ , existe  $f^{-1} \in G$  tal que  $f \circ f^{-1} = \text{Id}_{\mathbb{R}}$ .

**Ejercicio 1.2.10.**

1. Demostrar que  $|\text{GL}_2(\mathbb{Z}_2)| = 6$ , describiendo explícitamente todos los elementos que forman este grupo.

Sea  $A \in \text{GL}_2(\mathbb{Z}_2)$ :

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \implies |A| = ad - bc \neq 0 \implies ad \neq bc$$

Por tanto, los elementos de  $\text{GL}_2(\mathbb{Z}_2)$  son:

$$\begin{aligned} A_1 &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, & A_2 &= \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, & A_3 &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \\ A_4 &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, & A_5 &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, & A_6 &= \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

2. Sea  $\alpha = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$  y  $\beta = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ . Demostrar que

$$\text{GL}_2(\mathbb{Z}_2) = \{1, \alpha, \alpha^2, \beta, \alpha\beta, \alpha^2\beta\}.$$

Tenemos que:

$$1 = A_1, \quad \alpha = A_5, \quad \alpha^2 = A_6, \quad \beta = A_4, \quad \alpha\beta = A_3, \quad \alpha^2\beta = A_2$$

3. Escribir, utilizando la representación anterior, la tabla de multiplicar de  $\text{GL}_2(\mathbb{Z}_2)$ .

·	1	$\alpha$	$\alpha^2$	$\beta$	$\alpha\beta$	$\alpha^2\beta$
1	1	$\alpha$	$\alpha^2$	$\beta$	$\alpha\beta$	$\alpha^2\beta$
$\alpha$	$\alpha$	$\alpha^2$	1	$\alpha\beta$	$\alpha^2\beta$	$\beta$
$\alpha^2$	$\alpha^2$	1	$\alpha$	$\alpha^2\beta$	$\beta$	$\alpha\beta$
$\beta$	$\beta$	$\alpha^2\beta$	$\alpha\beta$	1	$\alpha^2$	$\alpha$
$\alpha\beta$	$\alpha\beta$	$\beta$	$\alpha^2\beta$	$\alpha$	1	$\alpha^2$
$\alpha^2\beta$	$\alpha^2\beta$	$\alpha\beta$	$\beta$	$\alpha^2$	$\alpha$	1

**Ejercicio 1.2.11.** Dar las tablas de grupo para los grupos  $D_3$ ,  $D_4$ ,  $D_5$  y  $D_6$ .

Recordamos que:

$$D_n = \langle r, s \mid r^n = s^2 = 1, rs = sr^{-1} \rangle$$

■ Para  $D_3$ :

·	1	$r$	$r^2$	$s$	$sr$	$sr^2$
1	1	$r$	$r^2$	$s$	$sr$	$sr^2$
$r$	$r$	$r^2$	1	$sr^2$	$s$	$sr$
$r^2$	$r^2$	1	$r$	$sr$	$sr^2$	$s$
$s$	$s$	$sr$	$sr^2$	1	$r$	$r^2$
$sr$	$sr$	$sr^2$	$s$	$r^2$	1	$r$
$sr^2$	$sr^2$	$s$	$sr$	$r$	$r^2$	1

■ Para  $D_4$ :

·	1	$r$	$r^2$	$r^3$	$s$	$sr$	$sr^2$	$sr^3$
1	1	$r$	$r^2$	$r^3$	$s$	$sr$	$sr^2$	$sr^3$
$r$	$r$	$r^2$	$r^3$	1	$sr^3$	$s$	$sr$	$sr^2$
$r^2$	$r^2$	$r^3$	1	$r$	$sr^2$	$sr^3$	$s$	$sr$
$r^3$	$r^3$	1	$r$	$r^2$	$sr$	$sr^2$	$sr^3$	$s$
$s$	$s$	$sr$	$sr^2$	$sr^3$	1	$r$	$r^2$	$r^3$
$sr$	$sr$	$sr^2$	$sr^3$	$s$	$r^3$	1	$r$	$r^2$
$sr^2$	$sr^2$	$sr^3$	$s$	$sr$	$r^2$	$r^3$	1	$r$
$sr^3$	$sr^3$	$s$	$sr$	$sr^2$	$r$	$r^2$	$r^3$	1

- Para  $D_5$ :

·	1	$r$	$r^2$	$r^3$	$r^4$	$s$	$sr$	$sr^2$	$sr^3$	$sr^4$
1	1	$r$	$r^2$	$r^3$	$r^4$	$s$	$sr$	$sr^2$	$sr^3$	$sr^4$
$r$	$r$	$r^2$	$r^3$	$r^4$	1	$sr^4$	$s$	$sr$	$sr^2$	$sr^3$
$r^2$	$r^2$	$r^3$	$r^4$	1	$r$	$sr^3$	$sr^4$	$s$	$sr$	$sr^2$
$r^3$	$r^3$	$r^4$	1	$r$	$r^2$	$sr^2$	$sr^3$	$sr^4$	$s$	$sr$
$r^4$	$r^4$	1	$r$	$r^2$	$r^3$	$sr$	$sr^2$	$sr^3$	$sr^4$	$s$
$s$	$s$	$sr$	$sr^2$	$sr^3$	$sr^4$	1	$r$	$r^2$	$r^3$	$r^4$
$sr$	$sr$	$sr^2$	$sr^3$	$sr^4$	$s$	$r^4$	1	$r$	$r^2$	$r^3$
$sr^2$	$sr^2$	$sr^3$	$sr^4$	$s$	$sr$	$r^3$	$r^4$	1	$r$	$r^2$
$sr^3$	$sr^3$	$sr^4$	$s$	$sr$	$sr^2$	$r^2$	$r^3$	$r^4$	1	$r$
$sr^4$	$sr^4$	$s$	$sr$	$sr^2$	$sr^3$	$r$	$r^2$	$r^3$	$r^4$	1

- Para  $D_6$ :

·	1	$r$	$r^2$	$r^3$	$r^4$	$r^5$	$s$	$sr$	$sr^2$	$sr^3$	$sr^4$	$sr^5$
1	1	$r$	$r^2$	$r^3$	$r^4$	$r^5$	$s$	$sr$	$sr^2$	$sr^3$	$sr^4$	$sr^5$
$r$	$r$	$r^2$	$r^3$	$r^4$	$r^5$	1	$sr^5$	$s$	$sr$	$sr^2$	$sr^3$	$sr^4$
$r^2$	$r^2$	$r^3$	$r^4$	$r^5$	1	$r$	$sr^4$	$sr^5$	$s$	$sr$	$sr^2$	$sr^3$
$r^3$	$r^3$	$r^4$	$r^5$	1	$r$	$r^2$	$sr^3$	$sr^4$	$sr^5$	$s$	$sr$	$sr^2$
$r^4$	$r^4$	$r^5$	1	$r$	$r^2$	$r^3$	$sr^2$	$sr^3$	$sr^4$	$sr^5$	$s$	$sr$
$r^5$	$r^5$	1	$r$	$r^2$	$r^3$	$r^4$	$sr$	$sr^2$	$sr^3$	$sr^4$	$sr^5$	$s$
$s$	$s$	$sr$	$sr^2$	$sr^3$	$sr^4$	$sr^5$	1	$r$	$r^2$	$r^3$	$r^4$	$r^5$
$sr$	$sr$	$sr^2$	$sr^3$	$sr^4$	$sr^5$	$s$	$r^5$	1	$r$	$r^2$	$r^3$	$r^4$
$sr^2$	$sr^2$	$sr^3$	$sr^4$	$sr^5$	$s$	$sr$	$r^4$	$r^5$	1	$r$	$r^2$	$r^3$
$sr^3$	$sr^3$	$sr^4$	$sr^5$	$s$	$sr$	$sr^2$	$r^3$	$r^4$	$r^5$	1	$r$	$r^2$
$sr^4$	$sr^4$	$sr^5$	$s$	$sr$	$sr^2$	$sr^3$	$r^2$	$r^3$	$r^4$	$r^5$	1	$r$
$sr^5$	$sr^5$	$s$	$sr$	$sr^2$	$sr^3$	$sr^4$	$r$	$r^2$	$r^3$	$r^4$	$r^5$	1

**Ejercicio 1.2.12.** Demostrar que el conjunto de rotaciones respecto al origen del plano euclídeo junto con el conjunto de simetrías respecto a las rectas que pasan por el origen, es un grupo.

Denotamos por  $G$  al conjunto de rotaciones respecto al origen del plano euclídeo junto con el conjunto de simetrías respecto a las rectas que pasan por el origen. Notemos que no se trata de ningún grupo diédrico:

$$D_n \subsetneq G \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

En primer lugar, sería necesario demostrar que es cerrado por la composición, algo que dejamos como ejercicio al lector por ser competencia de Geometría II.

Además,  $\text{Id}_{\mathbb{R}^2} \in G$ . Veamos que  $(G, \circ, \text{Id}_{\mathbb{R}^2})$  es un grupo.

- Asociatividad: Se tiene de forma directa por serlo la composición de funciones.
- Elemento neutro: Se tiene de forma directa.
- Elemento inverso: Dado  $f \in G$ , veamos que existe  $f^{-1} \in G$  tal que se tiene  $f \circ f^{-1} = \text{Id}_{\mathbb{R}^2}$ .

- Si  $f$  es una rotación de ángulo  $\theta$  respecto al origen, entonces  $f^{-1}$  es la rotación de ángulo  $-\theta$  respecto al origen.
- Si  $f$  es una simetría respecto a una recta que pasa por el origen, entonces  $f^{-1}$  es la misma simetría.

En ambos casos, se tiene que  $f \circ f^{-1} = \text{Id}_{\mathbb{R}^2}$ .

Por tanto,  $(G, \circ, \text{Id}_{\mathbb{R}^2})$  es un grupo.

**Ejercicio 1.2.13.** Sea  $G$  un grupo y sean  $a, b \in G$  tales que  $ba = ab^k$ ,  $a^n = 1 = b^m$  con  $n, m > 0$ .

1. Demostrar que para todo  $i = 0, \dots, m - 1$  se verifica  $b^i a = ab^{ik}$ .

Demostramos para todo  $i \in \mathbb{N}$  por inducción sobre  $i$ .

- Caso base:  $i = 0$ .

$$b^0 a = a = ab^0$$

- Caso base:  $i = 1$ .

$$b^1 a = ba = ab^k = ab^{1 \cdot k}$$

- Paso inductivo: Supuesto cierto para  $i$ , veamos que se cumple para  $i + 1$ .

$$b^{i+1} a = bb^i a = bab^{ik} = ab^k b^{ik} = ab^{k(i+1)}$$

2. Demostrar que para todo  $j = 0, \dots, n - 1$  se verifica  $ba^j = a^j b^{kj}$ .

Demostramos para todo  $j \in \mathbb{N}$  por inducción sobre  $j$ .

- Caso base:  $j = 0$ .

$$ba^0 = b = a^0 b^{k^0}$$

- Caso base:  $j = 1$ .

$$ba = ab^k = a^1 b^{k^1}$$

- Paso inductivo: Supuesto cierto para  $j$ , veamos que se cumple para  $j + 1$ .

$$ba^{j+1} = ba^j a = a^j b^{kj} a \stackrel{(*)}{=} a^j ab^{kj k} = a^{j+1} b^{k^{j+1}}$$

donde en  $(*)$  se ha usado el apartado anterior.

3. Demostrar que para todo  $i = 0, \dots, m - 1$  y todo  $j = 0, \dots, n - 1$  se verifica  $b^i a^j = a^j b^{ik^j}$ .

Fijado  $i \in \mathbb{N}$ , demostramos por inducción sobre  $j$ .

- Caso base:  $j = 0$ .

$$b^i a^0 = b^i = a^0 b^{ik^0}$$

- Caso base:  $j = 1$ .

$$b^i a = ab^{ik} = a^1 b^{ik^1}$$

- Paso inductivo: Supuesto cierto para  $j$ , veamos que se cumple para  $j + 1$ .

$$b^i a^{j+1} = b^i a^j a = a^j b^{ik^j} a \stackrel{(*)}{=} a^j a b^{ik^j k} = a^{j+1} b^{ik^{j+1}}$$

donde en  $(*)$  se ha usado el apartado anterior.

Por tanto, se tiene para todo  $i, j \in \mathbb{N}$ .

4. Demostrar que todo elemento de  $\langle a, b \rangle$  puede escribirse como  $a^r b^s$  cumpliendo  $0 \leq r < n, 0 \leq s < m$ .

Dado  $x \in \langle a, b \rangle$ , entonces  $x$  es producto de elementos de  $\{a, b, a^{-1}, b^{-1}\}$ . Como  $a^n = 1 = b^m$ , entonces  $a^{-1} = a^{n-1}$  y  $b^{-1} = b^{m-1}$ . Por tanto, se tiene que  $x$  es producto de elementos de  $\{a, b\}$ . Usando el apartado anterior, podemos “llevar” los  $a$ 's a la izquierda y los  $b$ 's a la derecha, obteniendo lo siguiente:

$$x = a^{r'} b^{s'} \quad r', s' \in \mathbb{N} \cup \{0\}$$

Supuesto  $r' \geq n$ , sea  $r = r' \text{ mód } n$  ( $r' = nk + r$ ) y se tiene que:

$$a^{r'} = a^{nk+r} = (a^n)^k \cdot a^r = a^r$$

Además, se cumple que  $0 \leq r < n$ . Análogamente, supuesto  $s' \geq m$ , sea  $s = s' \text{ mód } m$  ( $s' = mk + s$ ) y se tiene que:

$$b^{s'} = b^{mk+s} = (b^m)^k \cdot b^s = b^s$$

Además, se cumple que  $0 \leq s < m$ . Por tanto:

$$x = a^{r'} b^{s'} = a^r b^s \quad 0 \leq r < n, 0 \leq s < m$$

*Observación.* Notemos que  $D_n$  es un caso particular de este grupo, donde:

$$a = r, \quad b = s, \quad k = n - 1, \quad m = 2, \quad n = n$$

**Ejercicio 1.2.14.** Sean  $s_1, s_2 \in S_7$  las permutaciones dadas por

$$s_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 5 & 7 & 6 & 2 & 1 & 4 & 3 \end{pmatrix}, \quad s_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 3 & 2 & 4 & 5 & 1 & 7 & 6 \end{pmatrix}.$$

Calcular los productos  $s_1 s_2, s_2 s_1$  y  $s_2^2$ , y su representación como producto de ciclos disjuntos.

En notación matricial, se tiene que:

$$\begin{aligned} s_1 s_2 &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 1 & 6 & 7 & 2 & 3 & 5 & 4 \end{pmatrix} \\ s_2 s_1 &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 6 & 7 & 2 & 1 & 5 & 3 & 4 \end{pmatrix} \\ s_2^2 &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 1 & 3 & 4 & 7 & 5 & 2 & 6 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Descomponiendo en ciclos disjuntos, se tiene que:

$$\begin{aligned} s_2 &= (1\ 5)(2\ 7\ 3\ 6\ 4) \\ s_1 &= (1\ 3\ 4\ 5)(6\ 7) \\ s_1s_2 &= (2\ 6\ 5\ 3\ 7\ 4) \\ s_2s_1 &= (1\ 6\ 3\ 2\ 7\ 4) \\ s_2^2 &= (2\ 3\ 4\ 7\ 6) \end{aligned}$$

**Ejercicio 1.2.15.** Dadas las permutaciones

$$p_1 = (1\ 3\ 2\ 8\ 5\ 9)(2\ 6\ 3), \quad p_2 = (1\ 3\ 6)(2\ 5\ 3)(1\ 9\ 2\ 8\ 5),$$

hallar la descomposición de la permutación producto  $p_1p_2$  como producto de ciclos disjuntos.

Usando la notación matricial, se tiene que:

$$p_1p_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 1 & 5 & 6 & 4 & 8 & 3 & 7 & 2 & 9 \end{pmatrix}$$

Descomponiendo en ciclos disjuntos, se tiene que:

$$p_1p_2 = (2\ 5\ 8)(3\ 6)$$

**Ejercicio 1.2.16.** Sean  $s_1, s_2, p_1$  y  $p_2$  las permutaciones dadas en los ejercicios anteriores.

*Observación.* Aquí tratamos a  $S_7$  como un subgrupo de  $S_9$ , donde consideramos cada permutación del conjunto  $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$  como una permutación del conjunto  $\{1, \dots, 9\}$  que deja fijos a los elementos 8 y 9.

1. Descomponer la permutación  $s_1s_2s_1s_2$  como producto de ciclos disjuntos.

$$\begin{aligned} s_1s_2s_1s_2 &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 1 & 5 & 4 & 6 & 7 & 3 & 2 & 8 & 9 \end{pmatrix} \\ &= (2\ 5\ 7)(3\ 4\ 6) \end{aligned}$$

2. Expresar matricialmente la permutación  $p_3 = p_2p_1p_2$  y obtener su descomposición como ciclos disjuntos.

$$\begin{aligned} p_3 = p_2p_1p_2 &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 9 & 3 & 1 & 4 & 6 & 2 & 7 & 8 & 5 \end{pmatrix} \\ &= (1\ 9\ 5\ 6\ 2\ 3) \end{aligned}$$

3. Descomponer la permutación  $s_2p_2$  como producto de ciclos disjuntos y expresarla matricialmente.

$$\begin{aligned} s_2p_2 &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 9 & 8 & 7 & 2 & 6 & 5 & 3 & 4 & 1 \end{pmatrix} \\ &= (1\ 9)(2\ 8\ 4)(3\ 7)(5\ 6) \end{aligned}$$

**Ejercicio 1.2.17.** Sean  $s_1, s_2, p_1$  y  $p_2$  las permutaciones dadas en los ejercicios anteriores.

1. Calcular el orden de la permutación producto  $s_1 s_2$ . ¿Coincide dicho orden con el producto de los órdenes de  $s_1$  y  $s_2$ ?

$$\begin{aligned} s_1 s_2 &= (2\ 6\ 5\ 3\ 7\ 4) \\ s_1 &= (1\ 3\ 4\ 5)(6\ 7) \\ s_2 &= (1\ 5)(2\ 7\ 3\ 6\ 4) \end{aligned}$$

Por el Corolario ??, se tiene que:

$$\begin{aligned} O(s_1 s_2) &= 6 \\ O(s_1) &= \text{mcm}(4, 2) = 4 \\ O(s_2) &= \text{mcm}(2, 5) = 10 \end{aligned}$$

Por tanto,  $O(s_1 s_2) \neq O(s_1)O(s_2)$ .

2. Calcular el orden de  $s_1(s_2)^{-1}(s_1)^{-1}$ .

$$\begin{aligned} s_1(s_2)^{-1}(s_1)^{-1} &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 3 & 5 & 1 & 6 & 7 & 2 & 4 \end{pmatrix} = \\ &= (1\ 3)(2\ 5\ 7\ 4\ 6) \implies O(s_1(s_2)^{-1}(s_1)^{-1}) = \text{mcm}(2, 5) = 10 \end{aligned}$$

3. Calcular la permutación  $(s_1)^{-1}$ , y expresarla como producto de ciclos disjuntos.

$$\begin{aligned} s_1 &= (1\ 3\ 4\ 5)(6\ 7) \\ (s_1)^{-1} &= (5\ 4\ 3\ 1)(7\ 6) \end{aligned}$$

4. Calcular la permutación  $(p_1)^{-1}$  y expresarla matricialmente.

$$\begin{aligned} p_1^{-1} &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 9 & 6 & 1 & 4 & 8 & 2 & 7 & 3 & 5 \end{pmatrix} = \\ &= (1\ 9\ 5\ 8\ 3)(2\ 6) \end{aligned}$$

5. Calcular la permutación  $p_2(s_2)^2(p_1)^{-1}$ . ¿Cuál es su orden?

$$\begin{aligned} p_2 &= (1\ 3\ 6)(2\ 5\ 3)(1\ 9\ 2\ 8\ 5) \\ (s_2)^2 &= (2\ 3\ 4\ 7\ 6) \\ (p_1)^{-1} &= (1\ 9\ 5\ 8\ 3)(2\ 6) \\ p_2(s_2)^2(p_1)^{-1} &= (1\ 3\ 6)(2\ 5\ 3)(1\ 9\ 2\ 8\ 5)(2\ 3\ 4\ 7\ 6)(1\ 9\ 5\ 8\ 3)(2\ 6) \\ &= (1\ 5\ 6\ 2\ 8\ 4\ 7)(3\ 9) \\ O(p_2(s_2)^2(p_1)^{-1}) &= \text{mcm}(7, 2) = 14 \end{aligned}$$

**Ejercicio 1.2.18.** Sean  $s_1, s_2, p_1$  y  $p_2$  las permutaciones dadas anteriormente. Sean también  $s_3 = (2\ 4\ 6)$  y  $s_4 = (1\ 2\ 7)(2\ 4\ 6\ 1)(5\ 3)$ . ¿Cuál es la paridad de las permutaciones  $s_1, s_4p_1p_2$  y  $p_2s_3$ ?

$$\begin{aligned} s_1 &= (1\ 3\ 4\ 5)(6\ 7) \\ s_4p_1p_2 &= (1\ 7)(2\ 3)(4\ 6\ 5\ 8) \\ p_2s_3 &= (1\ 9\ 5\ 3\ 2\ 4)(6\ 8) \end{aligned}$$

Por tanto:

$$\begin{aligned} \varepsilon(s_1) &= 1 \\ \varepsilon(s_4p_1p_2) &= -1 \\ \varepsilon(p_2s_3) &= 1 \end{aligned}$$

**Ejercicio 1.2.19.** En el grupo  $S_3$ , se consideran las permutaciones  $\sigma = (1\ 2\ 3)$  y  $\tau = (1\ 2)$ .

1. Demostrar que

$$S_3 = \{1, \sigma, \sigma^2, \tau, \sigma\tau, \sigma^2\tau\}.$$

Sabemos que  $|S_3| = 3! = 6$ . Dividimos  $S_3$  en dos conjuntos, uno con las permutaciones pares ( $P$ ) y otro con las impares ( $I$ ).

$$\begin{aligned} P &= \{1, \sigma, \sigma^2\} \\ I &= \{\tau, \sigma\tau, \sigma^2\tau\} \end{aligned}$$

Como  $O(\sigma) = 3$ , tenemos que las tres permutaciones pares son distintas. Supongamos ahora que dos permutaciones impares son iguales. Entonces, componiendo por la derecha con  $\tau^{-1}$ , obtenemos que dos permutaciones pares serían iguales, algo que hemos descartado. Por tanto, las tres permutaciones impares son distintas.

$$|P| = |I| = 3$$

Como una permutación par no puede ser igual a una impar, tenemos que  $P \cap I = \emptyset$ . Por tanto:

$$\left. \begin{array}{l} |P \cup I| = |P| + |I| = 6 = |S_3| \\ \wedge \\ P \cup I \subset S_3 \end{array} \right\} \implies S_3 = P \cup I$$

Por tanto,  $S_3 = \{1, \sigma, \sigma^2, \tau, \sigma\tau, \sigma^2\tau\}$ .

2. Reescribir la tabla de multiplicar de  $S_3$  empleando la anterior expresión de los elementos de  $S_3$ .

$\cdot$	1	$\sigma$	$\sigma^2$	$\tau$	$\sigma\tau$	$\sigma^2\tau$
1	1	$\sigma$	$\sigma^2$	$\tau$	$\sigma\tau$	$\sigma^2\tau$
$\sigma$	$\sigma$	$\sigma^2$	1	$\sigma\tau$	$\sigma^2\tau$	$\tau$
$\sigma^2$	$\sigma^2$	1	$\sigma$	$\sigma^2\tau$	$\tau$	$\sigma\tau$
$\tau$	$\tau$	$\sigma^2\tau$	$\sigma\tau$	1	$\sigma^2$	$\sigma$
$\sigma\tau$	$\sigma\tau$	$\tau$	$\sigma^2\tau$	$\sigma$	1	$\sigma^2$
$\sigma^2\tau$	$\sigma^2\tau$	$\sigma\tau$	$\tau$	$\sigma^2$	$\sigma$	1

3. Probar que

$$\sigma^3 = 1, \quad \tau^2 = 1, \quad \tau\sigma = \sigma^2\tau.$$

Como  $O(\sigma) = 3$ , tenemos que  $\sigma^3 = 1$ . Por otro lado, como  $O(\tau) = 2$ , tenemos que  $\tau^2 = 1$ . El último caso hay que calcularlo, y se ha visto ya en la tabla de multiplicar.

4. Observar que es posible escribir toda la tabla de multiplicar de  $S_3$  usando simplemente la descripción anterior y las relaciones anteriores.

**Ejercicio 1.2.20.** Describir los diferentes ciclos del grupo  $S_4$ . Expresar todos los elementos de  $S_4$  como producto de ciclos disjuntos.

Veamos cuántos ciclos de longitud  $m$  hay en un  $S_n$ . Cada una de las elecciones es una variación de  $n$  elementos tomados de  $m$  en  $m$ . Como además un mismo ciclo de longitud  $m$  puede empezar en  $m$  posiciones distintas, tenemos que el número de ciclos de longitud  $m$  es:

$$\frac{V_n^m}{m} = \frac{n!}{m(n-m)!}$$

Por tanto, los ciclos son:

l	Nº	Ciclos
1	1	$id$
2	6	$(1\ 2), (1\ 3), (1\ 4), (2\ 3), (2\ 4), (3\ 4)$
3	8	$(1\ 2\ 3), (1\ 2\ 4), (1\ 3\ 2), (1\ 3\ 4), (1\ 4\ 2), (1\ 4\ 3), (2\ 3\ 4), (2\ 4\ 3)$
4	6	$(1\ 2\ 3\ 4), (1\ 2\ 4\ 3), (1\ 3\ 2\ 4), (1\ 3\ 4\ 2), (1\ 4\ 2\ 3), (1\ 4\ 3\ 2)$

Tenemos ahora que  $|S_4| = 4! = 24$ . Como ya hemos dado 21 elementos, nos faltan 3. Estos son los elementos que no son ciclos, y son los siguientes:

$$(1\ 2)(3\ 4), (1\ 3)(2\ 4), (1\ 4)(2\ 3)$$

**Ejercicio 1.2.21.** Demostrar que el conjunto de transposiciones

$$\{(1, 2), (2, 3), \dots, (n - 1, n)\}$$

genera al grupo simétrico  $S_n$ .

Demostramos por doble inclusión que:

$$\langle (1, 2), (2, 3), \dots, (n - 1, n) \rangle = S_n$$

⊂) Dado  $\sigma \in \langle (1, 2), (2, 3), \dots, (n - 1, n) \rangle$ , entonces como  $S_n$  es cerrado por producto, se tiene que  $\sigma \in S_n$ .

⊃) Dado  $\sigma \in S_n$ , veamos que  $\sigma \in \langle (1, 2), (2, 3), \dots, (n - 1, n) \rangle$ . Por ser una permutación, tenemos que  $\sigma$  es producto de transposiciones. Por tanto, basta con demostrar que cualquier transposición se puede escribir como producto de elementos de  $\{(1, 2), (2, 3), \dots, (n - 1, n)\}$ .

Sea una transposición  $(i, j)$ , y sin pérdida de generalidad, supongamos que  $i < j$ . Entonces, se tiene que:

$$(i, j) = (i, i+1)(i+1, i+2) \cdots (j-2, j-1)(j-1, j)(j-2, j-1) \cdots (i+1, i+2)(i, i+1)$$

Por tanto,  $\sigma \in \langle (1, 2), (2, 3), \dots, (n-1, n) \rangle$ .

**Ejercicio 1.2.22.** Demostrar que el conjunto  $\{(1, 2, \dots, n), (1, 2)\}$  genera al grupo simétrico  $S_n$ .

Demostramos por doble inclusión que:

$$\langle (1, 2, \dots, n), (1, 2) \rangle = S_n$$

⊂) Dado  $\sigma \in \langle (1, 2, \dots, n), (1, 2) \rangle$ , entonces como  $S_n$  es cerrado por producto, se tiene que  $\sigma \in S_n$ .

⊃) Dado  $\sigma \in S_n$ , veamos que  $\sigma \in \langle (1, 2, \dots, n), (1, 2) \rangle$ . En primer lugar, definimos  $\tau = (1, 2, \dots, n)$ . Entonces, se tiene que:

$$\tau^k(j) = j + k \quad \forall k, j \in \{1, \dots, n\}, k + j \leq n$$

Además, por las propiedades de los conjugados, tenemos que:

$$\tau^{(k-1)}(1, 2)\tau^{-(k-1)} = (\tau^{k-1}(1), \tau^{k-1}(2)) = (k, k+1) \quad \forall k \in \mathbb{N}, k < n$$

Entonces, tenemos que:

$$\{(1, 2), (2, 3), \dots, (n-1, n)\} \subset \langle (1, 2, \dots, n), (1, 2) \rangle$$

Por tanto:

$$\sigma \in S_n = \langle (1, 2), (2, 3), \dots, (n-1, n) \rangle \subset \langle (1, 2, \dots, n), (1, 2) \rangle$$

**Ejercicio 1.2.23.** Demostrar que para cualquier permutación  $\alpha \in S_n$  se verifica que  $\varepsilon(\alpha) = \varepsilon(\alpha^{-1})$ , donde  $\varepsilon$  denota la signatura, o paridad, de una permutación.

Sabemos que la paridad depende del número de ciclos de longitud par que tiene una permutación en su descomposición en ciclos disjuntos. Como este valor es el mismo para una permutación y su inversa, se tiene que  $\varepsilon(\alpha) = \varepsilon(\alpha^{-1})$ .

**Ejercicio 1.2.24.** Demostrar que si  $(x_1 x_2 \cdots x_r) \in S_n$  es un ciclo de longitud  $r$ , entonces

$$\varepsilon(x_1 x_2 \cdots x_r) = (-1)^{r-1}.$$

- Si  $r$  es par, entonces hay un solo ciclo de longitud par, y por tanto  $\varepsilon(x_1 x_2 \cdots x_r) = -1$ . Como además  $r - 1$  es impar, se tiene que  $(-1)^{r-1} = -1$ .
- Si  $r$  es impar, entonces hay un solo ciclo de longitud impar, y 0 ciclos de longitud par. Por tanto,  $\varepsilon(x_1 x_2 \cdots x_r) = 1$ . Como además  $r - 1$  es par, se tiene que  $(-1)^{r-1} = 1$ .

**Ejercicio 1.2.25.** Encontrar un isomorfismo  $\mu_2 \cong \mathbb{Z}_3^\times$ .

Definimos la aplicación  $f : \mu_2 \rightarrow \mathbb{Z}_3^\times$  dada por:

$$\begin{aligned} 1 &\mapsto 1 \\ -1 &\mapsto 2 \end{aligned}$$

Vemos de forma directa que es biyectiva. Veamos además que se trata de un homomorfismo. Para ello, a priori deberíamos de comprobar que, para todas las parejas  $x, y \in \mu_2$ , se cumple que  $f(xy) = f(x)f(y)$ . Sin embargo, por tratarse de grupos conmutativos, podemos ahorrarnos la comprobación de algunas de ellas. Además, en todas las parejas en las que aparezca el elemento neutro, puesto que  $f(1) = 1$ , se tiene que:

$$f(x) = f(1 \cdot x) = f(1) \cdot f(x) = 1 \cdot f(x) = f(x) \quad \forall x \in \mu_2$$

Por tanto, todas estas también se tienen ya comprobadas (idea que repetiremos en ejercicios posteriores). Comprobamos las restantes:

$$1 = f(1) = f((-1) \cdot (-1)) = f(-1) \cdot f(-1) = 2 \cdot 2 = 4 = 1$$

Por tanto,  $f$  es un isomorfismo entre ambos grupos.

**Ejercicio 1.2.26.**

1. Demostrar que la aplicación  $f : \mu_4 \rightarrow \mathbb{Z}_5^\times$  dada por:

$$1 \mapsto 1, \quad -1 \mapsto 4, \quad i \mapsto 2, \quad -i \mapsto 3,$$

da un isomorfismo entre el grupo  $\mu_4$  de las raíces cuárticas de la unidad y el grupo  $\mathbb{Z}_5^\times$  de las unidades en  $\mathbb{Z}_5$ .

De forma directa, vemos que es biyectiva. Para ver que es un homomorfismo, tendremos que comprobar que se da la condición para las 16 posibles parejas. Por tratarse de grupos conmutativos, podremos ahorrarnos la comprobación de algunas de ellas.

$$\begin{aligned} 1 &= f(1) = f((-1) \cdot (-1)) = f(-1) \cdot f(-1) = 4 \cdot 4 = 16 = 1 \\ 4 &= f(-1) = f(i \cdot i) = f(i) \cdot f(i) = 2 \cdot 2 = 4 \\ 4 &= f(-1) = f((-i) \cdot (-i)) = f(-i) \cdot f(-i) = 3 \cdot 3 = 9 = 4 \\ 3 &= f(-i) = f((-1) \cdot i) = f(-1) \cdot f(i) = 4 \cdot 2 = 8 = 3 \\ 2 &= f(i) = f((-1) \cdot (-i)) = f(-1) \cdot f(-i) = 4 \cdot 3 = 12 = 2 \\ 1 &= f(1) = f(i \cdot (-i)) = f(i) \cdot f(-i) = 2 \cdot 3 = 6 = 1 \end{aligned}$$

Por tanto,  $f$  es un isomorfismo entre ambos grupos.

2. Encontrar otro isomorfismo entre estos dos grupos que sea distinto del anterior.

Sea  $g : \mu_4 \rightarrow \mathbb{Z}_5^\times$  otra aplicación que a continuación definiremos de forma que sea un isomorfismo. En primer lugar, hemos de imponer que  $g(1) = 1$ , por ser este el elemento neutro en ambos grupos. Por otro lado, en  $\mathbb{Z}_5^\times$  tenemos que:

$$O(2) = O(3) = 4 \quad O(4) = 2$$

Como en  $\mu_2$  tenemos que  $O(-1) = 2$  y sabemos que el orden se conserva en un isomorfismo, tenemos que ha de ser  $g(-1) = 4$ . Por tanto, solo nos quedan dos opciones para  $i$  y  $-i$  de forma que  $g$  sea biyectiva. Una de ellas opciones nos daría  $f$ , por lo que consideramos la otra alternativa. Definimos  $g$  entonces como sigue:

$$1 \mapsto 1, \quad -1 \mapsto 4, \quad i \mapsto 3, \quad -i \mapsto 2,$$

La biyección la tenemos de forma directa, y hemos de comprobar que se trata de un homomorfismo. Comprobamos tan solo los pares en los que intervienen los elementos  $i$  o  $-i$ :

$$\begin{aligned} 4 &= g(-1) = g(i \cdot i) = g(i) \cdot g(i) = 3 \cdot 3 = 9 = 4 \\ 4 &= g(-1) = g((-i) \cdot (-i)) = g(-i) \cdot g(-i) = 2 \cdot 2 = 4 \\ 3 &= g(i) = g((-1) \cdot (-i)) = g(-1) \cdot g(-i) = 4 \cdot 2 = 8 = 3 \\ 2 &= g(-i) = g((-1) \cdot i) = g(-1) \cdot g(i) = 4 \cdot 3 = 12 = 2 \\ 1 &= g(1) = g(i \cdot (-i)) = g(i) \cdot g(-i) = 3 \cdot 2 = 6 = 1 \end{aligned}$$

**Ejercicio 1.2.27.** Encontrar un isomorfismo  $\mu_2 \times \mu_2 \cong \mathbb{Z}_8^\times$ .

Sea  $f : \mu_2 \times \mu_2 \rightarrow \mathbb{Z}_8^\times$  la aplicación definida por:

$$\begin{aligned} (1, 1) &\mapsto 1 \\ (1, -1) &\mapsto 3 \\ (-1, 1) &\mapsto 5 \\ (-1, -1) &\mapsto 7 \end{aligned}$$

Comprobamos que es biyectiva de forma directa. Veamos ahora que es un homomorfismo:

$$\begin{aligned} 1 &= f(1, 1) = f[(1, -1)(1, -1)] = f(1, -1)f(1, -1) = 3 \cdot 3 = 9 = 1 \\ 1 &= f(1, 1) = f[(-1, 1)(-1, 1)] = f(-1, 1)f(-1, 1) = 5 \cdot 5 = 25 = 1 \\ 1 &= f(1, 1) = f[(-1, -1)(-1, -1)] = f(-1, -1)f(-1, -1) = 7 \cdot 7 = 49 = 1 \\ 7 &= f(-1, -1) = f[(1, -1)(-1, 1)] = f(1, -1)f(-1, 1) = 3 \cdot 5 = 15 = 7 \\ 5 &= f(-1, 1) = f[(1, -1)(-1, -1)] = f(1, -1)f(-1, -1) = 3 \cdot 7 = 21 = 5 \\ 3 &= f(1, -1) = f[(-1, 1)(-1, -1)] = f(-1, 1)f(-1, -1) = 5 \cdot 7 = 35 = 3 \end{aligned}$$

Por tanto,  $f$  es un isomorfismo entre ambos grupos.

**Ejercicio 1.2.28.** Demostrar, haciendo uso de las representaciones conocidas, que  $D_3 \cong S_3 \cong \text{GL}_2(\mathbb{Z}_2)$ .

En primer lugar, tenemos que:

$$\begin{aligned} |D_3| &= 2 \cdot 3 = 6 \\ |S_3| &= 3! = 6 \\ |\text{GL}_2(\mathbb{Z}_2)| &= (2^2 - 1)(2^2 - 2) = 6 \end{aligned}$$

Ahora, damos generadores para cada grupo. El generador de  $S_3$  se ha visto en el Ejercicio 1.2.22, mientras que el generador de  $\text{GL}_2(\mathbb{Z}_2)$  se ha visto en el Ejercicio 1.2.10.

$$\begin{aligned} D_3 &= \langle r, s \mid r^3 = 1, s^2 = 1, sr = r^{-1}s \rangle \\ S_3 &= \langle (1\ 2\ 3), (1\ 2) \rangle \\ \text{GL}_2(\mathbb{Z}_2) &= \left\langle \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right\rangle \end{aligned}$$

Comprobemos en primer lugar que el generador de  $S_3$  cumple las relaciones de  $D_3$ .

- Como  $O((1\ 2\ 3)) = 3$ , se tiene que  $(1\ 2\ 3)^3 = 1$ .
- Como  $O((1\ 2)) = 2$ , se tiene que  $(1\ 2)^2 = 1$ .
- Comprobemos que  $(1\ 2)(1\ 2\ 3) = (3\ 2\ 1)(1\ 2)$ .

$$\begin{aligned} (1\ 2)(1\ 2\ 3) &= (2\ 3) \\ (3\ 2\ 1)(1\ 2) &= (2\ 3) \end{aligned}$$

Por tanto, por el Teorema de Dyck, se tiene que existe un único homomorfismo  $f$  de  $D_3$  en  $S_3$  dado por:

$$\begin{aligned} r &\mapsto (1\ 2\ 3) \\ s &\mapsto (1\ 2) \end{aligned}$$

Como además  $\{f(r), f(s)\}$  son un generador de  $S_3$ , tenemos que se trata de un epimorfismo, y como además  $|D_3| = |S_3|$ , se trata de un isomorfismo. Por tanto,  $D_3 \cong S_3$ .

Comprobemos ahora que el generador de  $\text{GL}_2(\mathbb{Z}_2)$  cumple las relaciones de  $D_3$ .

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}^3 &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^2 &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}^2 \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Entonces, existe un único homomorfismo  $g : S_3 \rightarrow \text{GL}_2(\mathbb{Z}_2)$  de forma que:

$$g(r) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \quad g(s) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Como además  $\{g(r), g(s)\}$  son un generador de  $\text{GL}_2(\mathbb{Z}_2)$ , tenemos que se trata de un epimorfismo, y como además  $|S_3| = |\text{GL}_2(\mathbb{Z}_2)|$ , se trata de un isomorfismo. Por tanto,  $S_3 \cong \text{GL}_2(\mathbb{Z}_2)$ .

Por ser  $\cong$  una relación de equivalencia, tenemos que:

$$D_3 \cong S_3 \cong \text{GL}_2(\mathbb{Z}_2)$$

**Ejercicio 1.2.29.** Sea  $\mathbb{K}$  un cuerpo y considérese la operación binaria

$$\begin{aligned} \otimes : \mathbb{K} \times \mathbb{K} &\longrightarrow \mathbb{K} \\ (a, b) &\longmapsto a \otimes b = a + b - ab. \end{aligned}$$

Demostrar que  $(\mathbb{K} \setminus \{1\}, \otimes)$  es un grupo isomorfo al grupo multiplicativo  $\mathbb{K}^*$ .

En primer lugar, hemos de ver que es cerrado para el producto así definido. Dados  $a, b \in \mathbb{K} \setminus \{1\}$ , veamos que  $a \otimes b \neq 1$ . Tenemos que:

$$a \otimes b = 1 \iff a + b - ab = 1 \iff a(1 - b) = 1 - b \iff a = 1$$

donde, en la última implicación, hemos usado que  $\mathbb{K}$  es un cuerpo y  $b \neq 1$ , por lo que  $1 - b \neq 0$  y por tanto tiene inverso. Por tanto, se tiene que  $a \otimes b \neq 1$  y por tanto es cerrado para dicho producto. Veamos ahora que se trata de un grupo (donde hemos de tener en cuenta que no tenemos garantizada la conmutatividad de la suma):

1. **Asociatividad:** Dados  $a, b, c \in \mathbb{K} \setminus \{1\}$ , hemos de comprobar que se da la igualdad  $(a \otimes b) \otimes c = a \otimes (b \otimes c)$ . Tenemos que:

$$\begin{aligned} (a \otimes b) \otimes c &= (a + b - ab) \otimes c = a + b - ab + c - (a + b - ab)c \\ a \otimes (b \otimes c) &= a \otimes (b + c - bc) = a + b + c - bc - a(b + c - bc) \end{aligned}$$

Por tanto, tenemos que:

$$(a \otimes b) \otimes c = a \otimes (b \otimes c) \iff -ab - ac - bc - abc = -bc - ab - ac - abc$$

Por tanto, se tiene que la asociatividad se cumple.

2. **Elemento neutro:** Hemos de encontrar un elemento neutro  $e \in \mathbb{K} \setminus \{1\}$  tal que  $a \otimes e = a$  para todo  $a \in \mathbb{K} \setminus \{1\}$ . Tenemos que:

$$a \otimes e = a \iff a + e - ae = a \iff e = ae \iff e = 0$$

Por tanto, el elemento neutro es el elemento neutro para la suma en  $\mathbb{K}$ ,  $e = 0$ .

3. **Elemento inverso:** Dado  $a \in \mathbb{K} \setminus \{1\}$ , hemos de encontrar un elemento inverso  $a^{-1} \in \mathbb{K} \setminus \{1\}$  tal que  $a \otimes a^{-1} = e$ . Tenemos que:

$$a \otimes a^{-1} = 0 \iff a + a^{-1} - aa^{-1} = 0 \iff a = a^{-1}(-1 + a) \iff a^{-1} = a(-1 + a)^{-1}$$

donde hemos usado que  $a \neq 1$  y por tanto  $-1 + a \neq 0$ , por lo que podemos considerar su inverso en  $\mathbb{K}$ .

Veamos ahora que son isomorfos. Como necesitamos que la imagen del 0 sera el 1, definimos la siguiente aplicación:

$$\begin{aligned} f : \mathbb{K} \setminus \{1\} &\longrightarrow \mathbb{K}^* \\ x &\longmapsto 1 - x \end{aligned}$$

Veamos en primer lugar que está bien definida.

$$f(x) = 1 - x = 0 \iff x = 1 \notin \mathbb{K} \setminus \{1\}$$

Veamos ahora que es un homomorfismo. Dados  $x, y \in \mathbb{K} \setminus \{1\}$ , tenemos que:

$$\begin{aligned} f(x \otimes y) &= 1 - (x \otimes y) = 1 - (x + y - xy) = 1 - x - y + xy \\ f(x)f(y) &= (1 - x)(1 - y) = 1 - x - (1 - x)y = 1 - x - y + xy \end{aligned}$$

Por tanto,  $f$  es un homomorfismo entre ambos grupos. Además, es biyectiva, ya que su inversa es  $f^{-1}(x) = 1 - x$ . Por tanto,  $f$  es un isomorfismo entre ambos grupos.

**Ejercicio 1.2.30.**

1. Probar que si  $f : G \rightarrow G'$  es un isomorfismo de grupos, entonces se mantiene el orden; es decir,  $O(a) = O(f(a))$  para todo elemento  $a \in G$ .

Probado en Teoría.

2. Listar los órdenes de los diferentes elementos del grupo  $Q_2$  y del grupo  $D_4$  y concluir que  $D_4$  y  $Q_2$  no son isomorfos.

En primer lugar, tenemos que:

$$\begin{aligned} Q_2 &= \{\pm 1, \pm i, \pm j, \pm k\} \\ D_4 &= \{1, r, r^2, r^3, s, sr, sr^2, sr^3\} \end{aligned}$$

Calculamos los órdenes de  $D_4$ :

$$\begin{aligned} O(1) &= 1 & O(r) &= O(r^3) = 4 \\ O(r^2) &= O(s) = O(sr) &= O(sr^2) &= O(sr^3) = 2 \end{aligned}$$

Por otro lado, calculamos los órdenes de  $Q_2$ :

$$\begin{aligned} O(1) &= 1 & O(-1) &= 2 \\ O(\pm i) &= O(\pm j) = O(\pm k) &= 4 \end{aligned}$$

Por tanto no es posible establecer un isomorfismo  $f : D_4 \rightarrow Q_2$  de forma que cumpla

$$O(x) = O(f(x)) \quad \forall x \in D_4$$

Por tanto,  $D_4$  y  $Q_2$  no son isomorfos.

**Ejercicio 1.2.31.** Calcular el orden de:

1. La permutación  $\sigma = (1\ 8\ 10\ 4)(2\ 8)(5\ 1\ 4\ 8) \in S_{15}$ .

$$\begin{aligned} \sigma &= (2\ 10\ 4)(5\ 8) \\ O(\sigma) &= \text{mcm}(3, 2) = 6 \end{aligned}$$

2. Cada elemento del grupo  $\mathbb{Z}_{11}^\times$ .

$$\begin{aligned} O(1) &= 1 \\ O(3) &= O(4) = O(5) = O(9) = 5 \\ O(2) &= O(6) = O(7) = O(8) = 10 \\ O(10) &= 2 \end{aligned}$$

**Ejercicio 1.2.32.** Demostrar que un grupo generado por dos elementos distintos de orden dos, que conmutan entre sí, consiste del 1, de esos elementos y de su producto y es isomorfo al grupo de Klein.

Sea  $G = \langle a, b \mid a^2 = b^2 = 1, ab = ba \rangle$ . Entonces, por el Ejercicio 1.2.13 tenemos:

$$G = \{1, a, b, ab\}$$

Sea ahora el grupo de Klein el siguiente:

$$\begin{aligned} V &= \{1, (1\ 2)(3\ 4), (1\ 3)(2\ 4), (1\ 4)(2\ 3)\} \\ &= \langle (1\ 2)(3\ 4), (1\ 3)(2\ 4) \rangle \end{aligned}$$

Por tanto, hemos de encontrar un isomorfismo entre ambos grupos. Comprémos que los elementos generadores de  $V$  cumplen las relaciones de  $G$ :

$$\begin{aligned} O((1\ 2)(3\ 4)) &= \text{mcm}(2, 2) = 2 \implies [(1\ 2)(3\ 4)]^2 = 1 \\ O((1\ 3)(2\ 4)) &= \text{mcm}(2, 2) = 2 \implies [(1\ 3)(2\ 4)]^2 = 1 \\ (1\ 2)(3\ 4) (1\ 3)(2\ 4) &= (1\ 4)(2\ 3) \\ (1\ 3)(2\ 4) (1\ 2)(3\ 4) &= (1\ 4)(2\ 3) \end{aligned}$$

Por tanto, por el Teorema de Dyck, se tiene que existe un único homomorfismo  $f : G \rightarrow V$  cumpliendo:

$$\begin{aligned} a &\mapsto (1\ 2)(3\ 4) \\ b &\mapsto (1\ 3)(2\ 4) \end{aligned}$$

Como además  $\{f(a), f(b)\}$  son un generador de  $V$ , tenemos que se trata de un epimorfismo, y como además  $|G| = |V|$ , se trata de un isomorfismo. Por tanto,  $G \cong V$ . Como  $G$  es abeliano,  $V$  también lo es.

**Ejercicio 1.2.33.** Sea  $G$  un grupo y sean  $a, b \in G$ .

1. Demostrar que  $O(b) = O(aba^{-1})$  (un elemento y su conjugado tienen el mismo orden).

Para todo  $n \in \mathbb{N}$ , se tiene que:

$$1 = (aba^{-1})^n = ab^n a^{-1} \iff a^{-1} = b^n a^{-1} \iff 1 = b^n$$

Comprémos ahora que  $O(b) = O(aba^{-1})$ :

- Si  $O(b) = \infty$ , supongamos por reducción al absurdo que  $\exists n \in \mathbb{N}$  tal que  $(aba^{-1})^n = 1$ . Entonces, se tiene que  $b^n = 1$ , lo que contradice que  $O(b) = \infty$ .
- Si  $O(b) = n$ , entonces se tiene que  $b^n = 1$ , por lo que  $(aba^{-1})^n = 1$  y por tanto  $O(aba^{-1}) \leq n$ . Por otro lado, supongamos que  $\exists m \in \mathbb{N}$ , con  $m < n$ , tal que  $(aba^{-1})^m = 1$ . Entonces, se tiene que  $b^m = 1$ , lo que contradice que  $O(b) = n$ . Por tanto,  $O(aba^{-1}) = n$ .

En cualquier caso, se tiene que  $O(b) = O(aba^{-1})$ .

2. Demostrar que  $O(ba) = O(ab)$ .

Considerando ahora  $ba \in G$ , se tiene que:

$$O(ba) \stackrel{(*)}{=} O(a ba a^{-1}) = O(a b \cdot 1) = O(ab)$$

donde en (\*) hemos usado el apartado anterior.

**Ejercicio 1.2.34.** Sea  $G$  un grupo y sean  $a, b \in G$ ,  $a \neq 1 \neq b$ , tales que  $a^2 = 1$  y  $ab^2 = b^3a$ . Demostrar que  $O(a) = 2$  y que  $O(b) = 5$ .

Comprobemos en primer lugar que  $O(a) = 2$ . Por hipótesis, tenemos que  $a^2 = 1$ , por lo que  $O(a) \mid 2$ . Por tanto,  $O(a) = 1$  o  $O(a) = 2$ . Como  $a \neq 1$ , se tiene que  $O(a) = 2$ . Veamos ahora que  $O(b) = 5$ . Tenemos que:

$$\begin{aligned} ab^2 = b^3a &\implies b^2 = ab^3a \implies \\ &\implies b^4 = (ab^3a)(ab^3a) = ab^6a = a(ab^3a)(ab^3a)(ab^3a)a = b^9 \implies 1 = b^5 \end{aligned}$$

Por tanto,  $O(b) \mid 5$ . Por tanto,  $O(b) = 1$  o  $O(b) = 5$ . Como  $b \neq 1$ , se tiene que  $O(b) = 5$ .

**Ejercicio 1.2.35.** Sea  $f : G \rightarrow H$  un homomorfismo de grupos.

1.  $f(x^n) = f(x)^n \forall n \in \mathbb{Z}$ .

Lo demostraremos en primer lugar para todo  $n \in \mathbb{N}$ . Por inducción, se tiene que:

■ Caso base:  $n = 0$ .

$$f(x^0) = f(1) = 1 = f(x)^0$$

■ Paso inductivo: Supongamos que se cumple para  $n$ , y veamos que se cumple para  $n + 1$ .

$$f(x^{n+1}) = f(x^n x) = f(x^n)f(x) = f(x)^n f(x) = f(x)^{n+1}$$

Veamos ahora qué ocurre con  $n \in \mathbb{Z}$ ,  $n < 0$ .

$$f(x^n) = f((x^{-1})^{-n}) \stackrel{(*)}{=} f(x^{-1})^{-n} = ((f(x))^{-1})^{-n} = f(x)^n$$

donde en (\*) hemos usado que  $-n \in \mathbb{N}$ . Por tanto, se tiene que  $f(x^n) = f(x)^n \forall n \in \mathbb{Z}$ .

2. Si  $f$  es un isomorfismo entonces  $G$  y  $H$  tienen el mismo número de elementos de orden  $n$ . ¿Es cierto el resultado si  $f$  es sólo un homomorfismo?

Consideramos la aplicación inclusión dada por:

$$\begin{aligned} i : \mathbb{R}^* &\longrightarrow \mathbb{C}^* \\ x &\longmapsto x \end{aligned}$$

Comprobemos que se trata de un homomorfismo:

$$i(x \cdot y) = x \cdot y = i(x) \cdot i(y) \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^*$$

No obstante, tenemos que en  $\mathbb{C}^*$  hay elementos de orden 4 ( $O(i) = 4$ ), mientras que en  $\mathbb{R}^*$  no los hay. Por tanto, no se cumple el resultado si  $f$  es solo un homomorfismo.

3. Si  $f$  es un isomorfismo entonces  $G$  es abeliano  $\Leftrightarrow H$  es abeliano.

Probado en Teoría.

**Ejercicio 1.2.36.**

1. Demostrar que los grupos multiplicativos  $\mathbb{R}^*$  (de los reales no nulos) y  $\mathbb{C}^*$  (de los complejos no nulos) no son isomorfos.

En  $\mathbb{C}^*$ , tenemos que  $O(i) = 4$ . Busquemos  $x \in \mathbb{R}^*$  tal que  $O(x) = 4$ .

$$x^4 = 1 \iff x = \pm 1$$

No obstante,  $O(1) = 1$  y  $O(-1) = 2$ . Por tanto, no pueden ser isomorfos.

2. Demostrar que los grupos aditivos  $\mathbb{Z}$  y  $\mathbb{Q}$  no son isomorfos.

**Opción 1** Por reducción al absurdo, supongamos que existe un isomorfismo  $f : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Z}$ . Entonces, consideramos  $f^{-1}(1) = q \in \mathbb{Q}$ , que sabemos que existe por ser  $f$  biyectiva. Entonces, se tiene que:

$$1 = f(q) = f\left(\frac{q}{2} + \frac{q}{2}\right) = f\left(\frac{q}{2}\right) + f\left(\frac{q}{2}\right) = 2f\left(\frac{q}{2}\right) \implies f\left(\frac{q}{2}\right) = \frac{1}{2} \notin \mathbb{Z}$$

Por tanto, hemos llegado a una contradicción y, por tanto, hemos probado que no puede existir tal isomorfismo.

**Opción 2** (Notemos que usaremos conceptos del Tema 3)

Por reducción al absurdo, supongamos que existe un isomorfismo dado por  $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q}$ . Como  $\mathbb{Z} = \langle 1 \rangle$  y  $f$  es un epimorfismo, entonces tendremos  $\mathbb{Q} = \langle f(1) \rangle$ . Supongamos que  $f(1) = \frac{a}{b}$  con  $a \in \mathbb{Z}$  y  $b \in \mathbb{N}$ . Entonces, se tiene que:

$$\mathbb{Q} = \left\langle \frac{a}{b} \right\rangle = \left\{ \frac{ka}{b} \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$$

Sabemos que  $a/2b \in \mathbb{Q}$ , por lo que  $\exists k \in \mathbb{Z}$  tal que:

$$\frac{ka}{b} = \frac{a}{2b} \implies 2kab = ab \implies 2ka = a \implies \begin{cases} a = 0 \\ k = 1/2 \notin \mathbb{Z} \end{cases}$$

Por tanto,  $a = 0$ . Entonces:

$$f(1) = \frac{0}{b} = 0 \stackrel{(*)}{=} f(0)$$

donde en (\*) hemos usado que  $f$  es un homomorfismo entre grupos aditivos. Por tanto,  $f$  no es inyectiva, lo que contradice que sea un isomorfismo.

**Ejercicio 1.2.37.** Sea  $G$  un grupo. Demostrar:

1.  $G$  es abeliano  $\iff$  La aplicación  $f : G \rightarrow G$  dada por  $f(x) = x^{-1}$  es un homomorfismo de grupos.

$\implies$ ) Supongamos que  $G$  es abeliano. Entonces, para todo  $x, y \in G$ , se tiene que:

$$f(xy) = (xy)^{-1} = y^{-1}x^{-1} \stackrel{(*)}{=} x^{-1}y^{-1} = f(x)f(y)$$

donde en  $(*)$  hemos usado que  $G$  es abeliano. Por tanto,  $f$  es un homomorfismo.

$\impliedby$ ) Supongamos que  $f$  es un homomorfismo. Entonces, para todo  $x, y \in G$ , se tiene que:

$$xy = (y^{-1}x^{-1})^{-1} = f(y^{-1}x^{-1}) = f(y^{-1})f(x^{-1}) = yx$$

Por tanto,  $G$  es abeliano.

2.  $G$  es abeliano  $\iff$  La aplicación  $f : G \rightarrow G$  dada por  $f(x) = x^2$  es un homomorfismo de grupos.

$\implies$ ) Supongamos que  $G$  es abeliano. Entonces, para todo  $x, y \in G$ , se tiene que:

$$f(xy) = (xy)^2 = x^2y^2 = f(x)f(y)$$

Por tanto,  $f$  es un homomorfismo.

$\impliedby$ ) Supongamos que  $f$  es un homomorfismo. Entonces, para todo  $x, y \in G$ , se tiene que:

$$xyxy = f(xy) = f(x)f(y) = x^2y^2 \implies xy = yx$$

Por tanto,  $G$  es abeliano.

*Observación.* Notemos que este ejercicio es consecuencia directa del Ejercicio 1.2.7, pero lo hacemos por motivos didácticos.

**Ejercicio 1.2.38.** Si  $G$  es un grupo cíclico demostrar que cualquier homomorfismo de grupos  $f : G \rightarrow H$  está determinado por la imagen del generador.

Sea  $G = \langle a \rangle$ . Entonces, para todo  $x \in G$ , se tiene que  $x = a^n$  para algún  $n \in \mathbb{Z}$ . Por tanto, se tiene que:

$$f(x) = f(a^n) = f(a)^n$$

Por tanto,  $f$  está determinado por la imagen de  $a$ .

**Ejercicio 1.2.39.** Demostrar que no existe ningún cuerpo  $\mathbb{K}$  tal que sus grupos aditivo  $(\mathbb{K}, +)$  y  $(\mathbb{K}^*, \cdot)$  sean isomorfos.

Si  $\mathbb{K}$  es finito, entonces:

$$|\mathbb{K}^*| = |\mathbb{K}| - 1 \neq |\mathbb{K}|$$

Por tanto, no pueden ser isomorfos. Si  $\mathbb{K}$  es infinito, entonces supongamos por reducción al absurdo que existe un isomorfismo  $f : \mathbb{K} \rightarrow \mathbb{K}^*$ . Como  $\mathbb{K}$  es un cuerpo, podemos considerar su característica, que es el orden del 1 en el grupo aditivo.

1. Si  $\mathbb{K}$  tiene característica 2, entonces  $1 + 1 = 0$ , por lo que  $1 = -1$ . Por tanto, para cada  $x \in \mathbb{K}$ , se tiene que:

$$x + x = x + 1 \cdot x = x + (-1) \cdot x = x - x = 0$$

Por tanto, en  $\mathbb{K}$  vemos que  $O(x) = 2$  para todo  $x \neq 0$ . Como el orden se conserva en un isomorfismo, en  $\mathbb{K}^*$  también se tendría que  $O(x) = 2$  para todo  $x \neq 0, 1$ ; o equivalentemente,  $x^2 = 1$  para todo  $x \neq 0, 1$ . Es decir:

$$(x - 1)(x + 1) = 0 \quad \forall x \in \mathbb{K}^* \setminus \{1\}$$

Por ser  $\mathbb{K}$  un cuerpo, en particular es un DI, y por tanto o bien  $x - 1 = 0$  o bien  $x + 1 = 0$ ; por lo que  $x = 1$  o  $x = -1$ . Por tanto, tenemos que  $\mathbb{K}^* = \{1, -1\}$ , y de hecho es  $\mathbb{K}^* = \{1\}$ ; es decir, el cuerpo trivial. Esto contradice que  $\mathbb{K}$  sea infinito.

2. Si  $\mathbb{K}$  tiene característica distinta de 2, entonces  $1 + 1 \neq 0$ . Por ser  $f$  un isomorfismo, consideramos  $f^{-1}$ . En  $\mathbb{K}^*$ , se tiene que:

$$(-1)(-1) = 1 \implies O(-1) = 2$$

Por ser el orden conservado en un isomorfismo, tenemos que:

$$O(f^{-1}(-1)) = 2 \implies f^{-1}(-1) + f^{-1}(-1) = 0 \implies f^{-1}(-1)(1 + 1) = 0$$

Por ser  $\mathbb{K}$  un cuerpo, en particular es un DI, y por tanto o bien  $f^{-1}(-1) = 0$  o bien  $1 + 1 = 0$ . Como la característica de  $\mathbb{K}$  es distinta de 2, se tiene que  $1 + 1 \neq 0$ , por lo que:

$$f^{-1}(-1) = 0 \implies f(0) = -1$$

No obstante,  $f(0) = 1$ . Además,  $1 \neq -1$  (pues la característica de  $\mathbb{K}$  es distinta de 2), por lo que hemos llegado a que  $f$  no es inyectiva, lo que contradice que sea un isomorfismo.

En cualquier caso, no puede existir un cuerpo  $\mathbb{K}$  tal que sus grupos aditivo y multiplicativo sean isomorfos.

### 1.3. Subgrupos, Generadores, Retículos y Grupos cíclicos

**Ejercicio 1.3.1.** Describir todos los elementos de los grupos alternados  $A_n$ , consistentes en las permutaciones pares del  $S_n$  correspondiente, para:

1.  $n = 2$ .

$$S_2 = \{1, (1\ 2)\}$$

$$A_2 = \{1\}$$

2.  $n = 3$ .

$$S_3 = \{1, (1\ 2), (1\ 3), (2\ 3), (1\ 2\ 3), (1\ 3\ 2)\}$$

$$A_3 = \{1, (1\ 2\ 3), (1\ 3\ 2)\}$$

3.  $n = 4$ .

$$S_4 = \{1, (1\ 2), (1\ 3), (1\ 4), (2\ 3), (2\ 4), (3\ 4), (1\ 2\ 3), (1\ 2\ 4), (1\ 3\ 2), (1\ 3\ 4),$$

$$(1\ 4\ 2), (1\ 4\ 3), (2\ 3\ 4), (2\ 4\ 3), (1\ 2\ 3\ 4), (1\ 2\ 4\ 3), (1\ 3\ 2\ 4),$$

$$(1\ 3\ 4\ 2), (1\ 4\ 2\ 3), (1\ 4\ 3\ 2), (1\ 2)(3\ 4), (1\ 3)(2\ 4), (1\ 4)(2\ 3)\}$$

$$A_4 = \{1, (1\ 2\ 3), (1\ 2\ 4), (1\ 3\ 2), (1\ 3\ 4), (1\ 4\ 2), (1\ 4\ 3), (2\ 3\ 4), (2\ 4\ 3),$$

$$(1\ 2)(3\ 4), (1\ 3)(2\ 4), (1\ 4)(2\ 3)\}$$

**Ejercicio 1.3.2.** Sea  $D_n$  el grupo diédrico. Demostrar que el subgrupo de  $D_n$  generado por los elementos  $\{r^j s, r^k s\}$  es todo el grupo  $D_n$  siempre que  $0 \leq j < k < n$  y  $\text{mcd}(k - j, n) = 1$ .

Haciendo uso de que  $D_n = \langle r, s \rangle$ , veamos que:

$$\langle r^j s, r^k s \rangle = D_n$$

⊆) Como  $r, s \in D_n$ , entonces  $r^j s, r^k s \in D_n$ . Por ser  $D_n$  un grupo, en particular es cerrado para el producto y para inversos, por lo que  $\langle r^j s, r^k s \rangle \subseteq D_n$ .

⊇) Veamos en primer lugar que  $r \in \langle r^j s, r^k s \rangle$ . Sabemos que:

$$(r^j s)^{-1} = s r^{-j} \in \langle r^j s, r^k s \rangle$$

Por tanto, como  $r^k s \in \langle r^j s, r^k s \rangle$ , entonces:

$$r^k s (r^j s)^{-1} = r^k s s r^{-j} = r^{k-j} \in \langle r^j s, r^k s \rangle$$

Como  $\text{mcd}(k - j, n) = 1$ , entonces existe  $m \in \mathbb{Z}$ , con  $0 \leq m < n$ , tal que  $m(k - j) = qn + 1$  para algún  $q \in \mathbb{Z}$ . Por tanto:

$$(r^{k-j})^m = r^{m(k-j)} = r^{qn+1} = r \in \langle r^j s, r^k s \rangle$$

Por último, veamos que  $s \in \langle r^j s, r^k s \rangle$ . Como  $r \in \langle r^j s, r^k s \rangle$ , entonces:

$$r^{n-j} r^j s = r^{n-j+j} s = s \in \langle r^j s, r^k s \rangle$$

Por tanto,  $r, s \in \langle r^j s, r^k s \rangle$ , y por ser  $D_n = \langle r, s \rangle$ , entonces  $D_n \subset \langle r^j s, r^k s \rangle$ .

**Ejercicio 1.3.3.**

1. Demostrar que el subgrupo de  $SL_2(\mathbb{Z}_3)$  generado por los elementos

$$i = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad j = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

es isomorfo al grupo cuaternio  $Q_2$ .

Por la propiedad transitiva de la isomorfia, basta con encontrar un isomorfismo entre  $SL_2(\mathbb{Z}_3)$  y:

$$Q_2^{abs} = \langle x, y \mid x^4 = 1, y^2 = x^2, yx = x^{-1}y \rangle$$

Comprobamos que  $i, j$  cumplen las relaciones de  $Q_2^{abs}$ :

$$\begin{aligned} i^2 &= \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \\ j^2 &= \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \\ ji &= \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \\ i^3j &= \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Por tanto,  $i, j$  cumplen las relaciones de  $Q_2^{abs}$ . Por el Teorema de Dyck, existe un único homomorfismo  $f : Q_2^{abs} \rightarrow \langle i, j \rangle$  tal que  $f(x) = i$  y  $f(y) = j$ .

- Como  $i, j \in \langle i, j \rangle$  son un generador de  $\langle i, j \rangle$ , entonces se trata de un epimorfismo.
- Para terminar de ver que es un isomorfismo, basta con comprobar que  $|Q_2^{abs}| = |\langle i, j \rangle|$ . Sabemos que:

$$\begin{aligned} \langle i, j \rangle &= \{1, i, i^2, i^3, j, ij, i^2j, i^3j\} \\ |Q_2^{abs}| &= 8 = |\langle i, j \rangle| \end{aligned}$$

Por tanto,  $f$  es un isomorfismo.

Por tanto,  $\langle i, j \rangle \cong Q_2^{abs} \cong Q_2$ .

2. Demostrar que  $SL_2(\mathbb{Z}_3)$  y  $S_4$  son dos grupos de orden 24 que no son isomorfos.

*Observación.* Demostrar que  $S_4$  no puede contener a ningún subgrupo isomorfo a  $Q_2$ .

Tenemos que:

$$Q_2 = \{\pm 1, \pm i, \pm j, \pm k\}$$

Los órdenes de los elementos de  $Q_2$  son:

$$O(\pm i) = O(\pm j) = O(\pm k) = 4 \quad O(-1) = 2$$

Supongamos ahora  $\exists H \leq S_4$  tal que  $H \cong Q_2$ . Por lo pronto, sabemos que  $1 \in H$  y  $|H| = 8$ . Además, como los isomorfismos mantienen los órdenes, sabemos que en  $H$  habrá 6 elementos distintos de orden 4 y 1 de orden 2. Como en  $S_4$  tan solo hay 6 elementos de orden 4, entonces  $H$  ha de contener a todos los elementos de orden 4 de  $S_4$ ; es decir:

$$\{1, (1\ 2\ 3\ 4), (1\ 2\ 4\ 3), (1\ 3\ 2\ 4), (1\ 3\ 4\ 2), (1\ 4\ 2\ 3), (1\ 4\ 3\ 2)\} \subseteq H$$

Por tanto, ya tenemos 7 elementos de  $H$ , y sabemos que el restante es de orden 2 (no sabemos si es una transposición o un producto de dos transposición disjuntas). Por ser  $H$  un grupo, tenemos que es cerrado para productos, por lo que:

$$(1\ 2\ 3\ 4)(1\ 2\ 4\ 3) = (1\ 3\ 2) \in H$$

No obstante, hemos encontrado un elemento de orden 3 perteneciente a  $H$ , lo cual es una contradicción. Por tanto, no puede existir un subgrupo de  $S_4$  isomorfo a  $Q_2$ .

Para demostrar lo pedido, supongamos que  $\exists f : \text{SL}_2(\mathbb{Z}_3) \rightarrow S_4$  un isomorfismo, y consideramos la restricción a  $Q = \langle i, j \rangle \cong Q_2$ . Sabemos que la siguiente aplicación es un isomorfismo:

$$\begin{aligned} f|_Q : Q &\longrightarrow f_*(Q) \\ x &\longmapsto f(x) \end{aligned}$$

Por tanto,  $Q_2 \cong Q \cong f_*(Q)$ . Además, como  $f_*$  es un homomorfismo y se tiene  $Q < \text{SL}_2(\mathbb{Z}_3)$ , entonces  $f_*(Q) < S_4$ . Por tanto, hemos encontrado un subgrupo de  $S_4$  isomorfo a  $Q_2$ , lo cual es una contradicción por lo que hemos demostrado anteriormente. Por tanto,  $\text{SL}_2(\mathbb{Z}_3) \not\cong S_4$ .

**Ejercicio 1.3.4.** Razonar que un subconjunto no vacío  $X \subseteq G$  de un grupo  $G$  es un subgrupo de  $G$  si, y sólo si,  $X = \langle X \rangle$ .

$\implies$ ) Supongamos que  $X$  es un subgrupo de  $G$ , y veamos que  $X = \langle X \rangle$ .

$\subseteq$ ) Por definición de subgrupo generado por un conjunto,  $X \subseteq \langle X \rangle$ .

$\supseteq$ ) Veamos que  $\langle X \rangle \subseteq X$ . Dado  $x \in \langle X \rangle$ , entonces  $x$  es una combinación de elementos de  $X$  mediante el producto y el inverso. Por ser  $X$  un subgrupo, en particular es un grupo, por lo que es cerrado para el producto y para inversos. Por tanto,  $x \in X$ .

Por tanto,  $X = \langle X \rangle$ .

$\impliedby$ ) Supongamos que  $X = \langle X \rangle$ , y veamos que  $X$  es un subgrupo de  $G$ . Por definición,  $\langle X \rangle$  es el menor subgrupo de  $G$  que contiene a  $X$ . Por tanto,  $X$  es un subgrupo de  $G$ .

**Ejercicio 1.3.5.** Sean  $a, b \in G$  dos elementos de un grupo que conmutan entre sí, esto es, para los que  $ab = ba$ , y de manera que sus órdenes son primos relativos, esto es,  $\text{mcd}(O(a), O(b)) = 1$ .

1. Razonar que  $\langle a \rangle \cap \langle b \rangle = \{1\}$ .

**Opción 1** Puesto que la intersección de dos subgrupos es un subgrupo, sabemos que  $\langle a \rangle \cap \langle b \rangle$  es un subgrupo de  $G$ , y por tanto  $1 \in \langle a \rangle \cap \langle b \rangle \neq \emptyset$ . Por tanto, podemos considerar  $x \in \langle a \rangle \cap \langle b \rangle$ .

Como menciona el  $\text{mcd}(O(a), O(b))$ , podemos considerar que ambos órdenes son finitos. Por el Teorema de Lagrange, sabemos que:

$$\begin{aligned} |\langle a \rangle \cap \langle b \rangle| \mid |\langle a \rangle| &= O(a) \\ |\langle a \rangle \cap \langle b \rangle| \mid |\langle b \rangle| &= O(b) \end{aligned}$$

Por tanto,  $|\langle a \rangle \cap \langle b \rangle|$  es divisor común de  $O(a)$  y  $O(b)$ , y por ser  $\text{mcd}(O(a), O(b)) = 1$ , entonces  $|\langle a \rangle \cap \langle b \rangle| = 1$ . Por tanto,  $\langle a \rangle \cap \langle b \rangle = \{1\}$ .

**Opción 2** Demostremoslo por doble inclusión.

$\supseteq$ ) Como  $\langle a \rangle$  y  $\langle b \rangle$  son subgrupos de  $G$ , entonces  $\langle a \rangle \cap \langle b \rangle$  es un subgrupo de  $G$ , y en particular es un grupo. Por tanto,  $1 \in \langle a \rangle \cap \langle b \rangle$ .

$\subseteq$ ) Sea  $x \in \langle a \rangle \cap \langle b \rangle$ .

- Como  $x \in \langle a \rangle$ , entonces  $x = a^s$  para algún  $s \in \mathbb{Z}$ .
- Como  $x \in \langle b \rangle$ , entonces  $x = b^t$  para algún  $t \in \mathbb{Z}$ .

Por tanto:

$$1 = (a^{O(a)})^s = (a^s)^{O(a)} = x^{O(a)} = (b^t)^{O(a)} = b^{tO(a)} \implies O(b) \mid tO(a)$$

Como  $\text{mcd}(O(a), O(b)) = 1$ , entonces  $O(b) \mid t$ , por lo que  $\exists k \in \mathbb{Z}$  tal que  $t = kO(b)$ . Por tanto:

$$x = b^t = b^{kO(b)} = (b^{O(b)})^k = 1^k = 1$$

Por tanto,  $\langle a \rangle \cap \langle b \rangle \subset \{1\}$ .

2. Demostrar que  $O(ab) = O(a)O(b)$ .

Puesto que conmutan, tenemos que:

$$(ab)^k = a^k b^k \quad \forall k \in \mathbb{Z}$$

Por comodidad, sean  $O(a) = n$  y  $O(b) = m$ .

$$(ab)^{nm} = a^{nm} b^{nm} = (a^n)^m (b^m)^n = 1$$

Supongamos ahora  $t \in \mathbb{N}$  tal que  $(ab)^t = 1$ .

$$1 = (ab)^t = a^t b^t \implies a^t = b^{-t} \in \langle a \rangle \cap \langle b \rangle = \{1\} \implies \left\{ \begin{array}{l} a^t = 1 \implies n \mid t \\ a^t = 1 \implies m \mid t \end{array} \right\} \xrightarrow{(*)} nm \mid t$$

donde en (\*) hemos usado que  $\text{mcd}(n, m) = 1$ . Por tanto:

$$O(ab) = nm = O(a)O(b)$$

**Ejercicio 1.3.6.** Encontrar un grupo  $G$  y elementos  $a, b \in G$  tales que sus órdenes sean primos relativos, pero para los que no se verifique la igualdad  $O(ab) = O(a)O(b)$  del ejercicio anterior.

En primer lugar, hemos de tener que no conmuten. Por tanto, consideremos el grupo  $S_3$  y los elementos:

$$\begin{aligned} a &= (1\ 2) \\ b &= (1\ 2\ 3) \end{aligned}$$

Tenemos que  $O(a) = 2$  y  $O(b) = 3$ , y por tanto  $\text{mcd}(O(a), O(b)) = 1$ . Además,  $O(a)O(b) = 6$ . Supongamos que  $\exists \sigma \in S_3$  tal que  $O(\sigma) = 6$ . Por tanto, el mínimo común múltiplo de los ciclos disjuntos que la descomponen debe ser 6. Sin embargo, esto no es posible, porque en  $S_3$  tan solo hay elementos de orden 1, 2 y 3. Por tanto,  $O(ab) \neq O(a)O(b)$ .

**Ejercicio 1.3.7.** Sea  $G$  un grupo y  $a, b \in G$  dos elementos de orden finito. ¿Es  $ab$  necesariamente de orden finito?

*Observación.* Considerar el grupo  $\text{GL}_2(\mathbb{Q})$  y los elementos

$$a = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Calculemos el orden de  $a$  y  $b$ :

$$\begin{aligned} a^2 &= \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = -I_2 \implies O(a) = 4 \\ b^2 &= \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \\ b^3 &= \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = -I_2 \implies O(b) = 6 \end{aligned}$$

Calculamos ahora el orden de  $ab$ . Por inducción, demostraremos que:

$$(ab)^n = \begin{pmatrix} 1 & -n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

■ Caso base:  $n = 1$ .

$$(ab)^1 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

■ Supuesto cierto para  $n$ , demostramos para  $n + 1$ :

$$(ab)^{n+1} = (ab)^n(ab) = \begin{pmatrix} 1 & -n \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -(n+1) \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Por tanto, como en  $(ab)^n \neq I_2$  para todo  $n \in \mathbb{N}$ , entonces  $O(ab) = \infty$ .

**Ejercicio 1.3.8.** En el grupo  $S_3$  se considera el conjunto

$$H = \{1, (1\ 2\ 3), (1\ 3\ 2)\}.$$

1. Demostrar que  $H$  es un subgrupo de  $S_3$ .

**Opción 1.** Por ser  $S_3$  finito, tan solo hemos de comprobar que  $H$  es cerrado para el producto. Como vimos, no es necesario comprobar si uno de los elementos es el neutro.

$$\begin{aligned} (1\ 2\ 3)^2 &= (1\ 3\ 2) \\ (1\ 3\ 2)^2 &= (1\ 2\ 3) \\ (1\ 2\ 3)(1\ 3\ 2) &= 1 \\ (1\ 3\ 2)(1\ 2\ 3) &= 1 \end{aligned}$$

Por tanto,  $H < S_3$ .

**Opción 2.** Demostremos que  $H = \langle (1\ 2\ 3) \rangle$ .

$\subseteq$ ) Tan solo será necesario ver que  $(1\ 2\ 3)^2 = (1\ 3\ 2)$ , y se tendría de manera inmediata que  $H \subseteq \langle (1\ 2\ 3) \rangle$ .

$\supseteq$ ) Sea  $x \in \langle (1\ 2\ 3) \rangle$ . Entonces  $x = (1\ 2\ 3)^n$  para algún  $n \in \mathbb{Z}$ . Como  $O(\langle (1\ 2\ 3) \rangle) = 3$ , entonces  $n \in \{0, 1, 2\}$ . Por tanto:

$$x \in \{(1\ 2\ 3)^0, (1\ 2\ 3)^1, (1\ 2\ 3)^2\} = \{1, (1\ 2\ 3), (1\ 3\ 2)\} = H$$

2. Describir las diferentes clases de  $S_3$  módulo  $H$ .

Por el Teorema de Lagrange, sabemos que:

$$|S_3| = [S_3 : H] \cdot |H| \implies [S_3 : H] = \frac{6}{3} = 2 \implies |S_3 /_H \sim| = |S_3 / \sim_H| = 2$$

Calculamos ahora las clases de equivalencia de  $S_3 /_H \sim$ :

$$\begin{aligned} 1H &= \{1x \mid x \in H\} = \{1, (1\ 2\ 3), (1\ 3\ 2)\} = H \\ (1\ 2)H &= \{(1\ 2)x \mid x \in H\} = \{(1\ 2), (1\ 2)(1\ 2\ 3), (1\ 2)(1\ 3\ 2)\} = \{(1\ 2), (2\ 3), (1\ 3)\} \neq H \end{aligned}$$

Como ya hemos encontrado dos clases de equivalencia distintas, entonces hemos encontrado todas las posibles.

$$S_3 /_H \sim = \{H, (1\ 2)H\}$$

Calculamos ahora las clases de equivalencia de  $S_3 / \sim_H$ :

$$\begin{aligned} H1 &= \{x1 \mid x \in H\} = \{1, (1\ 2\ 3), (1\ 3\ 2)\} = H \\ H(1\ 2) &= \{x(1\ 2) \mid x \in H\} = \{(1\ 2), (1\ 2\ 3)(1\ 2), (1\ 3\ 2)(1\ 2)\} = \{(1\ 2), (1\ 3), (2\ 3)\} \neq H \end{aligned}$$

Por tanto, hemos encontrado todas las clases de equivalencia de  $S_3 / \sim_H$ .

$$S_3 / \sim_H = \{H, H(1\ 2)\}$$

**Ejercicio 1.3.9.** Sea  $G$  un grupo finito.

1. Demostrar que si  $H \leq G$  es un subgrupo, entonces  $[G : H] = |G|$  si, y sólo si,  $H = \{1\}$ , mientras que  $[G : H] = 1$  si, y sólo si,  $H = G$ .

Demostremos en primer lugar que  $[G : H] = |G| \iff H = \{1\}$ . Por el Teorema de Lagrange, sabemos que  $|G| = [G : H] \cdot |H|$ . Por tanto:

$$[G : H] = \frac{|G|}{|H|} = |G| \iff |G| = |G| |H| \iff |H| = 1 \iff H = \{1\}$$

donde, desde el inicio, hemos usado que  $|G|, |H| \neq 0$ .

De nuevo, por el Teorema de Lagrange, sabemos que  $|G| = [G : H] \cdot |H|$ . Por tanto:

$$[G : H] = \frac{|G|}{|H|} = 1 \iff |G| = |H|$$

Como además  $H \subset G$  por ser subgrupo, tenemos que  $[G : H] = 1$  si y solo si  $H = G$ .

2. Demostrar que si se tienen subgrupos  $G_2 \leq G_1 \leq G$ , entonces

$$[G : G_2] = [G : G_1][G_1 : G_2],$$

Por un lado, como  $G_2 \leq G$ , entonces:

$$|G| = [G : G_2] \cdot |G_2|$$

Por otro lado, como  $G_1 \leq G$ , y  $G_2 \leq G_1$ , entonces:

$$|G| = [G : G_1] \cdot |G_1| = [G : G_1][G_1 : G_2] \cdot |G_2|$$

Uniando ambos resultados, tenemos que:

$$[G : G_2] = [G : G_1][G_1 : G_2]$$

3. Demostrar que si se tiene una cadena descendente de subgrupos de la forma

$$G = G_0 \geq G_1 \geq \dots \geq G_{r-1} \geq G_r,$$

entonces

$$[G : G_r] = \prod_{i=0}^{r-1} [G_i : G_{i+1}].$$

Demotrsamos por inducción sobre  $r$ :

- $r = 2$ :  $G = G_0 \geq G_1 \geq G_2$ . Por el apartado anterior, sabemos que:

$$[G : G_2] = [G : G_1][G_1 : G_2]$$

- Supuesto cierto para  $r$ , demostramos para  $r + 1$ : Por hipótesis de inducción, sabemos que:

$$[G : G_r] = \prod_{i=0}^{r-1} [G_i : G_{i+1}]$$

Por otro lado, como  $G_{r+1} \leq G_r \leq G$ , aplicando el apartado anterior, tenemos que:

$$[G : G_{r+1}] = [G : G_r][G_r : G_{r+1}]$$

Uniendo ambos resultados, tenemos que:

$$[G : G_{r+1}] = \prod_{i=0}^{r-1} [G_i : G_{i+1}] \cdot [G_r : G_{r+1}] = \prod_{i=0}^r [G_i : G_{i+1}]$$

4. Demostrar que si se tiene una cadena descendente de subgrupos de la forma

$$G = G_0 \geq G_1 \geq \dots \geq G_{r-1} \geq G_r = \{1\},$$

entonces

$$|G| = \prod_{i=0}^{r-1} [G_i : G_{i+1}].$$

Por el primer apartado, como  $G_r = \{1\}$ , entonces  $[G : G_r] = |G|$ . Por tanto, aplicando el apartado anterior, tenemos que:

$$|G| = \prod_{i=0}^{r-1} [G_i : G_{i+1}]$$

### Ejercicio 1.3.10.

1. Demostrar que si  $G$  es un grupo de orden 4, entonces se tiene que o bien  $G$  es cíclico, o bien es isomorfo al grupo de Klein.

Como  $|G| = 4$ , entonces  $O(x) \mid 4$  para todo  $x \in G$ . Por tanto,  $O(x) \in \{1, 2, 4\}$ . Consideramos los siguientes casos:

- Supongamos  $\exists x \in G \mid O(x) = 4$ :

En este caso, como  $x$  tiene 4 potencias distintas, entonces:

$$\langle x \rangle = \{1, x, x^2, x^3\} \subset G$$

Como además  $|\langle x \rangle| = 4 = |G|$ , entonces  $G = \langle x \rangle$ . Por tanto,  $G$  es cíclico,  $G = C_4$ .

- Supongamos  $\nexists x \in G \mid O(x) = 4$ :

En este caso,  $\forall x \in G, O(x) \in \{1, 2\}$ . Como  $O(x) = 1 \iff x = 1$ , entonces  $G$  tiene 3 elementos de orden 2. Sea  $x \in G$  tal que  $O(x) = 2$ .

En este caso,  $\langle x \rangle = \{1, x\} \subset G$ . Como  $|G| = 4$ , ha de existir un elemento  $y \in G$  tal que  $y \notin \langle x \rangle$  y  $O(y) = 2$ .

Veamos que  $G$  cumple las relaciones del grupo de Klein abstracto:

$$V^{\text{abs}} = \langle a, b \mid a^2 = b^2 = 1, ab = ba \rangle$$

Sabemos que  $x^2 = y^2 = 1$ . Ahora, nos falta ver que  $xy = yx$ . Como  $xy \in G$ , entonces  $O(xy) \in \{1, 2\}$ . En cualquier caso,  $(xy)^2 = 1$ , por lo que:

$$xyxy = 1 \implies yxy = x \implies xy = yx$$

Por tanto, por el Teorema de Dyck,  $G \cong V^{\text{abs}} \cong V$ .

2. Demostrar que si  $G$  es un grupo de orden 6, entonces se tiene que o bien  $G$  es cíclico, o bien es isomorfo al grupo diédrico  $D_3$ .

Seguiremos la misma estrategia que en el apartado anterior. Como  $|G| = 6$ , entonces  $O(x) \mid 6$  para todo  $x \in G$ . Por tanto,  $O(x) \in \{1, 2, 3, 6\}$ . Consideramos los siguientes casos:

- Supongamos  $\exists x \in G \mid O(x) = 6$ :

En este caso, como  $x$  tiene 6 potencias distintas, entonces:

$$\langle x \rangle = \{1, x, x^2, x^3, x^4, x^5\} \subset G$$

Como además  $|\langle x \rangle| = 6 = |G|$ , entonces  $G = \langle x \rangle$ . Por tanto,  $G$  es cíclico,  $G = C_6$ .

- Supongamos  $\nexists x \in G \mid O(x) = 6$ :

En este caso,  $\forall x \in G, O(x) \in \{1, 2, 3\}$ . Como  $O(x) = 1 \iff x = 1$ , entonces  $G$  tiene 5 elementos cuyo orden es 2 o 3.

- Supongamos  $\nexists x \in G \mid O(x) = 3$ :

Entonces,  $G$  tiene 5 elementos de orden 2. Sea  $x \in G$  tal que  $O(x) = 2$ .

$$\langle x \rangle = \{1, x\} \subset G$$

Como  $|G| = 6$ , ha de existir un elemento  $y \in G$  tal que  $y \notin \langle x \rangle$  y  $O(y) = 2$ . Veamos que  $xy \notin \{1, x, y\}$ .

- Si  $xy = 1$ , entonces  $y = x^{-1} = x$ , lo cual es una contradicción.
- Si  $xy = x$ , entonces  $y = 1$ , lo cual es una contradicción.
- Si  $xy = y$ , entonces  $x = 1$ , lo cual es una contradicción.

Por tanto, tenemos que:

$$\langle x, y \rangle = \{1, x, y, xy\} \subset G$$

Por tanto, hemos encontrado un subgrupo de  $G$  de orden 4, pero esto es una contradicción, porque por el Teorema de Lagrange, el orden de un subgrupo ha de dividir al orden del grupo.

- Supongamos  $\nexists x \in G \mid O(x) = 2$ :

En este caso,  $G$  tiene 5 elementos de orden 3. Sea  $x \in G$  tal que  $O(x) = 3$ .

$$\langle x \rangle = \{1, x, x^2\} \subset G$$

Como  $|G| = 6$ , ha de existir un elemento  $y \in G$  tal que  $y \notin \langle x \rangle$  y  $O(y) = 3$ . Veamos que  $xy \notin \{1, x, x^2, y, y^2\}$ .

- Si  $xy = 1$ , entonces  $y = x^{-1} = x^2$ , lo cual es una contradicción.
- Si  $xy = x$ , entonces  $y = 1$ , lo cual es una contradicción.
- Si  $xy = x^2$ , entonces  $y = x$ , lo cual es una contradicción.
- Si  $xy = y$ , entonces  $x = 1$ , lo cual es una contradicción.
- Si  $xy = y^2$ , entonces  $x = y$ , lo cual es una contradicción.

Por tanto, tenemos que  $\{1, x, x^2, y, y^2, xy\} \subset G$ . Como  $|G| = 6$ , entonces  $G = \{1, x, x^2, y, y^2, xy\}$ . Veamos que  $x^2y \notin G$ :

- Si  $x^2y = 1$ , entonces  $y = x$ , lo cual es una contradicción.
- Si  $x^2y = x$ , entonces  $y = x^2$ , lo cual es una contradicción.
- Si  $x^2y = x^2$ , entonces  $y = 1$ , lo cual es una contradicción.
- Si  $x^2y = y$ , entonces  $x^2 = 1$ , lo cual es una contradicción.
- Si  $x^2y = y^2$ , entonces  $x^2 = y$ , lo cual es una contradicción.
- Si  $x^2y = xy$ , entonces  $x = 1$ , lo cual es una contradicción.

Por tanto,  $G$  no es cerrado para el producto, lo cual es una contradicción.

- Por tanto,  $\exists x \in G \mid O(x) = 3$  y  $\exists y \in G \mid O(y) = 2$ . Comprobemos que  $G$  cumple las relaciones del grupo diédrico  $D_3$ :

$$D_3 = \langle r, s \mid r^3 = s^2 = 1, sr = r^2s \rangle$$

Veamos en primer lugar los elementos de  $G$ . Sabemos que  $\{1, x, x^2\} \subset G$ . Veamos ahora que  $y$  no puede ser uno de estos elementos:

$$y = x^2 \implies 1 = y^2 = x^4 = x \implies x = 1$$

Por tanto,  $y \notin \{1, x, x^2\}$ , y tenemos  $\{1, x, x^2, y\} \subset G$ . Veamos ahora que  $xy \notin \{1, x, x^2, y\}$ :

- Si  $xy = 1$ , entonces  $y = x$ , lo cual es una contradicción.
- Si  $xy = x$ , entonces  $y = 1$ , lo cual es una contradicción.
- Si  $xy = x^2$ , entonces  $y = x$ , lo cual es una contradicción.
- Si  $xy = y$ , entonces  $x = 1$ , lo cual es una contradicción.

Por tanto,  $\{1, x, x^2, y, xy\} \subset G$ . Veamos ahora que  $x^2y \notin \{1, x, x^2, y, xy\}$ :

- Si  $x^2y = 1$ , entonces  $y = x$ , lo cual es una contradicción.
- Si  $x^2y = x$ , entonces  $y = x^2$ , lo cual es una contradicción.
- Si  $x^2y = x^2$ , entonces  $y = 1$ , lo cual es una contradicción.
- Si  $x^2y = y$ , entonces  $x^2 = 1$ , lo cual es una contradicción.
- Si  $x^2y = xy$ , entonces  $x = 1$ , lo cual es una contradicción.

Por tanto,  $\{1, x, x^2, y, xy, x^2y\} \subset G$ . Como  $|G| = 6$ , entonces:

$$G = \{1, x, x^2, y, xy, x^2y\}$$

Como  $G$  es un grupo,  $yx \in G$ . Veamos el valor de  $yx$ :

- Si  $yx = 1$ , entonces  $y = x$ , lo cual es una contradicción.
- Si  $yx = x$ , entonces  $y = 1$ , lo cual es una contradicción.




Figura 1.47: Diagrama de Hasse para los subgrupos del grupo de Klein.

- o Si  $yx = x^2$ , entonces  $y = x$ , lo cual es una contradicción.
- o Si  $yx = y$ , entonces  $x = 1$ , lo cual es una contradicción.
- o Si  $yx = xy$ , entonces  $G$  es abeliano. En este caso, veamos que  $O(xy) = 6$ :

$$(xy)^2 = x^2 \quad (xy)^3 = y \quad (xy)^4 = x \quad (xy)^5 = x^2y \quad (xy)^6 = 1$$

Por tanto,  $O(xy) = 6$ , pero habíamos supuesto que  $\nexists x \in G$  tal que  $O(x) = 6$ . Por tanto, hemos llegado a una contradicción.

Por tanto, como  $yx \in G$ , tan solo queda la opción de que  $yx = x^2y$ . Por tanto,  $G$  cumple las relaciones del grupo diédrico  $D_3$ . Como además  $\langle x, y \rangle$  es un grupo de generadores de  $G$  y  $|G| = |D_3| = 6$ , por el Teorema de Dyck,  $G \cong D_3$ .

**Ejercicio 1.3.11.** Describir los retículos de subgrupos de los siguientes grupos:

1. El grupo  $V$  de Klein.

La complejidad en todo este ejercicio será hallar todos los subgrupos de un cierto grupo. Una vez hallados, dibujar los Diagramas de Hasse no será complicado.

Sabemos que  $V = \{1, (1\ 2)(3\ 4), (1\ 3)(2\ 4), (1\ 4)(2\ 3)\}$ . Por el Teorema de Lagrange, sabemos que los subgrupos de  $V$  han de tener orden 1, 2 o 4. El subgrupo de orden 1 es  $\{1\}$ , y el subgrupo de orden 4 es  $V$ . Veamos ahora los subgrupos de orden 2. Como 2 es primo, entonces los subgrupos de orden 2 han de ser cíclicos. Por tanto, los subgrupos de orden 2 son:

$$\begin{aligned} \langle (1\ 2)(3\ 4) \rangle &= \{1, (1\ 2)(3\ 4)\} \\ \langle (1\ 3)(2\ 4) \rangle &= \{1, (1\ 3)(2\ 4)\} \\ \langle (1\ 4)(2\ 3) \rangle &= \{1, (1\ 4)(2\ 3)\} \end{aligned}$$

Por tanto, el retículo de subgrupos de  $V$  es el de la Figura 1.47.

2. El grupo simétrico  $S_3$ .

Sabemos que  $|S_3| = 6$ . Por el Teorema de Lagrange, sabemos que los subgrupos de  $S_3$  han de tener orden 1, 2, 3 o 6. El subgrupo de orden 1 es  $\{1\}$ , y el subgrupo de orden 6 es  $S_3$ . Veamos ahora los subgrupos de orden 2 y 3. Como 2 y 3 son primos, entonces los subgrupos de orden 2 y 3 han de ser cíclicos. Sabemos que:

$$S_3 = \{1, (1\ 2), (1\ 3), (2\ 3), (1\ 2\ 3), (1\ 3\ 2)\}$$




Figura 1.48: Diagrama de Hasse para los subgrupos de  $S_3$ .

Por tanto, los subgrupos de orden 2 son:

$$\begin{aligned} \langle(1\ 2)\rangle &= \{1, (1\ 2)\} \\ \langle(1\ 3)\rangle &= \{1, (1\ 3)\} \\ \langle(2\ 3)\rangle &= \{1, (2\ 3)\} \end{aligned}$$

Por otro lado, los subgrupos de orden 3 son:

$$\langle(1\ 2\ 3)\rangle = \{1, (1\ 2\ 3), (1\ 3\ 2)\}$$

Notemos que no ha hecho falta calcular  $\langle(1\ 3\ 2)\rangle$  puesto que,  $\langle x \rangle = \langle x^{-1} \rangle$ . Por tanto, el retículo de subgrupos de  $S_3$  es el de la Figura 1.48.

### 3. El grupo diédrico $D_4$ .

Sabemos que  $|D_4| = 8$ . Por el Teorema de Lagrange, sabemos que los subgrupos de  $D_4$  han de tener orden 1, 2, 4 u 8. El subgrupo de orden 1 es  $\{1\}$ , y el subgrupo de orden 8 es  $D_4$ . Veamos ahora los subgrupos de orden 2 y 4. Como 2 es primo, entonces los subgrupos de orden 2 han de ser cíclicos. Sabemos que:

$$D_4 = \{1, r, r^2, r^3, s, sr, sr^2, sr^3\}$$

Calculemos el orden de los elementos de  $D_4$ :

$$\begin{aligned} O(1) &= 1 & O(r) &= O(r^3) = 4 \\ O(r^2) &= O(s) = O(sr) = O(sr^2) = O(sr^3) &= 2 \end{aligned}$$

Por tanto, los subgrupos de orden 2 son:

$$\begin{aligned} \langle r^2 \rangle &= \{1, r^2\} \\ \langle s \rangle &= \{1, s\} \\ \langle sr \rangle &= \{1, sr\} \\ \langle sr^2 \rangle &= \{1, sr^2\} \\ \langle sr^3 \rangle &= \{1, sr^3\} \end{aligned}$$

Calculamos ahora los subgrupos de orden 4. Sabemos que:

$$\langle r \rangle = \{1, r, r^2, r^3\} = \langle r^3 \rangle$$

No obstante, busquemos más grupos de orden 4, algo que no será sencillo. Dado un subgrupo  $H$ , como  $H = \langle H \rangle$ , entonces siempre podemos encontrar un conjunto de generadores suyo. Buscaremos por tanto conjuntos de generadores con 1, 2, 3 y 4 elementos.

■ Con un elemento:

Los subgrupos generados por un único elemento sabemos que son cíclicos y el orden del elemento ha de ser el orden del grupo. Por tanto, el único subgrupo de  $D_4$  de orden 4 es:

$$\langle r \rangle = \{1, r, r^2, r^3\} = \langle r^3 \rangle$$

■ Con dos elementos:

A partir de aquí, es más complejo. Sabemos que los generadores no han de ser ni  $r$  ni  $r^3$ , pues estos generarían un grupo de orden mayor que 4. Además, incluir a 1 como generador no tiene sentido. Por último, notemos que  $x$  y  $x^{-1}$  generan el mismo grupo. Las posibles combinaciones son:

$$\begin{aligned} \langle s, r^2 \rangle &= \{1, s, r^2, sr^2\} \\ \langle s, sr \rangle &= D_4 \text{ pues } r = s \cdot sr \\ \langle s, sr^2 \rangle &= \langle s, r^2 \rangle \text{ pues } s \cdot sr^2 = r^2 \\ \langle s, sr^3 \rangle &\supset \langle r^3 \rangle \text{ pues } s \cdot sr^3 = r^3 \\ \langle sr, r^2 \rangle &= \{1, sr, sr^3, r^2\} \\ \langle sr, sr^2 \rangle &\supset \langle r \rangle \text{ pues } sr \cdot sr^2 = s sr^3 r^2 = r \\ \langle sr, sr^3 \rangle &= \langle sr, r^2 \rangle \text{ pues } sr \cdot sr^3 = r^2 \\ \langle r^2, sr^2 \rangle &= \langle s, r^2 \rangle \text{ pues } sr^2 \cdot r^2 = s \\ \langle r^2, sr^3 \rangle &= \langle sr, r^2 \rangle \text{ pues } sr^3 \cdot r^2 = sr \\ \langle sr^2, sr^3 \rangle &= D_4 \text{ pues } r = sr^2 \cdot sr^3 \text{ y } sr^3 \cdot r = s \end{aligned}$$

Por tanto, y en resumen, los únicos subgrupos de  $D_4$  de orden 4 generados por dos elementos son:

$$\begin{aligned} \langle s, r^2 \rangle &= \{1, s, r^2, sr^2\} \\ \langle sr, r^2 \rangle &= \{1, sr, sr^3, r^2\} \end{aligned}$$

■ Con tres elementos:

Supongamos (pues en otro caso ya se habría estudiado) que todos los elementos generadores son de orden 2 y distintos. Sean estos  $x$ ,  $y$  y  $z$ . Como  $\langle x, y \rangle$  nos proporciona un subgrupo de orden 4 o mayor, caben dos posibilidades:

- Al añadir  $z$  como generador, no se generen más elementos. En este caso,  $\langle x, y, z \rangle = \langle x, y \rangle$ , caso ya estudiado.




Figura 1.49: Diagrama de Hasse para los subgrupos de  $D_4$ .

- Al añadir  $z$  como generador, se generen más elementos. En este caso,  $\langle x, y, z \rangle = D_4$ .
- Con cuatro elementos:  
Supongamos (pues en otro caso ya se habría estudiado) que todos los elementos generadores son de orden 2 y distintos. Entonces, como también el 1 pertenecerá a dicho subgrupo, tenemos que este grupo será  $D_4$ .

Por tanto, los únicos subgrupos de  $D_4$  de orden 4 son:

$$\begin{aligned} \langle r \rangle &= \{1, r, r^2, r^3\} = \langle r^3 \rangle \\ \langle s, r^2 \rangle &= \{1, s, r^2, sr^2\} \\ \langle sr, r^2 \rangle &= \{1, sr, sr^3, r^2\} \end{aligned}$$

Por tanto, el retículo de subgrupos de  $D_4$  es el de la Figura 1.49.

#### 4. El grupo cuaternio $Q_2$ .

Sabemos que  $|Q_2| = 8$ . Por el Teorema de Lagrange, sabemos que los subgrupos de  $Q_2$  han de tener orden 1, 2, 4 u 8. El subgrupo de orden 1 es  $\{1\}$ , y el subgrupo de orden 8 es  $Q_2$ . Veamos en primer lugar el orden de los elementos de  $Q_2$ :

$$O(1) = 1 \quad O(-1) = 2 \quad O(\pm i) = O(\pm j) = O(\pm k) = 4$$

Como 2 es primo, los subgrupos de orden 2 han de ser cíclicos y generados por un elemento de orden 2. Por tanto, el único subgrupo de orden 2 es:

$$\langle -1 \rangle = \{1, -1\}$$

Respecto a los subgrupos de orden 4, buscaremos conjuntos de generadores de 1, 2, 3 y 4 elementos.




Figura 1.50: Diagrama de Hasse para los subgrupos del grupo de los cuaternios.

■ Con un elemento:

Los subgrupos generados por un único elemento sabemos que son cíclicos y el orden del elemento ha de ser el orden del grupo. Por tanto, estos son:

$$\begin{aligned}\langle i \rangle &= \{1, i, -1, -i\} \\ \langle j \rangle &= \{1, j, -1, -j\} \\ \langle k \rangle &= \{1, k, -1, -k\}\end{aligned}$$

■ Con dos elementos:

Supongamos (pues en otro caso ya se habría estudiado) que los generadores no son de orden 4. Entonces tan solo puede ser el 1 y el  $-1$ , caso ya estudiado. Por tanto, no consideramos ni este caso ni los generados por más elementos.

Por tanto, el retículo de subgrupos de  $Q_2$  es el de la Figura 1.50.

5. El grupo alternado  $A_4$ .

Sabemos que  $|A_4| = 12$ . Por el Teorema de Lagrange, sabemos que los subgrupos de  $A_4$  han de tener orden 1, 2, 3, 4, 6 o 12. El subgrupo de orden 1 es  $\{1\}$ , y el subgrupo de orden 12 es  $A_4$ . Veamos ahora los subgrupos de orden 2, 3, 4 y 6. Para ello, antes de nada, mostremos los elementos de  $A_4$ :

$$A_4 = \{1, (1\ 2\ 3), (1\ 2\ 4), (1\ 3\ 2), (1\ 3\ 4), (1\ 4\ 2), (1\ 4\ 3), (2\ 3\ 4), (2\ 4\ 3), \\ (1\ 2)(3\ 4), (1\ 3)(2\ 4), (1\ 4)(2\ 3)\}$$

Como  $V < A_4$ , entonces los subgrupos de  $V$  son subgrupos de  $A_4$ . Estos son:

$$\begin{aligned}\langle (1\ 2)(3\ 4) \rangle &= \{1, (1\ 2)(3\ 4)\} \\ \langle (1\ 3)(2\ 4) \rangle &= \{1, (1\ 3)(2\ 4)\} \\ \langle (1\ 4)(2\ 3) \rangle &= \{1, (1\ 4)(2\ 3)\} \\ V &= \langle (1\ 2)(3\ 4), (1\ 3)(2\ 4) \rangle\end{aligned}$$

Veamos si hay más subgrupos de orden 2. Como 2 es primo, estos han de ser cíclicos generados por un elemento de orden 2; pero no hay más elementos de orden 2 en  $A_4$ . Por tanto, los subgrupos de orden 2 son los anteriormente mencionados.

Veamos ahora los subgrupos de orden 3. Como 3 es primo, estos han de ser cíclicos generados por un elemento de orden 3. Además, hemos de tener en cuenta que  $\langle x \rangle = \langle x^{-1} \rangle$ . Por tanto, los subgrupos de orden 3 son:

$$\begin{aligned} \langle (1\ 2\ 3) \rangle &= \{1, (1\ 2\ 3), (1\ 3\ 2)\} \\ \langle (1\ 2\ 4) \rangle &= \{1, (1\ 2\ 4), (1\ 4\ 2)\} \\ \langle (1\ 3\ 4) \rangle &= \{1, (1\ 3\ 4), (1\ 4\ 3)\} \\ \langle (2\ 3\ 4) \rangle &= \{1, (2\ 3\ 4), (2\ 4\ 3)\} \end{aligned}$$

Veamos ahora los subgrupos de orden 4. Como 4 no es primo, no es tan sencillo. Buscaremos que estén generados por 1, 2, 3 y 4 elementos.

■ Con un elemento:

Los subgrupos generados por un único elemento sabemos que son cíclicos y el orden del elemento ha de ser el orden del grupo. Como no hay elementos de orden 4, no hay subgrupos de orden 4 generados por un único elemento.

■ Con dos elementos:

Supongamos (pues en otro caso ya se habría estudiado) que los dos elementos son distintos y de orden 2 (pues el orden de todo elemento debe dividir al orden del subgrupo al que pertenece). Entonces, llegamos al grupo de Klein, caso ya estudiado. Por tanto, no consideramos generadores de más elementos.

Respecto a los subgrupos de orden 6, en el ejemplo de la página ?? se vió que no existen subgrupos de orden 6 en  $A_4$ . Por tanto, el retículo de subgrupos de  $A_4$  es el de la Figura 1.51.

**Ejercicio 1.3.12.** Fijado un número primo  $p$ , describe el retículo de subgrupos del grupo cíclico  $C_{p^n}$ . En particular, describe el retículo de subgrupos del grupo cíclico  $C_8$ .

Sabemos que, para cada divisor de  $p^n$ , existe un subgrupo de  $C_{p^n}$  de ese orden. En concreto, los únicos subgrupos de  $C_{p^n}$  son los de la forma  $\langle x^{p^k} \rangle$  con  $k \in \{0, \dots, n\}$ . Además:

$$O(\langle x^{p^k} \rangle) = \frac{O(x)}{\text{mcd}(O(x), p^k)} = \frac{p^n}{\text{mcd}(p^n, p^k)} = \frac{p^n}{p^k} = p^{n-k}$$

Por tanto,  $\langle x^{p^k} \rangle = C_{p^{n-k}}$ . Además, fijado  $k \in \{0, \dots, n\}$ , tenemos que  $\langle x^{p^{k+1}} \rangle \subset \langle x^{p^k} \rangle$ , puesto que  $x^{p^{k+1}} = (x^{p^k})^p$ . Por tanto, el retículo de subgrupos de  $C_{p^n}$  es el de la Figura 1.52.

En particular, para  $C_8$ , tenemos que  $p = 2$  y  $n = 3$ . Por tanto, el retículo de subgrupos de  $C_8$  es el de la Figura 1.53.




Figura 1.51: Diagrama de Hasse para los subgrupos del grupo alternado  $A_4$ .




Figura 1.52: Retículo de subgrupos de  $C_{p^n}$  para el Ejercicio 1.3.12.




Figura 1.53: Retículo de subgrupos de  $C_8$  para el Ejercicio 1.3.12.



Figura 1.54: Retículo de subgrupos de para el Ejercicio 1.3.13.




Figura 1.55: Retículo de subgrupos de  $C_6$  para el Ejercicio 1.3.14.

**Ejercicio 1.3.13.** Demostrar que un grupo finito  $G \neq \{1\}$  carece de subgrupos propios, esto es, que su retículo de subgrupos es el de la Figura 1.54 si, y sólo si,  $G = C_p$  es un grupo cíclico de orden primo.

$\implies$ ) Supongamos que  $G$  es un grupo finito que carece de subgrupos propios. Como  $G \neq \{1\}$ , sea  $x \in G \setminus \{1\}$ . Entonces,  $\langle x \rangle \neq \{1\}$  es un subgrupo de  $G$ ; y como este no es propio, entonces  $\langle x \rangle = G$ . Por tanto,  $G$  es cíclico.

Por último, por ser  $G$  cíclico sabemos que, por cada divisor de  $|G|$ , existe un subgrupo de  $G$  de ese orden. Como  $G$  no tiene subgrupos propios, entonces los únicos divisores de  $|G|$  son 1 y  $|G|$ . Por tanto,  $|G|$  es primo.

$\impliedby$ ) Supongamos que  $G = C_p$  es un grupo cíclico de orden primo. Sabemos que, por cada divisor de  $|G|$ , existe un subgrupo de  $G$  de ese orden. Como  $|G| = p$  es primo, entonces los únicos divisores de  $|G|$  son 1 y  $|G|$ . Por tanto,  $G$  carece de subgrupos propios.

**Ejercicio 1.3.14.** Describir los retículos de subgrupos de los grupos cíclicos siguientes:

1.  $C_6$ .

Sabemos que los subgrupos propios de  $C_6$  son de la forma  $\langle x^k \rangle$  con  $k \in \{2, 3\}$ . Además,  $O(x^k) = \frac{6}{\text{mcd}(6,k)} = \frac{6}{k}$ . Por tanto, estos son:

$$\begin{aligned} \langle x^2 \rangle &= \{1, x^2, x^4\} \\ \langle x^3 \rangle &= \{1, x^3\} \end{aligned}$$

Por tanto, el retículo de subgrupos de  $C_6$  es el de la Figura 1.55.

2.  $C_{12}$ .




Figura 1.56: Retículo de subgrupos de  $C_{12}$  para el Ejercicio 1.3.14.

Sabemos que los subgrupos propios de  $C_{12}$  son de la forma  $\langle x^k \rangle$  con  $k \in \{2, 3, 4, 6\}$ . Además,  $O(x^k) = \frac{12}{\text{mcd}(12,k)} = \frac{12}{k}$ . Por tanto, estos son:

$$\begin{aligned} \langle x^2 \rangle &= \{1, x^2, x^4, x^6, x^8, x^{10}\} \\ \langle x^3 \rangle &= \{1, x^3, x^6, x^9\} \\ \langle x^4 \rangle &= \{1, x^4, x^8\} \\ \langle x^6 \rangle &= \{1, x^6\} \end{aligned}$$

Por tanto, el retículo de subgrupos de  $C_{12}$  es el de la Figura 1.56.

**Ejercicio 1.3.15.** Se considera el grupo cíclico  $C_{136}$  de orden 136, con generador  $t$ . ¿Qué relación hay entre los subgrupos  $H_1 = \langle t^{48}, t^{72} \rangle$  y  $H_2 = \langle t^{46} \rangle$ ?

Estudiamos en primer lugar el grupo  $H_2$ . Como  $O(t) = 136$ , entonces:

$$H_2 = \langle t^{46} \rangle = \langle t^{\text{mcd}(136,46)} \rangle = \langle t^2 \rangle$$

Por otro lado:

$$\begin{aligned} H_1 &= \langle t^{48}, t^{72} \rangle = \langle t^{48} \rangle \vee \langle t^{72} \rangle = \langle t^{\text{mcd}(136,48)} \rangle \vee \langle t^{\text{mcd}(136,72)} \rangle \\ &= \langle t^8 \rangle \vee \langle t^8 \rangle = \langle t^8 \rangle \end{aligned}$$

Por tanto, se nos pide estudiar la relación entre los subgrupos  $\langle t^2 \rangle$  y  $\langle t^8 \rangle$ . Puesto que  $t_8 \in \langle t^2 \rangle$ , entonces:

$$H_1 = \langle t^8 \rangle < \langle t^2 \rangle = H_2$$

**Ejercicio 1.3.16.** Demostrar que el grupo de unidades  $\mathbb{Z}_7^\times$  es un grupo cíclico.

**Opción 1.** Veamos que  $O(5) = 6$ :

$$\begin{aligned} 5^2 &= 4 \\ 5^3 &= 6 \\ 5^4 &= 2 \\ 5^5 &= 3 \\ 5^6 &= 1 \end{aligned}$$

Por tanto,  $\mathbb{Z}_7^\times = \langle 5 \rangle$  es un grupo cíclico.

**Opción 2.** Sabemos que  $|\mathbb{Z}_7^\times| = 6$ . Por el Ejercicio 1.3.10, sabemos que hay dos posibilidades, o bien  $\mathbb{Z}_7^\times$  es cíclico, o bien  $\mathbb{Z}_7^\times \cong D_3$ . No obstante, no puede ser isomorfo a  $D_3$ , puesto que  $D_3$  no es abeliano y  $\mathbb{Z}_7^\times$  sí lo es. Por tanto,  $\mathbb{Z}_7^\times$  es cíclico.

**Ejercicio 1.3.17.** Sea  $G$  un grupo y sea  $C_n$  el grupo cíclico de orden  $n$  generado por  $x$ . Demostrar que:

1. Si  $\theta : C_n \rightarrow G$  es un homomorfismo de grupos, entonces:

$$O(\theta(x)) \mid n, \quad \text{y} \quad \theta(x^k) = \theta(x)^k \quad \forall k \in \{0, \dots, n-1\}.$$

Para la primera parte, queremos ver que  $(\theta(x))^n = 1$ . Sabemos que:

$$1 = \theta(1) = \theta(x^n) = \theta(x)^n \implies O(\theta(x)) \mid n$$

Para ver el segundo resultado, es suficiente ver que, por ser un homomorfismo, de hecho se tiene para todo  $k \in \mathbb{Z}$ .

2. Para cada  $g \in G$  tal que  $O(g) \mid n$ , existe un único homomorfismo de grupos  $\theta_g : C_n \rightarrow G$  tal que  $\theta_g(x) = g$ .

Veamos que  $g^n = 1$ . Como  $O(g) \mid n$ , existe  $m \in \mathbb{Z}$  tal que  $n = m \cdot O(g)$ . Por tanto:

$$g^n = g^{m \cdot O(g)} = (g^{O(g)})^m = 1^m = 1$$

Por tanto, por el Teorema de Dyck, existe un único homomorfismo de grupos  $\theta_g : C_n \rightarrow G$  tal que  $\theta_g(x) = g$ .

3. Si  $g \in G$  es tal que  $O(g) \mid n$ , entonces el morfismo  $\theta_g$  es monomorfismo si, y sólo si,  $O(g) = n$ .

Partimos de:

$$\theta_g \text{ es monomorfismo} \iff \ker(\theta_g) = \{1\}$$

Calculemos el núcleo de  $\theta_g$ :

$$\begin{aligned} \ker(\theta_g) &= \{x \in C_n \mid \theta_g(x) = 1\} = \{x^k \mid k \in \{0, \dots, n-1\}, \theta_g(x^k) = 1\} \\ &= \{x^k \mid k \in \{0, \dots, n-1\}, g^k = 1\} \end{aligned}$$

Como  $O(x) = n$ , sabemos que  $x^k \neq 1$  para  $k \in \{1, \dots, n-1\}$ . Por tanto:

$$\ker(\theta_g) = \{1\} \iff g^k \neq 1 \quad \forall k \in \{1, \dots, n-1\} \iff O(g) \geq n$$

Como partimos de que  $O(g) \mid n$ , entonces:

$$\theta_g \text{ es monomorfismo} \iff O(g) = n$$

4. Existe un isomorfismo de grupos

$$\mathcal{U}(\mathbb{Z}_n) \cong \text{Aut}(C_n),$$

dado por  $r \mapsto f_r$  para cada  $r = 1, \dots, n-1$  con  $\text{mcd}(r, n) = 1$ , donde el automorfismo  $f_r$  se define mediante  $f_r(x) = x^r$ .

En particular,  $\text{Aut}(C_n)$  es un grupo abeliano de orden  $\varphi(n)$ .

Para cada  $r \in \{1, \dots, n-1\}$  con  $\text{mcd}(r, n) = 1$  (es decir,  $r \in \mathcal{U}(\mathbb{Z}_n)$ ), definimos el siguiente automorfismo de  $C_n$ :

$$\begin{aligned} f_r : C_n &\longrightarrow C_n \\ x &\longmapsto x^r \end{aligned}$$

Comprobemos en primer lugar que se trata de un automorfismo. Puesto que  $C_n \cong \mathbb{Z}_n$ , entonces  $C_n$  es abeliano y, de ahí, se tiene de forma directa que  $f_r$  es un homomorfismo. Veamos que es inyectivo:

- Inyectividad: Supongamos  $k, l \in \{0, \dots, n-1\}$  tales que  $f_r(x^k) = f_r(x^l)$ . Entonces,  $x^{rk} = x^{rl} \implies x^{r(k-l)} = 1$ . Como  $O(x) = n$ , se tiene que  $n \mid r(k-l)$ . Como además  $\text{mcd}(r, n) = 1$ , entonces  $n \mid k-l$ , tenemos que  $k, l \in \{0, \dots, n-1\}$ , entonces  $k-l = 0$ . Por tanto,  $k = l$ .

Por tanto, por ser inyectivo y ser  $C_r$  finito, entonces  $f_r$  biyectivo. Por tanto,  $f_r$  es un automorfismo. Esto nos permite definir la siguiente función:

$$\begin{aligned} \Phi : \mathcal{U}(\mathbb{Z}_n) &\longrightarrow \text{Aut}(C_n) \\ r &\longmapsto f_r \end{aligned}$$

Dividimos la demostración en varios aspectos:

**Bien definida:** Veamos en primer lugar que  $\Phi$  está bien definida. Para ello, consideramos  $r, s \in \mathbb{Z}$  tales que  $[r] = [s]$ . Entonces,  $s = r + tn$  para algún  $t \in \mathbb{Z}$ . Veamos que  $f_r = f_s$ . Supongamos  $\langle x \rangle = C_n$ . Entonces, para cada  $k \in \{0, \dots, n-1\}$ , se tiene que:

$$\begin{aligned} f_r(x^k) &= x^{rk} \\ f_s(x^k) &= x^{sk} = (x^{r+tn})^k = x^{rk} x^{tnk} = x^{rk} \cdot (x^n)^{tk} = x^{rk} \cdot 1 = x^{rk} \end{aligned}$$

Por tanto,  $f_r = f_s$ , y por tanto  $\Phi$  está bien definida.

**Homomorfismo:** Veamos ahora que  $\Phi$  es un homomorfismo. Para ello, consideramos  $r, s \in \mathcal{U}(\mathbb{Z}_n)$ :

$$\Phi(rs) = f_{rs} \quad \Phi(r) \circ \Phi(s) = f_r \circ f_s$$

Comprobamos que se trata del mismo automorfismo:

$$f_{rs}(x) = x^{rs} = (x^s)^r = f_r(f_s(x)) = (f_r \circ f_s)(x) \quad \forall x \in C_n$$

Por tanto,  $\Phi$  es un homomorfismo.

**Inyectividad:** Veamos ahora que  $\ker(\Phi) = \{1\}$ . Para ello, supongamos que  $\exists k \in \mathcal{U}(\mathbb{Z}_n) \setminus \{1\}$  tal que  $\Phi(k) = f_k = id$ . Entonces, para  $x \in C_n$  con  $O(x) = n$ , se tiene que:

$$f_k(x) = x^k = x \implies x^{k-1} = 1 \implies n \mid k - 1$$

Como además  $k \in \mathcal{U}(\mathbb{Z}_n)$ , entonces  $k < n$ , luego  $k - 1 = 0$  y por tanto  $k = 1$ . Por tanto,  $\ker(\Phi) = \{1\}$ , y por tanto  $\Phi$  es monomorfismo.

**Sobreyectividad:** Veamos ahora que  $\Phi$  es sobreyectivo. Para ello, consideramos  $f \in \text{Aut}(C_n)$ . Consideramos  $x \in C_n$  tal que  $\text{mcd}(x, n) = 1$ , de forma que  $C_n = \langle x \rangle$ . Entonces,  $f(x) \in C_n$ , por lo que  $f(x) = x^r$  para algún  $r \in \{0, \dots, n - 1\}$ . Además, como  $f$  es un epimorfismo, entonces  $C_n = \langle f(x) \rangle = \langle x^r \rangle$ . Por tanto,  $\text{mcd}(r, n) = 1$ , y por tanto  $r \in \mathcal{U}(\mathbb{Z}_n)$ . Veamos que  $f = f_r$ :

$$f(x^k) = f(x)^k = (x^r)^k = x^{rk} = f_r(x^k) \quad \forall k \in \{0, \dots, n - 1\}$$

Por tanto,  $\Phi$  es sobreyectivo. Por tanto,  $\Phi$  es un isomorfismo.

Una vez demostrado eso, como  $\mathcal{U}(\mathbb{Z}_n)$  es finito, entonces  $\text{Aut}(C_n)$  es finito, con:

$$|\text{Aut}(C_n)| = |\mathcal{U}(\mathbb{Z}_n)| = \varphi(n)$$

Además, como  $\mathcal{U}(\mathbb{Z}_n)$  es abeliano, entonces  $\text{Aut}(C_n)$  es abeliano.

**Ejercicio 1.3.18.**

1. Describir explícitamente el grupo de automorfismos  $\text{Aut}(C_8)$ .

Por el Ejercicio 1.3.17, sabemos que  $\text{Aut}(C_8) \cong \mathcal{U}(\mathbb{Z}_8)$ . Calculemos  $\mathcal{U}(\mathbb{Z}_8)$ :

$$\mathcal{U}(\mathbb{Z}_8) = \{1, 3, 5, 7\}$$

Por tanto, hay cuatro automorfismos en  $\text{Aut}(C_8)$ , que son  $f_1 = id$ ,  $f_3$ ,  $f_5$  y  $f_7$  (tal y como definíamos en el Ejercicio 1.3.17). Veámoslo explícitamente en la siguiente tabla:

$x$	$f_1(x)$	$f_3(x)$	$f_5(x)$	$f_7(x)$
1	1	1	1	1
$x$	$x$	$x^3$	$x^5$	$x^7$
$x^2$	$x^2$	$x^6$	$x^2$	$x^6$
$x^3$	$x^3$	$x$	$x^7$	$x^5$
$x^4$	$x^4$	$x^4$	$x^4$	$x^4$
$x^5$	$x^5$	$x^7$	$x$	$x^3$
$x^6$	$x^6$	$x^2$	$x^6$	$x^2$
$x^7$	$x^7$	$x^5$	$x^3$	$x$

2. Demostrar que  $\text{Aut}(C_8)$  es isomorfo al grupo de Klein.

Por el apartado anterior, sabemos que  $|\text{Aut}(C_8)| = 4$ . Por el Ejercicio 1.3.10, sabemos que hay dos posibilidades, o bien  $\text{Aut}(C_8)$  es cíclico, o bien  $\text{Aut}(C_8) \cong V$ .

Supongamos que  $\text{Aut}(C_8)$  es cíclico. Entonces,  $\exists f \in \text{Aut}(C_8) \mid O(f) = 4$ . Para cada  $x \in C_8$ , tenemos que:

$$(f_3 \circ f_3)(x) = f_3(x^3) = x^9 = x$$

$$(f_5 \circ f_5)(x) = f_5(x^5) = x^{25} = x$$

$$(f_7 \circ f_7)(x) = f_7(x^7) = x^{49} = x$$

Por tanto,  $O(f_3) = O(f_5) = O(f_7) = 2$ , lo cual es una contradicción. Por tanto,  $\text{Aut}(C_8)$  no es cíclico, y por tanto  $\text{Aut}(C_8) \cong V$ .

## 1.4. Grupos cociente. Teoremas de isomorfismo. Productos

**Ejercicio 1.4.1.** Demostrar que si  $G \leq S_n$ , entonces  $G \subseteq A_n$  o bien se tiene que  $[G : G \cap A_n] = 2$ . Concluir que un subgrupo de  $S_n$  consiste sólo en permutaciones pares, o bien contiene el mismo número de permutaciones pares que de impares.

Sea  $G \leq S_n$  un subgrupo de  $S_n$ . O bien  $G \subseteq A_n$  (en cuyo caso consiste sólo de permutaciones pares); o bien  $\exists \sigma \in G$  tal que  $\sigma \notin A_n$ , es decir,  $\varepsilon(\sigma) = -1$ . Para ver que  $[G : G \cap A_n] = 2$ , hay varias posibilidades.

**Opción 1:** Consideramos el homomorfismo  $\varepsilon : G \rightarrow \{-1, 1\}$  dado por la aplicación signatura. Calculemos su núcleo y su imagen:

$$\begin{aligned} \ker(\varepsilon) &= \{\sigma \in G \mid \varepsilon(\sigma) = 1\} = A_n \cap G, \\ \text{Im}(\varepsilon) &= \{\varepsilon(\sigma) \mid \sigma \in G\} \stackrel{(*)}{=} \{-1, 1\} \end{aligned}$$

donde vamos a razonar el por qué de (\*). Como  $1 \in G$  por ser este un grupo, entonces  $1 \in \text{Im}(\varepsilon)$ , y como  $\exists \sigma \in G$  tal que  $\varepsilon(\sigma) = -1$ , entonces  $-1 \in \text{Im}(\varepsilon)$ . Por lo tanto,  $\text{Im}(\varepsilon) = \{-1, 1\}$ . Por el Primer Teorema de Isomorfía, se tiene que:

$$\frac{G}{\ker(\varepsilon)} \cong \text{Im}(\varepsilon) \implies \frac{G}{A_n \cap G} \cong \{-1, 1\} \cong \mathbb{Z}_2.$$

Por definición de índice, se tiene que:

$$[G : A_n \cap G] = \left| \frac{G}{A_n \cap G} \right| = |\mathbb{Z}_2| = 2$$

**Opción 2:** Por el Teorema de Lagrange, sabemos que:

$$[S_n : A_n] = \frac{|S_n|}{|A_n|} = 2 \implies A_n \triangleleft S_n$$

Aplicando el Segundo Teorema de Isomorfía a  $G$  y  $A_n$ , tenemos que:

$$\frac{G}{G \cap A_n} \cong \frac{GA_n}{A_n}$$

Veamos qué grupo es  $GA_n$ . En primer lugar, para  $1 \in G$  vemos que  $A_n \subset GA_n$ . No obstante, como  $\exists \sigma \in G$  con  $\varepsilon(\sigma) = -1$ , entonces  $A_n \neq GA_n$ , por lo que  $|GA_n| > |A_n| = |S_n|/2$ . Como  $|GA_n| \mid |S_n|$ , ha de ser  $|GA_n| = |S_n|$ , por lo que  $GA_n = S_n$ . Por tanto:

$$\frac{G}{G \cap A_n} \cong \frac{S_n}{A_n}$$

Por definición de índice, se tiene que:

$$[G : A_n \cap G] = \left| \frac{G}{A_n \cap G} \right| = \left| \frac{S_n}{A_n} \right| = \frac{|S_n|}{|A_n|} = 2$$

En cualquier caso, hemos visto que  $[G : A_n \cap G] = 2$ . Por el Teorema de Lagrange, se tiene que  $|G| = 2 \cdot |G \cap A_n|$ , por lo que la mitad de las permutaciones de  $G$  son pares. Como una permutación o bien es par o es impar, entonces la otra mitad ha de tener signatura impar. Por tanto, contiene el mismo número de permutaciones pares que de impares.

**Ejercicio 1.4.2.** Sea  $\mathbb{K}$  un cuerpo.

1. Se considera la siguiente aplicación:

$$\begin{aligned} \det : \text{GL}_n(\mathbb{K}) &\longrightarrow \mathbb{K}^\times \\ G &\longmapsto \det(G) \end{aligned}$$

Demostrar que dicha aplicación es un epimorfismo de grupos. ¿Cuál es el núcleo de este homomorfismo?

Para comprobar que se trata de un homomorfismo, tomamos  $A, B \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$  y por las propiedades de la determinante, se tiene que:

$$\det(AB) = \det(A) \cdot \det(B)$$

Por otro lado, para cada  $a \in \mathbb{K}^\times$ , se considera la siguiente matriz:

$$A_a = \begin{pmatrix} a & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

Como  $\det(A_a) = a \neq 0$ , entonces  $A_a \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$ . Como  $\det(A_a) = a$ , se tiene que  $\det$  es sobreyectiva. Por lo tanto,  $\det$  es un epimorfismo de grupos. Su núcleo es:

$$\ker(\det) = \{A \in \text{GL}_n(\mathbb{K}) \mid \det(A) = 1\} = \text{SL}_n(\mathbb{K})$$

2. Si  $\mathbb{K}$  es un cuerpo finito con  $q$  elementos, determinar el orden del grupo  $\text{SL}_n(\mathbb{K})$ .

Por el Primer Teorema de Isomorfía, se tiene que:

$$\frac{\text{GL}_n(\mathbb{K})}{\text{SL}_n(\mathbb{K})} \cong \mathbb{K}^\times$$

Por el Teorema de Lagrange, se tiene que:

$$|\text{SL}_n(\mathbb{K})| = \frac{|\text{GL}_n(\mathbb{K})|}{|\mathbb{K}^\times|} = \frac{|\text{GL}_n(\mathbb{K})|}{q-1} = \frac{(q^n-1)(q^n-q)\cdots(q^n-q^{n-1})}{q-1}$$

**Ejercicio 1.4.3.** Sea  $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ , y sea  $G$  un grupo verificando que para todo par de elementos  $x, y \in G$  se tiene que  $(xy)^n = x^n y^n$ . Se definen:

$$\begin{aligned} H &= \{x \in G \mid x^n = 1\}, \\ K &= \{x^n \mid x \in G\}. \end{aligned}$$

Demostrar que  $H, K \triangleleft G$ , y que  $|K| = [G : H]$ .

Definimos en primer lugar la siguiente aplicación:

$$\begin{aligned} f : G &\longrightarrow G \\ x &\longmapsto x^n \end{aligned}$$

Para demostrar que se trata de un homomorfismo emplearemos la propiedad dada en el enunciado (\*):

$$f(xy) = (xy)^n \stackrel{(*)}{=} x^n y^n = f(x)f(y) \quad \forall x, y \in G$$

Por tanto,  $f$  es un homomorfismo. Como  $\{1\}, G < G$ , entonces los siguientes grupos son subgrupos de  $G$ :

$$\begin{aligned} f^*(\{1\}) &= \{x \in G \mid f(x) = 1\} = \{x \in G \mid x^n = 1\} = H = \ker(f), \\ f_*(G) &= \{f(x) \mid x \in G\} = \{x^n \mid x \in G\} = K = \text{Im}(f). \end{aligned}$$

Por tanto, tenemos que  $H, K < G$ . Probamos ahora que son grupos normales en  $G$ . Como  $H = \ker f$  y  $f$  es un homomorfismo, se tiene que  $H \triangleleft G$ . Ahora probamos que  $K$  es normal en  $G$ . Tomamos  $x \in G$  y  $k \in K$  (por lo que  $\exists y \in G$  tal que  $k = y^n$ ). Entonces, consideramos  $xyx^{-1} \in G$  y calculamos:

$$xkx^{-1} = x(y^n)x^{-1} = (xyx^{-1})^n \in K$$

Por tanto,  $K \triangleleft G$ . Para probar que  $|K| = [G : H]$ , tomamos el homomorfismo  $f$  anteriormente descrito. Por el Primer Teorema de Isomorfía, se tiene que:

$$\frac{G}{H} \cong K \implies |K| = \left| \frac{G}{H} \right| = [G : H]$$

**Ejercicio 1.4.4.** Para un grupo  $G$  se define su *centro* como

$$Z(G) = \{a \in G \mid ax = xa \forall x \in G\}.$$

1. Demostrar que  $Z(G) < G$ .

Como  $Z(G) \subset G$ , hay dos principales posibilidades, ambas equivalentes:

**Opción 1:** Comprobamos las tres condiciones que caracterizan a los subgrupos:

- $1 \in Z(G)$ : Para todo  $x \in G$ , se tiene que  $1x = x1 = x$ .
- $a, b \in Z(G) \implies ab \in Z(G)$ : Para todo  $x \in G$ , se tiene que:

$$(ab)x = a(bx) = a(xb) = (ax)b = (xa)b = x(ab).$$

- $a \in Z(G) \implies a^{-1} \in Z(G)$ : Para todo  $x \in G$ , se tiene que:

$$a^{-1}x = (x^{-1}a)^{-1} = (ax^{-1})^{-1} = xa^{-1}.$$

**Opción 2:** Dados  $a, b \in Z(G)$ , comprobemos que  $ab^{-1} \in Z(G)$ :

$$(ab^{-1})x = a(b^{-1}x) = a(x^{-1}b)^{-1} = a(bx^{-1})^{-1} = a(xb^{-1}) = (ax)b^{-1} = (xa)b^{-1} = x(ab^{-1}).$$

En cualquier caso,  $Z(G)$  es un subgrupo de  $G$ .

2. Demostrar que  $Z(G) \triangleleft G$ .

De nuevo, hay dos posibilidades:

**Opción 1:** Para  $x \in G$ . Entonces:

$$xZ(G) = \{xz \mid z \in Z(G)\} = \{zx \mid z \in Z(G)\} = Z(G)x.$$

**Opción 2:** Empleamos la caracterización de subgrupo normal. Para  $x \in G$  y  $z \in Z(G)$ , buscamos ver que  $xzx^{-1} \in Z(G)$ :

$$xzx^{-1}y = zx x^{-1}y = zy = yz = yzx x^{-1} = yxzx^{-1} \quad \forall y \in G.$$

En ambos casos, se tiene que  $Z(G) \triangleleft G$ .

3. Demostrar que  $G$  es abeliano si, y sólo si,  $G = Z(G)$ .

$$G = Z(G) \iff G = \{a \in G \mid ax = xa \forall x \in G\} \iff ax = xa \forall a, x \in G \iff G \text{ es abeliano.}$$

4. Demostrar que si  $G/Z(G)$  es cíclico, entonces  $G$  es abeliano.

Como  $G/Z(G)$  es cíclico, entonces existe  $x \in G$  tal que  $G/Z(G) = \langle xZ(G) \rangle$ . Como las clases de equivalencia forman una partición disjunta de  $G$ , para cada  $y \in G$  existe  $k \in \mathbb{Z}$  tal que  $y \in x^k Z(G)$ . Buscamos ahora demostrar que  $G$  es abeliano. Dados  $a, b \in G$ , entonces existen  $p, q \in \mathbb{Z}$  tales que  $a \in x^p Z(G)$  y  $b \in x^q Z(G)$ . Entonces, existen  $z_a, z_b \in Z(G)$  tales que  $a = x^p z_a$  y  $b = x^q z_b$ . Por tanto:

$$ab = (x^p z_a)(x^q z_b) = x^{p+q} z_a z_b = x^q z_b x^p z_a = (x^q z_b)(x^p z_a) = ba$$

Por tanto,  $ab = ba$  para todo  $a, b \in G$ , por lo que  $G$  es abeliano.

**Ejercicio 1.4.5.** Determinar el centro del grupo diédrico  $D_4$ . Observar que el cociente  $D_4/Z(D_4)$  es abeliano, aunque  $D_4$  no lo sea (compárese este hecho con el tercer apartado del ejercicio anterior).

El grupo  $D_4$  está formado por las siguientes rotaciones y reflexiones:

$$D_4 = \{1, r, r^2, r^3, s, sr, sr^2, sr^3\}$$

Sabemos que  $Z(D_4)$  es un subgrupo normal de  $D_4$ . En primer lugar, sabemos que  $1 \in Z(D_4)$ . Veamos que  $r^2 \in Z(D_4)$ . En primer lugar, vemos que conmuta con todas las potencias de  $r$ . Veamos ahora que conmuta con el resto de elementos:

$$\begin{aligned} r^2 s &= r s r^3 = s r^6 = s r^2 \\ r^2 sr &= s r^2 r = s r r^2 \\ r^2 sr^2 &= s r r^2 r = s = s r^4 = s r^2 r^2 \\ r^2 sr^3 &= s r = s r^5 = s r^3 r^2 \end{aligned}$$

Por tanto,  $\{1, r^2\} \subset Z(D_4)$ . Además, tenemos que:

$$\begin{aligned} sr = r^3s \neq rs &\implies s, r \notin Z(D_4) \\ sr^3 = r^9s = rs \neq r^3s &\implies r^3 \notin Z(D_4) \\ sr^2s = r^3 \neq r &\implies sr \notin Z(D_4) \\ sr^3s = r \neq r^3 &\implies sr^3 \notin Z(D_4) \end{aligned}$$

Como  $|Z(D_4)|$  divide a  $|D_4| = 8$  y  $2 \leq |Z(D_4)| \leq 3$ , se tiene que  $|Z(D_4)| = 2$ . Por tanto,

$$Z(D_4) = \{1, r^2\}$$

Veamos que  $D_4/Z(D_4)$  es abeliano. Sabemos que:

$$|D_4/Z(D_4)| = \frac{|D_4|}{|Z(D_4)|} = \frac{8}{2} = 4$$

Por tanto,  $D_4/Z(D_4)$  es isomorfo a  $V$  o a  $C_4$ . Por el último apartado del ejercicio anterior, si fuese  $D_4/Z(D_4)$  isomorfo a  $C_4$ , entonces  $D_4$  sería abeliano. Como no lo es, se tiene que  $D_4/Z(D_4) \cong V$ . Como  $V$  es abeliano, se tiene que  $D_4/Z(D_4)$  también lo es.

**Ejercicio 1.4.6.** Determinar el centro de los grupos  $S_n$  y  $A_n$  para  $n \geq 2$ .

Para  $n = 2$ , tenemos que:

$$\begin{aligned} S_2 = \{1, (1\ 2)\} &\implies Z(S_2) = S_2 \\ A_2 = \{1\} &\implies Z(A_2) = A_2 \end{aligned}$$

Calculamos ahora  $Z(S_n)$  para  $n \geq 3$ . Sea  $\sigma \neq 1 \in S_n$ . Entonces,  $\exists i, j \in \{1, \dots, n\}$  tales que  $i \neq j$  y  $\sigma(i) = j$ . Consideramos ahora  $k \in \{1, \dots, n\}$  tal que  $k \neq i, j$ , y sea la permutación  $\tau = (j\ k)$ . Entonces:

$$\begin{aligned} \sigma\tau(i) &= \sigma(i) = j \\ \tau\sigma(i) &= \tau(j) = k \end{aligned}$$

Por tanto,  $\sigma\tau \neq \tau\sigma$ . Como  $\sigma$  es arbitrario, se tiene que  $Z(S_n) = \{1\}$  para  $n \geq 3$ .

Trabajamos ahora con  $A_n$ . En primer lugar, para  $n = 3$  tenemos que  $|A_3| = 3$  primo, por lo que  $A_3$  es cíclico y en particular abeliano. Por tanto,  $Z(A_3) = A_3$ .

Para  $n \geq 4$ , sea  $\sigma \in A_n$  tal que  $\sigma \neq 1$ . Entonces,  $\exists i, j \in \{1, \dots, n\}$  tales que  $i \neq j$  y  $\sigma(i) = j$ . Consideramos ahora  $k, l \in \{1, \dots, n\} \setminus \{i, j\}$ , tal que  $k \neq l$ . Consideramos ahora  $\tau = (j\ k\ l) \in A_n$ . Entonces:

$$\begin{aligned} \sigma\tau(i) &= \sigma(i) = j \\ \tau\sigma(i) &= \tau(j) = k \end{aligned}$$

Por tanto,  $\sigma\tau \neq \tau\sigma$ . Como  $\sigma$  es arbitrario, se tiene que  $Z(A_n) = \{1\}$  para  $n \geq 4$ . Notemos que hemos tenido que imponer que  $n \geq 4$  para que podamos elegir 4 elementos distintos.

**Ejercicio 1.4.7.** Determinar el centro del grupo  $D_n$  para  $n \geq 3$ .

Dado  $z \in D_n$ , como  $D_n = \langle r, s \rangle$  entonces  $z \in Z(D_n)$  si y sólo si  $z$  conmuta con  $r$  y con  $s$ . Distinguiamos según los elementos de  $D_n$ :

- $1 \in Z(D_n)$  para todo  $n \geq 3$ .
- Fijado  $m \in \{1, \dots, n-1\}$ , veamos si  $r^m \in Z(D_n)$ .

$$r^m r = r^{m+1} = r r^m$$

$$r^m s = sr^{m(n-1)} = sr^{-m} = sr^{n-m} = s r^m \iff r^{n-m} = r^m \stackrel{(*)}{\iff} n-m = m \iff n = 2m$$

donde en  $(*)$  hemos usado que  $n-m, m \in \{1, \dots, n-1\}$ . Por tanto, hay que distinguir según la paridad de  $n$ :

- Si  $n$  es impar, entonces  $r^m \notin Z(D_n)$  para todo  $m \in \{1, \dots, n-1\}$ .
- Si  $n$  es par, entonces  $r^{n/2} \in Z(D_n)$ , y  $r^m \notin Z(D_n)$  para todo valor de  $m \in \{1, \dots, n-1\} \setminus \{n/2\}$ .
- Fijado  $m \in \{0, \dots, n-1\}$ , veamos si  $sr^m \in Z(D_n)$ .

$$\begin{aligned} sr^m r &= sr^{m+1} = r^{(m+1)(n-1)} s = r^{mn-m+n-1} s = r^{n-m-1} s \\ r sr^m &= r r^{n-m} s = r^{n-m+1} s \end{aligned}$$

Por tanto, se necesita que  $r^{n-m-1} = r^{n-m+1}$ , y equivalentemente se necesita que  $r^{-1} = r$ , es decir, que  $r^2 = 1$ . Esto es cierto para  $n = 2$ , pero no para  $n \geq 3$ . Por tanto,  $sr^m \notin Z(D_n)$  para todo  $m \in \{0, \dots, n-1\}$ .

En resumen, tenemos que:

- Si  $n$  es impar, entonces  $Z(D_n) = \{1\}$ .
- Si  $n$  es par, entonces  $Z(D_n) = \{1, r^{n/2}\}$ .

**Ejercicio 1.4.8.** Sean  $H$  y  $K$  dos subgrupos finitos de un grupo  $G$ , uno de ellos normal. Demostrar que

$$|H||K| = |HK||H \cap K|.$$

Sean  $H, K < G$ , y  $K \triangleleft G$ . Entonces, por el Segundo Teorema de Isomorfía, se tiene que:

$$\frac{HK}{K} \cong \frac{H}{H \cap K}$$

Tomando índices y usando el Teorema de Lagrange, se tiene que:

$$\left| \frac{HK}{K} \right| = \frac{|HK|}{|K|} = \left| \frac{H}{H \cap K} \right| = \frac{|H|}{|H \cap K|} \implies |H||K| = |HK||H \cap K|.$$

Si por el contrario  $H \triangleleft G$ , entonces:

$$\frac{HK}{H} \cong \frac{K}{H \cap K}$$

y de igual forma se llega a la misma conclusión.

**Ejercicio 1.4.9.** Sea  $G$  finito y  $N \triangleleft G$ . Probar que  $G/N \cong G$  si, y sólo si,  $N = \{1\}$ , y que  $G/N \cong \{1\}$  si, y sólo si,  $N = G$ .

Veamos que  $G/N \cong G$  si, y sólo si,  $N = \{1\}$ .

$\implies$ ) Supongamos que  $G/N \cong G$ . Entonces, por el Teorema de Lagrange, se tiene que:

$$|G| = |G/N| = \frac{|G|}{|N|} \implies |N| = 1 \implies N = \{1\}.$$

$\impliedby$ ) Supongamos que  $N = \{1\}$ . Definimos ahora el homomorfismo siguiente:

$$\begin{aligned} f: G &\longrightarrow G \\ x &\longmapsto x \end{aligned}$$

Tenemos que:

$$\begin{aligned} \ker(f) &= \{x \in G \mid f(x) = 1\} = \{x \in G \mid x = 1\} = \{1\} = N, \\ \text{Im}(f) &= \{f(x) \mid x \in G\} = \{x \mid x \in G\} = G \end{aligned}$$

Por tanto, por el Primer Teorema de Isomorfía, se tiene que:

$$\frac{G}{N} \cong G$$

Veamos ahora que  $G/N \cong \{1\}$  si, y sólo si,  $N = G$ .

$\implies$ ) Supongamos que  $G/N \cong \{1\}$ . Entonces, por el Teorema de Lagrange, se tiene que:

$$1 = |G/N| = \frac{|G|}{|N|} \implies |G| = |N|$$

Como  $N \leq G$ , se tiene que  $N \subset G$ , y por tanto  $N = G$ .

$\impliedby$ ) Supongamos que  $N = G$ . Entonces, definimos el homomorfismo siguiente:

$$\begin{aligned} f: G &\longrightarrow \{1\} \\ x &\longmapsto 1 \end{aligned}$$

Entonces, tenemos que:

$$\begin{aligned} \ker(f) &= \{x \in G \mid f(x) = 1\} = \{x \in G \mid 1 = 1\} = G = N, \\ \text{Im}(f) &= \{f(x) \mid x \in G\} = \{1 \mid x \in G\} = \{1\} \end{aligned}$$

Por tanto, por el Primer Teorema de Isomorfía, se tiene que:

$$\frac{G}{N} \cong \{1\}$$

*Observación.* Notemos que en las implicaciones hacia la izquierda no es necesario suponer que  $G$  es finito. Lo usaremos por tanto sin esta restricción.

**Ejercicio 1.4.10.** Sean  $G$  y  $H$  dos grupos cuyos órdenes sean primos relativos. Probar que si  $f : G \rightarrow H$  es un homomorfismo, entonces necesariamente  $f(x) = 1$  para todo  $x \in G$ , es decir, que el único homomorfismo entre ellos es el trivial.

### Opción 1

Como  $|G|$  y  $|H|$  son primos relativos, en particular son grupos finitos. Por ser  $f$  un homomorfismo, se tiene que  $f(G) < H$ , luego  $|f(G)| \mid |H|$ . Por el Primer Teorema de Isomorfía, se tiene que:

$$\frac{G}{\ker(f)} \cong f(G) \implies |G| = |\ker(f)| \cdot |f(G)| \implies |f(G)| \mid |G|$$

Como  $\text{mcd}(|G|, |H|) = 1$ , se tiene que  $|f(G)| = 1$ . Como además  $f(G)$  es un grupo, se tiene que  $f(G) = \{1\}$ . Por tanto,  $f$  es el homomorfismo trivial.

### Opción 2

Sea  $y \in f(G)$ . Entonces,  $\exists x \in G$ ,  $x \neq 1$ , tal que  $f(x) = y$ . Como  $G$  es finito,  $\exists n \in \mathbb{N}$  tal que  $\text{ord}(x) = n$ , luego  $n \mid |G|$ . Por otro lado:

$$1 = f(1) = f(x^n) = f(x)^n = y^n \in H \implies n \mid \text{ord}(y)$$

Como  $\text{ord}(y) \mid |H|$ , se tiene que  $n \mid |H|$ . Por tanto,  $n \mid \text{mcd}(|G|, |H|) = 1$ , luego  $n = 1$ . Por tanto,  $\text{ord}(x) = 1$ , por lo que  $x = 1$ . Por tanto,  $y = f(x) = f(1) = 1$  para todo  $y \in f(G)$ . Por tanto,  $f$  es el homomorfismo trivial.

**Ejercicio 1.4.11.** Sean  $H, K \leq G$ , y sea  $N \triangleleft G$  un subgrupo normal de  $G$  tal que  $HN = KN$ . Demostrar que

$$\frac{H}{H \cap N} \cong \frac{K}{K \cap N}.$$

Aplicamos dos veces el Segundo Teorema de Isomorfía:

- Consideramos  $H, N \leq G$ , con  $N \triangleleft G$ . Entonces, por el Segundo Teorema de Isomorfía, se tiene que:

$$\frac{HN}{N} \cong \frac{H}{H \cap N}$$

- Consideramos  $K, N \leq G$ , con  $N \triangleleft G$ . Entonces, por el Segundo Teorema de Isomorfía, se tiene que:

$$\frac{KN}{N} \cong \frac{K}{K \cap N}$$

Como  $KN = HN$  y “ser isomorfo” es una relación de equivalencia, se tiene que:

$$\frac{H}{H \cap N} \cong \frac{HN}{N} = \frac{KN}{N} \cong \frac{K}{K \cap N}$$

**Ejercicio 1.4.12.** Sea  $N \triangleleft G$  tal que  $N$  y  $G/N$  son abelianos. Sea  $H$  un subgrupo cualquiera de  $G$ . Demostrar que existe un subgrupo normal  $K \triangleleft H$  tal que  $K$  y  $H/K$  son abelianos.

Por el Segundo Teorema de Isomorfía, se tiene que  $K = H \cap N \triangleleft H$ . Como  $K \subset N$  y  $K$  es un grupo, entonces  $K \leq N$ . Como  $N$  es abeliano, se tiene que  $K$  también lo es. Nos falta por ver que  $H/K$  es abeliano. Por el Segundo Teorema de Isomorfía, se tiene que:

$$\frac{H}{K} \cong \frac{HN}{N}$$

Veamos ahora que  $HN/N \leq G/N$ . Como  $HN \subset G$ , por definición de conjunto cociente se tiene que  $HN/N \subset G/N$ . Como  $HN/N$  es un grupo, se tiene que  $HN/N \leq G/N$ . Como  $G/N$  es abeliano, se tiene que  $HN/N$  también lo es. Por tanto, por el Segundo Teorema de Isomorfía, se tiene que  $H/K$  es abeliano.

**Ejercicio 1.4.13.** Sea  $G$  un grupo finito, y sean  $H, K \leq G$ , con  $K \triangleleft G$  y tales que  $|H|$  y  $[G : K]$  son primos relativos. Demostrar que  $H \subseteq K$ .

Por el Segundo Teorema de Isomorfía, se tiene que:

$$\frac{H}{H \cap K} \cong \frac{HK}{K}$$

Como  $HK \leq G$ , entonces  $HK/K \leq G/K$ . Por tanto  $|\frac{H}{H \cap K}| = |\frac{HK}{K}|$  divide a  $|\frac{G}{K}| = [G : K]$ . Por otro lado:

$$\left| \frac{H}{H \cap K} \right| = \frac{|H|}{|H \cap K|} \implies |H| = |H \cap K| \cdot \left| \frac{H}{H \cap K} \right| \implies \left| \frac{H}{H \cap K} \right| \mid |H|$$

Como  $\text{mcd}(|H|, [G : K]) = 1$ , se tiene que  $|\frac{H}{H \cap K}| = 1$ . Por tanto,  $|H| = |H \cap K|$ , y como  $H \cap K \subset H$ , se tiene que  $H \cap K = H$ . Por tanto,  $H \subset K$ .

**Ejercicio 1.4.14.** Sea  $G$  un grupo.

1. Demostrar que para cada  $a \in G$  la aplicación  $\varphi_a : G \rightarrow G$  definida por  $\varphi_a(x) = axa^{-1}$ , es un automorfismo de  $G$ .  $\varphi_a$  se llama automorfismo interno o de conjugación de  $G$  definido por  $a$ .

Vemos en primer lugar que está bien definida, puesto que un grupo es cerrado para inversos y productos. Por tanto,  $\varphi_a(x) \in G$  para todo  $x \in G$ . Veamos ahora que es un isomorfismo:

- Para ver que es un homomorfismo:

$$\varphi_a(xy) = a(xy)a^{-1} = axa^{-1}aya^{-1} = \varphi_a(x)\varphi_a(y) \quad \forall x, y \in G$$

- Para ver que es inyectiva, sean  $x, y \in G$  de forma que:

$$\varphi_a(x) = axa^{-1} = aya^{-1} = \varphi_a(y)$$

Entonces, aplicando dos veces la propiedad cancelativa, tenemos que:

$$axa^{-1} = aya^{-1} \implies ax = ay \implies x = y$$

- Para ver que es sobreyectiva, sea  $y \in G$ , tomamos  $x = a^{-1}ya$ . Entonces:

$$\varphi_a(x) = \varphi_a(a^{-1}ya) = a(a^{-1}ya)a^{-1} = aa^{-1}yaa^{-1} = y$$

Concluimos que  $\varphi_a$  es un automorfismo de  $G$ .

2. Demostrar que la siguiente aplicación es un homomorfismo:

$$\begin{aligned} \varphi : G &\longrightarrow \text{Aut}(G) \\ a &\longmapsto \varphi_a \end{aligned}$$

Para esto, es necesario probar que, fijados  $a, b \in G$ , se tiene que:

$$\varphi_{ab} = \varphi_a \circ \varphi_b$$

Tenemos que:

$$\varphi_{ab}(x) = (ab)x(ab)^{-1} = (ab)x(b^{-1}a^{-1}) = a(bxb^{-1})a^{-1} = a\varphi_b(x)a^{-1} = \varphi_a(\varphi_b(x)) \quad \forall x \in G$$

Por tanto,  $\varphi_{ab} = \varphi_a \circ \varphi_b$ . Por tanto,  $\varphi$  es un homomorfismo de grupos.

3. Demostrar que el conjunto de automorfismos internos de  $G$ , que se denota  $\text{Int}(G)$ , es un subgrupo normal de  $\text{Aut}(G)$ .

Para ello, en primer lugar es necesario ver que  $\text{Int}(G) < \text{Aut}(G)$ . Considerados  $a, b \in G$ , tenemos que:

$$\begin{aligned} (\varphi_a \circ \varphi_b^{-1})(x) &= \varphi_a(b^{-1}xb) = a(b^{-1}xb)a^{-1} = ab^{-1}xba^{-1} = \\ &= (ab^{-1})x(ab^{-1})^{-1} = \varphi_{ab^{-1}}(x) \quad \forall x \in G \end{aligned}$$

Veamos ahora que  $\text{Int}(G) \triangleleft \text{Aut}(G)$ . Para ello es necesario ver que se tiene  $f \circ \varphi \circ f^{-1} \in \text{Int}(G)$  para todo  $f \in \text{Aut}(G)$  y  $\varphi \in \text{Int}(G)$ . Sea  $f \in \text{Aut}(G)$  y  $\varphi_a \in \text{Int}(G)$ . Entonces, tenemos que:

$$\begin{aligned} (f \circ \varphi_a \circ f^{-1})(x) &= f(\varphi_a(f^{-1}(x))) = f(a(f^{-1}(x))a^{-1}) \\ &= f(a)f(f^{-1}(x))f(a^{-1}) = f(a)xf(a^{-1}) = \varphi_{f(a)}(x) \in \text{Int}(G) \end{aligned}$$

Por tanto,  $f \circ \varphi_a \circ f^{-1} \in \text{Int}(G)$ , y por tanto  $\text{Int}(G) \triangleleft \text{Aut}(G)$ .

4. Demostrar que  $G/Z(G) \cong \text{Int}(G)$ .

Buscamos aplicar el Primer Teorema de Isomorfía al homomorfismo  $\varphi$  del apartado 2. Tenemos que:

$$\begin{aligned} \ker(\varphi) &= \{a \in G \mid \varphi_a = \text{Id}_G\} = \{a \in G \mid \varphi_a(x) = x \forall x \in G\} \\ &= \{a \in G \mid axa^{-1} = x \forall x \in G\} = \{a \in G \mid ax = xa \forall x \in G\} = Z(G) \\ \text{Im}(\varphi) &= \{\varphi_a \mid a \in G\} = \{f \in \text{Aut}(G) \mid f(x) = axa^{-1} \forall x \in G\} = \text{Int}(G) \end{aligned}$$

Por tanto, por el Primer Teorema de Isomorfía, se tiene que:

$$\frac{G}{Z(G)} \cong \text{Int}(G)$$

5. Demostrar que  $\text{Int}(G) = \{\text{Id}_G\}$  si y sólo si  $G$  es abeliano.

**Opción 1.**

$\implies$ ) Supongamos que  $\text{Int}(G) = \{\text{Id}_G\}$ . Entonces, para todo  $a \in G$ , se tiene que:

$$\varphi_a = \text{Id}_G \implies axa^{-1} = x \quad \forall x \in G$$

Por tanto,  $ax = xa \quad \forall x \in G$ . Como  $a$  es arbitrario, se tiene que  $G$  es abeliano.

$\impliedby$ ) Supongamos que  $G$  es abeliano. Entonces, para todo  $a \in G$ , se tiene que:

$$\varphi_a(x) = axa^{-1} = aa^{-1}x = x \quad \forall x \in G$$

Por tanto,  $\varphi_a = \text{Id}_G$ . Como  $a$  es arbitrario, concluimos entonces que  $\text{Int}(G) = \{\text{Id}_G\}$ .

**Opción 2.** (Esta opción solo es válida si  $G$  es finito).

Como  $G/Z(G) \cong \text{Int}(G)$ , aplicando el Ejercicio 1.4.9, tenemos que:

$$\text{Int}(G) = \{1\} \iff G = Z(G) \iff G \text{ es abeliano}$$

**Ejercicio 1.4.15.** Demostrar que el grupo de automorfismos de un grupo no abeliano no puede ser cíclico.

Sea  $G$  un grupo no abeliano. Por el recíproco del Ejercicio 1.4.4.4, sabemos que  $G/Z(G)$  no es cíclico. Como  $G/Z(G) \cong \text{Int}(G)$ , se tiene que  $\text{Int}(G)$  no es cíclico. Como  $\text{Int}(G) < \text{Aut}(G)$  y todo subgrupo de un grupo cíclico es cíclico, se tiene que  $\text{Aut}(G)$  no es cíclico.

**Ejercicio 1.4.16.** Demostrar que  $\text{Aut}(\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2) \cong S_3$ .

Sabemos que:

$$\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \cong V^{\text{abs}} = \langle x, y \mid x^2 = y^2 = 1, xy = yx \rangle$$

Construimos ahora automorfismos de  $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ . Sabemos que todos los elementos de  $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$  (a excepción del neutro) son de orden 2, y además este grupo es conmutativo. Por tanto, con el Teorema de Dyck podemos construir automorfismos de forma sencilla. Haciendo uso de que  $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 = \langle (1, 0), (0, 1) \rangle$ , tenemos los siguientes automorfismos:

	$f_1$	$f_2$	$f_3$	$f_4$	$f_5$	$f_6$
$f_i(1, 0)$	(1, 0)	(1, 0)	(0, 1)	(0, 1)	(1, 1)	(1, 1)
$f_i(0, 1)$	(0, 1)	(1, 1)	(1, 0)	(1, 1)	(0, 1)	(1, 0)

Además, no puede haber más automorfismos, puesto que fijada la imagen de un elemento generador, la imagen del otro elemento generador tan solo tiene dos posibilidades, puesto que no puede ser el neutro. Por tanto, tenemos que:

$$|\text{Aut}(\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2)| = 6$$

Por tanto,  $\text{Aut}(\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2)$  es un grupo de orden 6, por lo que es cíclico o es isomorfo a  $D_3 \cong S_3$ . Tenemos que:

$$\begin{aligned}(f_2 \circ f_3)(1, 0) &= f_2(f_3(1, 0)) = f_2(0, 1) = (1, 1) \\ (f_3 \circ f_2)(1, 0) &= f_3(f_2(1, 0)) = f_3(1, 0) = (0, 1)\end{aligned}$$

Por tanto,  $f_2 \circ f_3 \neq f_3 \circ f_2$ , por lo que  $\text{Aut}(\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2)$  no es abeliano y por tanto no es cíclico. Por tanto,  $\text{Aut}(\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2) \cong S_3$ .

**Ejercicio 1.4.17.** Demostrar que los grupos  $S_3$ ,  $\mathbb{Z}_{p^n}$  (con  $p$  primo) y  $\mathbb{Z}$  no son producto directo internos de subgrupos propios.

1.  $S_3$ .

Como  $|S_3| = 6$ , entonces sus subgrupos propios son de orden 2 y 3. Por reducción al absurdo, supongamos que  $S_3 \cong K_1 \times \cdots \times K_n$  con  $K_i < S_3$ . Entonces,  $6 = |K_1||K_2|\cdots|K_n|$ , y como  $|K_i|$  son divisores de 6, se tiene que  $|K_i| = 2$  o  $|K_i| = 3$ . Como  $6 = 2 \cdot 3$  es la única opción, se tiene que  $n = 2$ . Por tanto,  $S_3 \cong K_1 \times K_2$  con  $K_1, K_2 < S_3$ . Sin pérdida de generalidad, supongamos que  $|K_1| = 2$  y  $|K_2| = 3$ . Entonces,  $K_1 \cong C_2$  y  $K_2 \cong C_3$ . Por tanto,  $S_3 = K_1 \times K_2 \cong C_2 \oplus C_3$ . Como  $C_2$  y  $C_3$  son cíclicos con  $\text{mcd}(|C_2|, |C_3|) = 1$ , se tiene que  $C_2 \times C_3$  es cíclico. Por tanto,  $S_3$  es cíclico, lo cual es una contradicción.

2.  $\mathbb{Z}_{p^n}$ .

Por ser  $\mathbb{Z}_{p^n}$  un grupo cíclico de orden  $p^n$ , todos sus subgrupos propios son cíclicos de orden  $p^k$  con  $k \in \{1, \dots, n-1\}$ . Por reducción al absurdo, supongamos que  $\exists p_1, \dots, p_k \in \{1, \dots, n-1\}$  tales que  $\mathbb{Z}_{p^n} \cong \mathbb{Z}_{p^{p_1}} \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}_{p^{p_k}}$ . Entonces, como  $\mathbb{Z}_{p^{p_i}}$  es cíclico, se tiene que  $\mathbb{Z}_{p^{p_1}} \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}_{p^{p_k}}$  es cíclico si y solo si  $\text{mcd}(p^{p_1}, \dots, p^{p_k}) = 1$ . Como  $p^{p_i}$  son potencias de un mismo primo, se tiene que  $\text{mcd}(p^{p_1}, \dots, p^{p_k}) \geq p$ . Por tanto,  $\mathbb{Z}_{p^{p_1}} \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}_{p^{p_k}}$  no es cíclico. Por tanto,  $\mathbb{Z}_{p^n}$  no es producto directo interno de subgrupos propios.

3.  $\mathbb{Z}$ .

Sabemos que todos los subgrupos de  $\mathbb{Z}$  son de la forma  $k\mathbb{Z}$ , con  $k \in \mathbb{N}$ . Por tanto, por reducción al absurdo, supongamos que  $\exists p_1, \dots, p_k \in \mathbb{N}$  tales que  $\mathbb{Z} \cong p_1\mathbb{Z} \oplus \cdots \oplus p_k\mathbb{Z} \stackrel{(*)}{\cong} \mathbb{Z} \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}$ . Veamos no obstante que  $\mathbb{Z} \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}$  no es cíclico.

Supongamos que  $\mathbb{Z} \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}$  es cíclico. Entonces, existe  $(x_1, \dots, x_k) \in \mathbb{Z} \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}$  tal que:

$$\mathbb{Z} \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z} = \langle (x_1, \dots, x_k) \rangle$$

Sea ahora  $(1, 0, \dots, 0) \in \mathbb{Z} \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}$ . Entonces, existe  $n \in \mathbb{N}$  tal que:

$$(1, 0, \dots, 0) = n(x_1, \dots, x_k) \implies x_2 = \cdots = x_k = 0$$

Sea ahora  $(0, 1, 0, \dots, 0) \in \mathbb{Z} \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}$ . Entonces, existe  $m \in \mathbb{N}$  tal que:

$$(0, 1, 0, \dots, 0) = m(x_1, 0, \dots, 0) \implies 1 = m \cdot 0$$

Por tanto, hemos llegado a una contradicción. Por tanto,  $\mathbb{Z} \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}$  no es cíclico. Por tanto,  $\mathbb{Z}$  no es producto directo interno de subgrupos propios.

En (\*), el isomorfismo es el siguiente (que se prueba fácilmente que es un isomorfismo):

$$f : n\mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z} \\ x \longmapsto x/n$$

**Ejercicio 1.4.18.** En cada uno de los siguientes casos, decidir si el grupo  $G$  es o no producto directo interno de los subgrupos  $H$  y  $K$ .

1.  $G = \mathbb{R}^\times$ ,  $H = \{\pm 1\}$ ,  $K = \{x \in \mathbb{R} \mid x > 0\}$ .

Es directo que  $G = HK$  y  $H \cap K = \{1\}$ . Como  $H, K < G$  y  $G$  es abeliano, se tiene que  $H, K \triangleleft G$ . Por tanto,  $G \cong H \times K$ .

2.  $G = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & c \end{pmatrix} \in \text{GL}_2(\mathbb{R}) \right\}$ ,  $H = \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & c \end{pmatrix} \in \text{GL}_2(\mathbb{R}) \right\}$ ,  $K = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in \text{GL}_2(\mathbb{R}) \right\}$ .

Fijados  $a, b, c \in \mathbb{R}$ , sean las siguientes matrices:

$$A = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & c \end{pmatrix} \in H \\ B = \begin{pmatrix} 1 & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in K$$

Entonces:

$$AB = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & ab \\ 0 & c \end{pmatrix} \\ BA = \begin{pmatrix} 1 & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & bc \\ 0 & c \end{pmatrix}$$

Como  $ab \neq bc$  en general, se tiene que  $AB \neq BA$ . Por tanto, por la caracterización del producto directo interno, se tiene que  $G$  no es producto directo interno de  $H$  y  $K$ .

3.  $G = \mathbb{C}^\times$ ,  $H = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1\}$ ,  $K = \{x \in \mathbb{R} \mid x > 0\}$ .

Dado  $z \in G$ , podemos escribir:

$$z = \frac{z}{|z|} \cdot |z| \quad \frac{z}{|z|} \in H, |z| \in K$$

Por tanto,  $G = HK$ . Además,  $H \cap K = \{1\}$ , y como  $H, K < G$  y  $G$  es abeliano, se tiene que  $H, K \triangleleft G$ . Por tanto,  $G \cong H \times K$ .

**Ejercicio 1.4.19.** Sean  $G, H$  y  $K$  grupos. Demostrar que:

1.  $H \times K \cong K \times H$ .

Definimos el isomorfismo:

$$f : H \times K \longrightarrow K \times H \\ (h, k) \longmapsto (k, h)$$

Vemos que  $f$  es un isomorfismo:

- $f$  es un homomorfismo:

$$\begin{aligned} f((h_1, k_1)(h_2, k_2)) &= f(h_1h_2, k_1k_2) = (k_1k_2, h_1h_2) \\ &= (k_1, h_1)(k_2, h_2) = f(h_1, k_1)f(h_2, k_2) \end{aligned}$$

- $f$  es inyectiva:

$$\begin{aligned} \ker(f) &= \{(h, k) \in H \times K \mid f(h, k) = (1, 1)\} \\ &= \{(h, k) \in H \times K \mid (k, h) = (1, 1)\} = \{(1, 1)\} \end{aligned}$$

- $f$  es sobreyectiva:

Dado  $(k, h) \in K \times H$ , tomamos  $(h, k) \in H \times K$ . Entonces:

$$f(h, k) = (k, h) \quad \forall (h, k) \in H \times K$$

Por tanto,  $f$  es un isomorfismo.

2.  $G \times (H \times K) \cong (G \times H) \times K$ .

Definimos el isomorfismo:

$$\begin{aligned} f : G \times (H \times K) &\longrightarrow (G \times H) \times K \\ (g, (h, k)) &\longmapsto ((g, h), k) \end{aligned}$$

Vemos que  $f$  es un isomorfismo:

- $f$  es un homomorfismo:

$$\begin{aligned} f((g_1, (h_1, k_1))(g_2, (h_2, k_2))) &= f(g_1g_2, (h_1h_2, k_1k_2)) \\ &= ((g_1g_2, h_1h_2), k_1k_2) = \\ &= ((g_1, h_1), k_1)((g_2, h_2), k_2) = \\ &= f(g_1, (h_1, k_1))f(g_2, (h_2, k_2)) \end{aligned}$$

- $f$  es inyectiva:

$$\begin{aligned} \ker(f) &= \{(g, (h, k)) \in G \times (H \times K) \mid f(g, (h, k)) = ((1, 1), 1)\} \\ &= \{(g, (h, k)) \in G \times (H \times K) \mid ((g, h), k) = ((1, 1), 1)\} = \{(1, (1, 1))\} \end{aligned}$$

- $f$  es sobreyectiva:

Dado  $((g, h), k) \in (G \times H) \times K$ , tomamos  $(g, (h, k)) \in G \times (H \times K)$ . Entonces:

$$f(g, (h, k)) = ((g, h), k) \quad \forall (g, (h, k)) \in G \times (H \times K)$$

Por tanto,  $f$  es un isomorfismo.

**Ejercicio 1.4.20.** Dados isomorfismos de grupos  $A \cong K$  y  $B \cong H$ , demostrar que  $A \times B \cong K \times H$ .

Sea  $f : A \rightarrow K$  y  $g : B \rightarrow H$  los isomorfismos. Definimos la siguiente aplicación:

$$\begin{aligned} h : A \times B &\longrightarrow K \times H \\ (a, b) &\longmapsto (f(a), g(b)) \end{aligned}$$

Veamos que  $h$  es un homomorfismo. Fijados  $(a_1, b_1), (a_2, b_2) \in A \times B$ , tenemos que:

$$\begin{aligned} h((a_1, b_1)(a_2, b_2)) &= h(a_1a_2, b_1b_2) = (f(a_1a_2), g(b_1b_2)) \\ &= (f(a_1)f(a_2), g(b_1)g(b_2)) = (f(a_1), g(b_1))(f(a_2), g(b_2)) \\ &= h(a_1, b_1)h(a_2, b_2) \quad \forall (a_1, b_1), (a_2, b_2) \in A \times B \end{aligned}$$

Por tanto,  $h$  es un homomorfismo. Veamos ahora que es inyectiva. Para ello, tenemos que:

$$\begin{aligned} \ker(h) &= \{(a, b) \in A \times B \mid h(a, b) = (1, 1)\} \\ &= \{(a, b) \in A \times B \mid (f(a), g(b)) = (1, 1)\} = \\ &= \{(a, b) \in A \times B \mid f(a) = 1 \wedge g(b) = 1\} = \\ &= \{(1, 1)\} \end{aligned}$$

Por tanto,  $h$  es inyectiva. Veamos ahora que es sobreyectiva. Dado  $(k, h) \in K \times H$ , tomamos  $(a, b) \in A \times B$  tales que  $f(a) = k$  y  $g(b) = h$  (que existe por ser  $f, g$  biyectivas). Entonces:

$$h(a, b) = (f(a), g(b)) = (k, h) \quad \forall (a, b) \in A \times B$$

Por tanto,  $h$  es sobreyectiva. Concluimos que  $h$  es un isomorfismo.

**Ejercicio 1.4.21.** Sean  $H, K, L$  y  $M$  grupos tales que  $H \times K \cong L \times M$ . ¿Se verifica necesariamente que  $H \cong L$  y  $K \cong M$ ?

Sabemos que  $C_2 \oplus C_3$  es cíclico de orden 6, luego  $C_2 \times C_3 \cong C_6$ . Además, sabemos que para todo grupo  $G$ , se tiene que  $G \cong G \times \{1\}$  usando como isomorfismo la aplicación:

$$\begin{aligned} f : G &\longrightarrow G \times \{1\} \\ x &\longmapsto (x, 1) \end{aligned}$$

Por tanto,  $C_2 \times C_3 \cong C_6 \cong C_6 \times \{1\}$ .

No obstante,  $|C_2| \neq |C_6|$  y  $|C_3| \neq |1|$ . Por tanto, tomando  $H = C_2$ ,  $K = C_3$ ,  $L = C_6$  y  $M = \{1\}$ , se tiene que  $H \times K \cong L \times M$ . Sin embargo, no se verifica que  $H \cong L$  y  $K \cong M$ .

**Ejercicio 1.4.22.** Demostrar que no todo subgrupo de un producto directo  $H \times K$  es de la forma  $H_1 \times K_1$ , con  $H_1 \leq H$  y  $K_1 \leq K$ .

Trabajamos con el grupo directo  $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ . El grupo  $\mathbb{Z}_2$  no tiene subgrupos propios, y por tanto los subgrupos suyos son  $\{0\}$  y  $\mathbb{Z}_2$ . Por tanto, los subgrupos de  $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$  que se descomponen como producto directo de subgrupos de  $\mathbb{Z}_2$  son:

- $\{0\} \times \{0\} = \{(0, 0)\}$
- $\{0\} \times \mathbb{Z}_2 = \{(0, 0), (0, 1)\}$
- $\mathbb{Z}_2 \times \{0\} = \{(0, 0), (1, 0)\}$
- $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 = \{(0, 0), (1, 0), (0, 1), (1, 1)\}$

No obstante, consideramos el subgrupo de  $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$  dado por:

$$\langle (1, 1) \rangle = \{(0, 0), (1, 1)\} \quad O((1, 1)) = \text{mcm}(2, 2) = 2$$

Este subgrupo no es de la forma  $H_1 \times K_1$ , con  $H_1 \leq H$  y  $K_1 \leq K$ . Por tanto, no todo subgrupo de un producto directo  $H \times K$  es de la forma  $H_1 \times K_1$ , con  $H_1 \leq H$  y  $K_1 \leq K$ .

**Ejercicio 1.4.23.** Sean  $H, K$  dos grupos y sean  $H_1 \triangleleft H$ ,  $K_1 \triangleleft K$ . Demostrar que  $H_1 \times K_1 \triangleleft H \times K$  y que

$$\frac{H \times K}{H_1 \times K_1} \cong \frac{H}{H_1} \times \frac{K}{K_1}.$$

Como  $H_1 < H$  y  $K_1 < K$ , se tiene que  $H_1 \times K_1 < H \times K$ . Veamos ahora que  $H_1 \times K_1 \triangleleft H \times K$ . Para cada  $(h, k) \in H \times K$  y  $(h_1, k_1) \in H_1 \times K_1$ , tenemos que:

$$(h, k)(h_1, k_1)(h, k)^{-1} = (hh_1h^{-1}, kk_1k^{-1}) \in H_1 \times K_1$$

por ser  $H_1 \triangleleft H$  y  $K_1 \triangleleft K$ . Por tanto,  $H_1 \times K_1 \triangleleft H \times K$ . Para ver el isomorfismo, consideramos la siguiente aplicación:

$$f: H \times K \longrightarrow \frac{H}{H_1} \times \frac{K}{K_1}$$

$$(h, k) \longmapsto (hH_1, kK_1)$$

Vemos que  $f$  es un homomorfismo:

$$f((h_1, k_1)(h_2, k_2)) = f(h_1h_2, k_1k_2) = (h_1h_2H_1, k_1k_2K_1)$$

$$= (h_1H_1 \cdot h_2H_1, k_1K_1 \cdot k_2K_1) = (h_1H_1, k_1K_1)(h_2H_1, k_2K_1)$$

$$= f(h_1, k_1)f(h_2, k_2) \quad \forall (h_1, k_1), (h_2, k_2) \in H \times K$$

Calculamos ahora su núcleo e imagen:

$$\ker(f) = \{(h, k) \in H \times K \mid f(h, k) = (H_1, K_1)\}$$

$$= \{(h, k) \in H \times K \mid (hH_1, kK_1) = (H_1, K_1)\} =$$

$$= \{(h, k) \in H \times K \mid hH_1 = H_1 \wedge kK_1 = K_1\} = H_1 \times K_1$$

$$\text{Im}(f) = \left\{ (hH_1, kK_1) \in \frac{H}{H_1} \times \frac{K}{K_1} \mid (h, k) \in H \times K \right\} =$$

$$= \left\{ (hH_1, kK_1) \in \frac{H}{H_1} \times \frac{K}{K_1} \mid h \in H \wedge k \in K \right\} = \frac{H}{H_1} \times \frac{K}{K_1}$$

Por tanto, por el Primer Teorema de Isomorfía, se tiene que:

$$\frac{H \times K}{H_1 \times K_1} \cong \frac{H}{H_1} \times \frac{K}{K_1}$$

**Ejercicio 1.4.24.** Sean  $H, K \triangleleft G$  tales que  $H \cap K = \{1\}$ . Demostrar que  $G$  es isomorfo a un subgrupo de  $G/H \times G/K$ .

Definimos la aplicación:

$$\begin{aligned} f: G &\longrightarrow G/H \times G/K \\ g &\longmapsto (gH, gK) \end{aligned}$$

Vemos que  $f$  es un homomorfismo:

$$\begin{aligned} f(gh) &= (ghH, ghK) = (gH, gK)(hH, hK) = \\ &= f(g)f(h) \quad \forall g, h \in G \end{aligned}$$

Calculamos su núcleo:

$$\begin{aligned} \ker(f) &= \{g \in G \mid f(g) = (H, K)\} \\ &= \{g \in G \mid (gH, gK) = (H, K)\} = \\ &= \{g \in G \mid gH = H \wedge gK = K\} = H \cap K = \{1\} \end{aligned}$$

Por tanto, tenemos que:

$$\frac{G}{\ker(f)} = \frac{G}{\{1\}} \cong G$$

Por tanto, por el Primer Teorema de Isomorfía, se tiene que:

$$G \cong \frac{G}{\ker(f)} \cong \text{Im}(f)$$

Como  $G < G/H \times G/K$  y  $f$  es un homomorfismo, se tiene que  $\text{Im}(f) < G/H \times G/K$ . Por tanto,  $G$  es isomorfo a  $\text{Im}(f)$ , que es un subgrupo de  $G/H \times G/K$ .

**Ejercicio 1.4.25.** Sean  $H, K \triangleleft G$  tales que  $HK = G$ . Demostrar que

$$\frac{G}{H \cap K} \cong \frac{H}{H \cap K} \times \frac{K}{H \cap K} \cong \frac{G}{H} \times \frac{G}{K}.$$

La demostración no es directa, y la dividiremos en dos partes. Por un lado, demostraremos la primera relación de isomofía, y posteriormente veremos la segunda.

Por el Segundo Teorema de Isomorfía aplicado dos veces, se tiene de forma directa que  $H \cap K \triangleleft H, K$ . Veamos ahora que  $H \cap K \triangleleft G$ . Para ello, tomamos  $g \in G$  y  $x \in H \cap K$ . Como  $G = HK$ , tenemos que  $g = hk$  con  $h \in H$  y  $k \in K$ . Entonces:

$$\begin{aligned} gxg^{-1} &= (hk)x(hk)^{-1} = (hk)x(k^{-1}h^{-1}) = \\ &= h(kxk^{-1})h^{-1} \stackrel{(*)}{=} h\tilde{k}h^{-1} \stackrel{(**)}{\in} H \cap K \end{aligned}$$

donde  $(*)$  se cumple porque  $H \cap K \triangleleft K$ , por lo que  $kxk^{-1} = \tilde{k} \in K$  y  $(**)$  se cumple porque  $H \cap K \triangleleft H$ , por lo que  $h\tilde{k}h^{-1} \in H$ . Por tanto,  $H \cap K \triangleleft G$ , y el primer cociente tiene sentido.

Definimos la aplicación:

$$\begin{aligned} f : G &\longrightarrow \frac{H}{H \cap K} \times \frac{K}{H \cap K} \\ g &\longmapsto (h(H \cap K), k(H \cap K)) \end{aligned}$$

Veamos que está bien definida, puesto que la descomposición no tiene por qué ser única. Sean  $k_1, k_2 \in K$  y  $h_1, h_2 \in H$  tales que  $g = k_1 h_1 = k_2 h_2$ . Entonces, en primer lugar vemos que  $h_2^{-1} h_1 = k_2 k_1^{-1} \in H \cap K$ . Por tanto:

- $h_1 = k_1^{-1} k_2 h_2$ , con  $k_1^{-1} k_2 \in K \cap K$  y  $h_2 \in H$ , por lo que  $h_1(H \cap K) = h_2(H \cap K)$ .
- $k_1 = k_2 h_1^{-1} h_2$ , con  $h_1^{-1} h_2 \in H \cap H$  y  $k_2 \in K$ , por lo que  $k_1(H \cap K) = k_2(H \cap K)$ .

Por tanto,  $f$  está bien definida. Veamos que es un homomorfismo. Dados  $g_1, g_2 \in G$ ,  $\exists h_1, h_2 \in H$  y  $k_1, k_2 \in K$  tales que  $g_1 = h_1 k_1$  y  $g_2 = h_2 k_2$ . Entonces:

$$\begin{aligned} f(g_1 g_2) &= f(h_1 k_1 h_2 k_2) = \\ &= (h_1 h_2(H \cap K), k_1 k_2(H \cap K)) = \\ &= (h_1(H \cap K), k_1(H \cap K))(h_2(H \cap K), k_2(H \cap K)) \\ &= f(g_1) f(g_2) \quad \forall g_1, g_2 \in G \end{aligned}$$

Calculamos su núcleo:

$$\begin{aligned} \ker(f) &= \{g \in G \mid f(g) = (H \cap K, H \cap K)\} \\ &= \{g = hk \in G \mid (h(H \cap K), k(H \cap K)) = (H \cap K, H \cap K)\} = \\ &= \{g = hk \in G \mid h(H \cap K) = H \cap K \wedge k(H \cap K) = H \cap K\} = \\ &= \{g = hk \in G \mid h, k \in H \cap K\} \stackrel{(*)}{=} H \cap K \end{aligned}$$

donde  $(*)$  se cumple porque la inclusión  $\ker f \subseteq H \cap K$  se cumple por ser  $H \cap K$  cerrado para el producto; mientras que la inclusión  $H \cap K \subseteq \ker f$  se cumple tomando  $g = g \cdot 1$ .

Veamos ahora que es sobreyectiva. Dado  $(h(H \cap K), k(H \cap K)) \in \frac{H}{H \cap K} \times \frac{K}{H \cap K}$ , tomamos  $g = hk \in G$ . Entonces:

$$f(g) = f(hk) = (h(H \cap K), k(H \cap K)) \quad \forall g \in G$$

Por tanto,  $f$  es sobreyectiva. Por el Primer Teorema de Isomorfía, se tiene que:

$$\frac{G}{H \cap K} \cong \frac{H}{H \cap K} \times \frac{K}{H \cap K}$$

Llegamos a este punto, tan solo nos falta probar que:

$$\frac{H}{H \cap K} \times \frac{K}{H \cap K} \cong \frac{G}{H} \times \frac{G}{K}$$

Para ello, aplicamos en primer lugar dos veces el Segundo Teorema de Isomorfía.

- $H, K < G$  y  $K \triangleleft G$ :

$$\frac{G}{K} \cong \frac{H}{H \cap K}$$

- $H, K < G$  y  $H \triangleleft G$ :

$$\frac{G}{H} \cong \frac{K}{H \cap K}$$

Por tanto, tenemos que:

$$\frac{H}{H \cap K} \times \frac{K}{H \cap K} \cong \frac{G}{K} \times \frac{G}{H}$$

Como  $G/H \times G/K \cong G/K \times G/H$ , tenemos que:

$$\frac{H}{H \cap K} \times \frac{K}{H \cap K} \cong \frac{G}{K} \times \frac{G}{H} \cong \frac{G}{H} \times \frac{G}{K}$$

Por tanto, se cumple la segunda relación de isomorfía. Concluimos que:

$$\frac{G}{H \cap K} \cong \frac{H}{H \cap K} \times \frac{K}{H \cap K} \cong \frac{G}{H} \times \frac{G}{K}$$

**Ejercicio 1.4.26.** Demostrar que si  $G$  es un grupo que es producto directo interno de subgrupos  $H$  y  $K$ , y  $N \triangleleft G$  tal que  $N \cap H = \{1\} = N \cap K$ , entonces  $N$  es abeliano.

En primer lugar, veamos que  $N$  conmuta con  $H$ ; es decir, que dado  $n \in N$  y  $h \in H$ , se tiene que  $nh = hn$ . Equivalentemente, veremos que  $nhn^{-1}h^{-1} = 1$ .

- Como  $N$  es un grupo,  $n^{-1} \in N$ . Como  $H < G$ ,  $h \in G$ . Como  $N \triangleleft G$ , tenemos que  $hn^{-1}h^{-1} \in N$ . Como  $N$  es cerrado para el producto, tenemos que:

$$n hn^{-1}h^{-1} \in N$$

- Como  $N < G$ ,  $n \in G$ . Como  $H \triangleleft G$  por la caracterización del producto directo interno, tenemos que  $nhn^{-1} \in H$ . Como  $H$  es cerrado para el producto, tenemos que:

$$nhn^{-1}h^{-1} \in H$$

Por tanto,  $nhn^{-1}h^{-1} \in N \cap H$ . Como  $N \cap H = \{1\}$ , tenemos que  $nhn^{-1}h^{-1} = 1$ . Por tanto,  $nh = hn$  para todo  $n \in N$  y  $h \in H$ . De forma análoga, como  $K \triangleleft G$ , tenemos que  $nk = kn$  para todo  $n \in N$  y  $k \in K$ . Sea ahora  $g \in G$  y  $n \in N$ . Entonces, como  $G = HK$ , tenemos que  $g = hk$  con  $h \in H$  y  $k \in K$ . Entonces:

$$gn = (hk)n = h(kn) = h(nk) = (hn)k = (nh)k = n(hk) = ng$$

Por tanto,  $gn = ng$  para todo  $g \in G$  y  $n \in N$ . Como  $N < G$ , tenemos que  $N$  es abeliano.

**Ejercicio 1.4.27.** Dar un ejemplo de un grupo  $G$  que sea producto directo interno de dos subgrupos propios  $H$  y  $K$ , y que contenga a un subgrupo normal no trivial  $N$  tal que  $N \cap H = \{1\} = N \cap K$ . Concluir que para  $N \triangleleft H \times K$  es posible que se tenga

$$N \neq (N \cap (H \times \{1\})) \times (N \cap (\{1\} \times K)).$$

Sea  $G = \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ ,  $H = \langle (1, 0) \rangle$  y  $K = \langle (0, 1) \rangle$ . Sabemos que  $G \cong V$  abeliano, luego  $H, K \triangleleft G$ . Además,  $H \cap K = \{(0, 0)\}$ . Por último, se tiene que  $G = HK$ . Por tanto,  $G$  es producto directo interno de  $H$  y  $K$ . Sea ahora:

$$N = \langle (1, 1) \rangle = \{(0, 0), (1, 1)\}$$

Sabemos que  $N < G$ , luego  $N \triangleleft G$ . Además,  $N \cap H = \{(0, 0)\} = N \cap K$ . Por tanto, se cumple la condición del ejercicio.

Sea ahora  $\varphi : G \rightarrow H \times K$  el isomorfismo correspondiente. Sea ahora el subgrupo  $\varphi(N) < H \times K$ . Como el ser normal se mantiene por homomorfismo,  $\varphi(N) \triangleleft H \times K$ . Veamos ahora que:

$$\begin{aligned}\varphi((0, 0)) &= ((0, 0), (0, 0)) \\ \varphi((1, 1)) &= ((1, 0), (0, 1)) \\ \varphi(N) &= \{((0, 0), (0, 0)), ((1, 0), (0, 1))\}\end{aligned}$$

Por tanto,  $\varphi(N)$  no puede ser producto cartesiano, puesto que  $((0, 0), (0, 1))$  debería pertenecer también. Por tanto:

$$\varphi(N) \neq (\varphi(N) \cap (H \times \{1\})) \times (\varphi(N) \cap (\{1\} \times K)).$$

Y se tiene demostrado lo pedido.

**Ejercicio 1.4.28.** Sea  $G$  un grupo finito que sea producto directo interno de dos subgrupos  $H$  y  $K$  tales que  $\text{mcd}(|H|, |K|) = 1$ . Demostrar que para todo subgrupo  $N \leq G$  se verifica que  $N = (N \cap H) \times (N \cap K)$ .

**Ejercicio 1.4.29.** Sea  $G$  un grupo y sea  $f : G \rightarrow G$  un endomorfismo idempotente (esto es, verificando que  $f^2 = f$ ) y tal que  $\text{Im}(f) \triangleleft G$ . Demostrar que

$$G \cong \text{Im}(f) \times \ker(f).$$

### Opción 1. Método Directo

Sea la siguiente aplicación:

$$\begin{aligned}\varphi : \text{Im}(f) \times \ker(f) &\longrightarrow G \\ (x, y) &\longmapsto xy\end{aligned}$$

Veamos que  $\varphi$  es un isomorfismo. Para ello, previamente veremos que para todo  $x \in \text{Im}(f)$ , se tiene que  $f(x) = x$ . Dado  $x \in \text{Im}(f)$ , existe  $y \in G$  tal que  $f(y) = x$ . Entonces:

$$f(x) = f(f(y)) = f^2(y) \stackrel{(*)}{=} f(y) = x$$

donde en  $(*)$  se cumple porque  $f$  es idempotente.

### Homomorfismo

Veamos que  $\varphi$  es homomorfismo. Para cada  $(x_1, y_1), (x_2, y_2) \in Im(f) \times \ker(f)$ , tenemos que:

$$\begin{aligned}\varphi((x_1, y_1)(x_2, y_2)) &= \varphi(x_1x_2, y_1y_2) = x_1x_2y_1y_2 \\ \varphi(x_1, y_1)\varphi(x_2, y_2) &= (x_1y_1)(x_2y_2) = x_1y_1x_2y_2\end{aligned}$$

Veamos que  $x_2y_1 = y_1x_2$ . Es decir, que dados  $x \in Im(f)$  y  $y \in \ker(f)$ , tenemos que  $xy = yx$ . Como  $Im(f) \triangleleft G$ , y  $\ker f \subset G$ , tenemos que  $xyx^{-1} \in Im(f)$ . Por lo visto anteriormente,  $f(yxx^{-1}) = yxx^{-1}$ . Aplicando que  $f$  es un homomorfismo (estamos demostrando que  $\varphi$  lo es, pero sabemos que  $f$  lo es), tenemos que:

$$yxx^{-1} = f(yxx^{-1}) = f(y)f(x)f(x^{-1}) = f(y)xf(y)^{-1} \stackrel{(*)}{=} 1x1 = x \implies yx = xy$$

donde en (\*) se cumple porque  $y \in \ker(f)$  y  $x \in Im(f)$ .

Por tanto,  $\varphi$  es un homomorfismo.

### Inyectividad

Veamos que  $\varphi$  es inyectiva. Para ello, sean  $(x_1, y_1), (x_2, y_2) \in Im(f) \times \ker(f)$  tales que  $\varphi(x_1, y_1) = \varphi(x_2, y_2)$ . Entonces:

$$x_1y_1 = x_2y_2 \implies x_2^{-1}x_1 = y_2y_1^{-1} \in \ker(f) \cap Im(f)$$

Veamos ahora que  $\ker(f) \cap Im(f) = \{1\}$ . Sea  $x \in \ker(f) \cap Im(f)$ . Como  $x \in \ker(f)$ , tenemos que  $f(x) = 1$ , y como  $x \in Im(f)$ ,  $f(x) = x$ . Entonces  $1 = f(x) = x$ , por lo que  $x = 1$ . Por tanto,  $\ker(f) \cap Im(f) = \{1\}$ , por lo que:

$$\begin{aligned}x_2^{-1}x_1 = 1 &\implies x_1 = x_2 \\ y_2y_1^{-1} = 1 &\implies y_1 = y_2\end{aligned}$$

Por tanto,  $\varphi$  es inyectiva.

### Sobreyectividad

Veamos que es sobreyectiva. Dado  $g \in G$ , tomamos  $x = f(g) \in Im(f)$  e  $y = f(g^{-1})g$ . Veamos en primer lugar que  $y \in \ker(f)$ :

$$f(y) = f(f(g^{-1})g) = f(f(g^{-1}))f(g) = f^2(g^{-1})f(g) = f(g^{-1})f(g) = f(g^{-1}g) = f(1) = 1$$

Por tanto,  $y \in \ker(f)$ . Veamos ahora que  $\varphi(x, y) = g$ . Entonces:

$$\varphi(x, y) = \varphi(f(g), f(g^{-1})g) = f(g)f(g^{-1})g = f(gg^{-1})g = f(1)g = 1g = g$$

Por tanto,  $\varphi$  es sobreyectiva.

Concluimos que  $\varphi$  es un isomorfismo. Por tanto,  $G \cong Im(f) \times \ker(f)$ .

**Opción 2.**

En primer lugar, sabemos que  $\ker f \triangleleft G$ , y por hipótesis  $Im(f) \triangleleft G$ . Veamos ahora que  $\ker(f) \cap Im(f) = \{1\}$ . Previamente veremos que para todo  $x \in Im(f)$ , se tiene que  $f(x) = x$ . Dado  $x \in Im(f)$ , existe  $y \in G$  tal que  $f(y) = x$ . Entonces:

$$f(x) = f(f(y)) = f^2(y) \stackrel{(*)}{=} f(y) = x$$

donde en (\*) se cumple porque  $f$  es idempotente. Sea ahora  $x \in \ker(f) \cap Im(f)$ . Como  $x \in \ker(f)$ , tenemos que  $f(x) = 1$ , y como  $x \in Im(f)$ ,  $f(x) = x$ . Entonces  $1 = f(x) = x$ , por lo que  $x = 1$ . Por tanto,  $\ker(f) \cap Im(f) = \{1\}$ . Veamos ahora que  $G = \ker(f)Im(f)$ :

$\supseteq$ ) Como  $\ker(f), Im(f) < G$ , y  $G$  es un grupo, tenemos que  $\ker(f)Im(f) \subset G$ .

$\subseteq$ ) Sea  $g \in G$ . Consideramos ahora  $x = f(g) \in Im(f)$  e  $y = f(g^{-1})g$ . Veamos en primer lugar que  $y \in \ker(f)$ :

$$f(y) = f(f(g^{-1})g) = f(f(g^{-1}))f(g) = f^2(g^{-1})f(g) = f(g^{-1})f(g) = f(g^{-1}g) = f(1) = 1$$

Por tanto,  $y \in \ker(f)$ . Veamos ahora que  $g = xy$ . Entonces:

$$xy = f(g)f(g^{-1})g = f(gg^{-1})g = f(1)g = 1g = g$$

Por tanto,  $g = xy \in \ker(f)Im(f)$ .

Por tanto,  $G = \ker(f)Im(f)$ . Por la condición suficiente de producto directo interno, tenemos que  $G \cong \ker(f) \times Im(f)$ .

**Ejercicio 1.4.30.** Sea  $S$  un subconjunto de un grupo  $G$ . Se llama *centralizador* de  $S$  en  $G$  al conjunto

$$C_G(S) = \{x \in G \mid xs = sx \ \forall s \in S\}$$

y se llama *normalizador* de  $S$  en  $G$  al conjunto

$$N_G(S) = \{x \in G \mid xS = Sx\}.$$

1. Demostrar que  $N_G(S) \leq G$ .

Comprobamos las tres condiciones:

- $1 \in N_G(S)$ , ya que  $1S = S1 = S$ .
- Sea  $x, y \in N_G(S)$ . Entonces  $xS = Sx$  y  $yS = Sy$ . Entonces:

$$(xy)S = x(yS) = x(Sy) = (xS)y = (Sx)y = S(xy)$$

Por tanto, es cerrado para el producto.

- Sea  $x \in N_G(S)$ ,  $xS = Sx$ . Entonces:

$$xS = Sx \implies S = x^{-1}Sx \implies Sx^{-1} = x^{-1}S \implies x^{-1} \in N_G(S)$$

Por tanto, es cerrado para inversos.

2. Demostrar que  $C_G(S) \triangleleft N_G(S)$ .

Veamos en primer lugar que  $C_G(S) \leq N_G(S)$ . Para ello, vemos en primer lugar que  $C_G(S) \subseteq N_G(S)$ . Fijado  $x \in C_G(S)$ , tenemos que  $xs = sx$  para todo  $s \in S$ , por lo que:

$$xS = \{xs \mid s \in S\} = \{sx \mid s \in S\} = Sx$$

Por tanto,  $xS = Sx$ , y tenemos que  $C_G(S) \subseteq N_G(S)$ . Como además se tiene que  $C_G(S), N_G(S) < G$ , tenemos que  $C_G(S) < N_G(S)$ .

Comprobamos ahora que  $C_G(S) \triangleleft N_G(S)$ . Para ello, tomamos  $x \in N_G(S)$  y  $y \in C_G(S)$ , y veamos que  $xyx^{-1} \in C_G(S)$ . Para ello, tomamos  $s \in S$ , y como  $x \in N_G(S)$ , tenemos que  $xS = Sx$ , por lo que  $sx = xs'$  con  $s' \in S$  y por tanto  $x^{-1}sx \in S$ . Entonces:

$$yx^{-1}sx = x^{-1}sxy \implies xyx^{-1}s = sxyx^{-1} \implies xyx^{-1} \in C_G(S)$$

3. Demostrar que si  $S \leq G$  entonces  $S \triangleleft N_G(S)$ .

Sea  $s \in S$ . Veamos que  $s \in N_G(S)$ , es decir que  $sS = Ss$ .

⊂) Sea  $x \in sS$ . Entonces,  $\exists s' \in S$  tal que  $x = ss'$ . Entonces, como  $ss'(s^{-1}) \in S$ , tenemos que:

$$x = ss' = ss'(s^{-1})s \in Ss$$

⊃) Sea  $x \in Ss$ . Entonces,  $\exists s' \in S$  tal que  $x = s's$ . Entonces, como  $(s^{-1})s's \in S$ , tenemos que:

$$x = s's = ss^{-1}s's \in sS$$

Por tanto,  $S \subset N_G(S)$ . Como además  $S, N_G(S) < G$ , tenemos que  $S < N_G(S)$ . Veamos ahora que  $S \triangleleft N_G(S)$ . Para ello, tomamos  $x \in N_G(S)$  y  $s \in S$ , y veamos que  $xsx^{-1} \in S$ . Entonces:

$$xsx^{-1} \stackrel{(*)}{=} s'xx^{-1} = s' \in S$$

donde en (\*) hemos empleado que  $x \in N_G(S)$ , por lo que  $xS = Sx$ .

**Ejercicio 1.4.31.** Sea  $G$  un grupo y  $H$  y  $K$  subgrupos suyos con  $H \subseteq K$ . Entonces demostrar que  $H$  es normal en  $K$  si y sólo si  $K < N_G(H)$ . (Así, el normalizador  $N_G(H)$  queda caracterizado como el mayor subgrupo de  $G$  en el que  $H$  es normal.)

$\implies$ ) Sea  $H \triangleleft K$ , y veamos que  $K \subset N_G(H)$ . Como  $H \triangleleft K$ , tenemos que  $kH = Hk$  para todo  $k \in K$ , luego  $K \subset N_G(H)$ . Como además  $K, N_G(H) < G$ , tenemos que  $K < N_G(H)$ .

$\impliedby$ ) Sea  $K < N_G(H)$ , luego  $K \subset N_G(H)$ . Entonces, para todo  $k \in K$ , tenemos que  $kH = Hk$ . Por tanto,  $H \triangleleft K$ .

**Ejercicio 1.4.32.** Sea  $G$  un grupo.

1. Demostrar que  $C_G(Z(G)) = G$  y que  $N_G(Z(G)) = G$ .

Veamos en primer lugar que  $C_G(Z(G)) = G$ .

- C) Sea  $x \in C_G(Z(G))$ , luego trivialmente  $x \in G$ .  
 D) Sea  $x \in G$ , luego  $xz = zx$  para todo  $z \in Z(G)$ . Por tanto,  $x \in C_G(Z(G))$ .

Veamos ahora que  $N_G(Z(G)) = G$ .

- C) Sea  $x \in N_G(Z(G))$ , luego trivialmente  $x \in G$ .  
 D) Sea  $x \in G$ , luego  $xz = zx$  para todo  $z \in Z(G)$ . Por tanto,  $xZ(G) = Z(G)x$ , luego  $x \in N_G(Z(G))$ .

Análogamente, también podríamos haber usando que  $G = C_G(Z(G))$  y sabiendo que  $C_G(Z(G)) \triangleleft N_G(Z(G))$ .

2. Si  $G$  es un grupo y  $H < G$  ¿Cuándo es  $G = N_G(H)$ ? ¿Y cuándo es  $G = C_G(H)$ ?  
 Por el ejercicio anterior, que nos caracteriza el normalizador, sabemos que:

$$G = N_G(H) \iff H \triangleleft G$$

Por otro lado, sabemos que  $C_G(H) = G$  si y sólo si  $H \subset Z(G)$ .

3. Si  $H \leq G$  con  $|H| = 2$ , demostrar que  $N_G(H) = C_G(H)$ . Deducir que  $H \triangleleft G$  si y sólo si  $H \subset Z(G)$ .

Si  $|H| = 2$ , entonces  $H = \{1, h\}$  con  $h \in G \setminus \{1\}$ , luego  $h = h^{-1}$ . Veamos que  $N_G(H) = C_G(H)$ .

- C) Sea  $x \in N_G(H)$ , luego  $xH = Hx$ . Como  $xh \in Hx$ , entonces hay dos opciones:

- $xh = 1$ , luego  $x = h^{-1}$ . Por tanto,  $xh = h^{-1}h = 1 = hh^{-1} = hx$ .
- $xh = h$ , luego  $x = 1$ . Por tanto,  $xh = 1h = h = h1 = hx$ .

En cual caso,  $xh = hx$ , luego  $x \in C_G(H)$ .

- D) Como  $C_G(H) \triangleleft N_G(H)$ , se tiene.

Demostremos ahora que  $H \triangleleft G$  si y sólo si  $H \subset Z(G)$ .

$\implies$ ) Como  $H \triangleleft G$ , por el apartado anterior tenemos que  $G = N_G(H)$ . Como acababa de ver que  $N_G(H) = C_G(H)$ , tenemos que  $G = C_G(H)$ . Por tanto, para todo  $x \in G$ , tenemos que  $xh = hx$  para todo  $h \in H$ . Por tanto,  $H \subset Z(G)$ .

$\impliedby$ ) Como  $H \subset Z(G)$ , tenemos que  $C_G(H) = G$ . Por tanto, se tiene que  $N_G(H) = C_G(H) = G$ , luego  $H \triangleleft G$ .

**Ejercicio 1.4.33.** Sea  $G$  un grupo arbitrario. Para dos elementos  $x, y \in G$  se define su *conmutador* como el elemento

$$[x, y] = xyx^{-1}y^{-1}.$$

*Observación.* (El conmutador recibe tal nombre porque  $[x, y]yx = xy$ .)

Como  $[x, y]^{-1} = [y, x]$ , el inverso de un conmutador es un conmutador. Sin embargo el producto de dos conmutadores no tiene porqué ser un conmutador. Entonces se define el *subgrupo conmutador* o (primer) *subgrupo derivado* de  $G$ , denotado  $[G, G]$ , como el subgrupo generado por todos los conmutadores de  $G$ .

1. Demostrar que,  $\forall a, x, y \in G$ , se tiene que  $a[x, y]a^{-1} = [axa^{-1}, aya^{-1}]$ .

$$[axa^{-1}, aya^{-1}] = axa^{-1}aya^{-1}ax^{-1}a^{-1}ay^{-1}a^{-1} = axyx^{-1}y^{-1}a^{-1} = a[x, y]a^{-1}$$

2. Demostrar que  $[G, G] \triangleleft G$ .

Tenemos que:

$$[G, G] = \langle [x, y] \mid x, y \in G \rangle$$

Como  $[x, y] \in G$  para todo  $x, y \in G$  y  $[G, G]$  es un grupo, tenemos que  $[G, G] < G$ . Veamos que  $[G, G] \triangleleft G$ . Para ello, tomamos  $g \in G$  y  $z \in [G, G]$ . Entonces, como  $z \in [G, G]$ , tenemos que:

$$z = [x_1, y_1] \cdots [x_n, y_n] \quad x_i, y_i \in G \quad \forall i = 1, \dots, n$$

Entonces:

$$\begin{aligned} gzg^{-1} &= g[x_1, y_1] \cdots [x_n, y_n]g^{-1} = \\ &= g[x_1, y_1]g^{-1}g[x_2, y_2]g^{-1} \cdots g[x_n, y_n]g^{-1} = \\ &= [gx_1g^{-1}, gy_1g^{-1}] \cdots [gx_ng^{-1}, gy_ng^{-1}] \in [G, G] \end{aligned}$$

3. Demostrar que el grupo cociente  $G/[G, G]$ , que se representa por  $G^{ab}$ , es un grupo abeliano (que se llama el abelianizado de  $G$ ).

Dados  $x, y \in G$ , hemos de ver que  $x[G, G]y[G, G] = y[G, G]x[G, G]$ . Usando el producto en el cociente, hemos de ver que:

$$xy[G, G] = yx[G, G]$$

Consideramos ahora  $[y^{-1}, x^{-1}] \in [G, G]$ . Entonces:

$$xy[y^{-1}, x^{-1}] = xy y^{-1} x^{-1} yx = yx$$

Por tanto,  $xy[G, G] = yx[G, G]$ , luego  $G/[G, G]$  es abeliano.

4. Demostrar que  $G$  es abeliano si y sólo si  $[G, G] = 1$ .

$\implies$ ) Si  $G$  es abeliano, entonces:

$$\begin{aligned} [G, G] &= \langle [x, y] \mid x, y \in G \rangle = \langle xyx^{-1}y^{-1} \mid x, y \in G \rangle = \\ &= \langle xx^{-1}yy^{-1} \mid x, y \in G \rangle = \langle 1 \mid x, y \in G \rangle = \{1\} \end{aligned}$$

$\impliedby$ ) Si  $[G, G] = 1$ , entonces dados  $x, y \in G$ , tenemos que  $[x, y] = 1$ , luego:

$$1 = [x, y] = xyx^{-1}y^{-1} = xy(yx)^{-1} \implies xy = yx$$

Por tanto,  $G$  es abeliano.

5. Sea  $N \triangleleft G$ . Demostrar que el grupo cociente  $G/N$  es abeliano si y sólo si  $[G, G] < N$  (así que el grupo  $[G, G]$  es el menor subgrupo normal de  $G$  tal que el cociente es abeliano).

$\implies$ ) Sea  $G/N$  abeliano, y consideramos la proyección en el cociente:

$$\begin{aligned} p: G &\longrightarrow G/N \\ g &\longmapsto gN \end{aligned}$$

Sabemos que  $p$  es un homomorfismo. Dados  $x, y \in G$ , tenemos que:

$$p([x, y]) = p(xy x^{-1} y^{-1}) = p(x)p(y)p(x)^{-1}p(y)^{-1} = 1$$

Por tanto, por ser  $p$  un homomorfismo, tenemos que  $p([G, G]) = \{1\}$ , luego  $[G, G] \subseteq \ker p = N$ . Por tanto, como además  $[G, G]$  es un grupo, se tiene que  $[G, G] < N$ .

$\impliedby$ ) Sea  $[G, G] < N$ . Sean ahora  $x, y \in G$ , y buscamos ver que  $xyN = yxN$ . Tenemos que:

$$xy[y^{-1}, x^{-1}] = xy y^{-1} x^{-1} y x = yx$$

Como  $[y^{-1}, x^{-1}] \in [G, G] < N$ , tenemos que  $xyN = yxN$ . Por tanto:

$$(xN)(yN) = xyN = yxN = (yN)(xN)$$

Por tanto,  $G/N$  es abeliano.

### Ejercicio 1.4.34.

1. Calcular el subgrupo conmutador de los grupos  $S_3$ ,  $A_4$ ,  $D_4$  y  $Q_2$ .

a)  $S_3$ :

Recordemos que el subgrupo conmutador de  $G$  es el menor subgrupo normal de  $G$  tal que el cociente es abeliano. El diagrama de Hasse de  $S_3$  conviene tenerlo presente, y se encuentra en la Figura 1.48. Comprobemos cada subgrupo de  $S_3$ , de menor a mayor orden:

- $\{1\}$  efectivamente cumple que  $\{1\} \triangleleft S_3$ , pero:

$$S_3/\{1\} \cong S_3$$

Por tanto, el cociente no es abeliano, luego  $\{1\} \neq [S_3, S_3]$ .

- $\langle(1\ 2)\rangle$ .

$$(2\ 3)(1\ 2)(2\ 3)^{-1} = (2\ 3)(1\ 2)(2\ 3) = (1\ 3) \notin \langle(1, 2)\rangle$$

Por tanto,  $\langle(1\ 2)\rangle \not\triangleleft S_3$ , luego  $\langle(1\ 2)\rangle \neq [S_3, S_3]$ .

- $\langle(13)\rangle$ .

$$(2\ 3)(1\ 3)(2\ 3)^{-1} = (2\ 3)(1\ 3)(2\ 3) = (1\ 2) \notin \langle(1, 3)\rangle$$

Por tanto,  $\langle(1\ 3)\rangle \not\triangleleft S_3$ , luego  $\langle(1\ 3)\rangle \neq [S_3, S_3]$ .

- $\langle(2\ 3)\rangle$ .

$$(1\ 2)(2\ 3)(1\ 2)^{-1} = (1\ 2)(2\ 3)(1\ 2) = (1\ 3) \notin \langle(2, 3)\rangle$$

Por tanto,  $\langle(2\ 3)\rangle \not\triangleleft S_3$ , luego  $\langle(2\ 3)\rangle \neq [S_3, S_3]$ .

- $\langle(1\ 2\ 3)\rangle$ .

Sabemos que  $|\langle(1\ 2\ 3)\rangle| = 3$ , por lo que  $[S_3, \langle(1\ 2\ 3)\rangle] = 2$ , luego  $\langle(1\ 2\ 3)\rangle \triangleleft S_3$ . Por tanto, es un candidato a ser el subgrupo conmutador. Veamos si  $S_3/\langle(1\ 2\ 3)\rangle$  es abeliano:

$$\left| \frac{S_3}{\langle(1\ 2\ 3)\rangle} \right| = \frac{|S_3|}{|\langle(1\ 2\ 3)\rangle|} = \frac{6}{3} = 2 \implies \frac{S_3}{\langle(1\ 2\ 3)\rangle} \cong C_2$$

Por tanto,  $S_3/\langle(1\ 2\ 3)\rangle$  es abeliano, luego:

$$[S_3, S_3] = \langle(1\ 2\ 3)\rangle = A_3$$

b)  $A_4$ :

El diagrama de Hasse de  $A_4$  conviene tenerlo presente, y se encuentra en la Figura 1.51. Comprobemos cada subgrupo de  $A_4$ , de menor a mayor orden:

- $\{1\}$  efectivamente cumple que  $\{1\} \triangleleft A_4$ , pero:

$$A_4/\{1\} \cong A_4$$

Por tanto, el cociente no es abeliano, luego  $\{1\} \neq [A_4, A_4]$ .

- $\langle(1\ 2)(3\ 4)\rangle$ .

$$[(1\ 2\ 3)(1\ 2)(3\ 4)(1\ 2\ 3)^{-1}](1) = [(1\ 2\ 3)(1\ 2)(3\ 4)(3\ 2\ 1)](1) = 4$$

Por tanto,  $(1\ 2\ 3)(1\ 2)(3\ 4)(1\ 2\ 3)^{-1} \notin \langle(1\ 2)(3\ 4)\rangle$ , luego  $\langle(1\ 2)(3\ 4)\rangle \not\triangleleft A_4$ , luego  $\langle(1\ 2)(3\ 4)\rangle \neq [A_4, A_4]$ .

- $\langle(1\ 3)(2\ 4)\rangle$ .

$$[(1\ 2\ 3)(1\ 3)(2\ 4)(1\ 2\ 3)^{-1}](3) = [(1\ 2\ 3)(1\ 3)(2\ 4)(3\ 2\ 1)](3) = 4$$

Por tanto,  $(1\ 2\ 3)(1\ 3)(2\ 4)(1\ 2\ 3)^{-1} \notin \langle(1\ 3)(2\ 4)\rangle$ , luego  $\langle(1\ 3)(2\ 4)\rangle \not\triangleleft A_4$ , luego  $\langle(1\ 3)(2\ 4)\rangle \neq [A_4, A_4]$ .

- $\langle(1\ 4)(2\ 3)\rangle$ .

$$[(1\ 2\ 3)(1\ 4)(2\ 3)(1\ 2\ 3)^{-1}](2) = [(1\ 2\ 3)(1\ 4)(2\ 3)(3\ 2\ 1)](2) = 4$$

Por tanto,  $(1\ 2\ 3)(1\ 4)(2\ 3)(1\ 2\ 3)^{-1} \notin \langle(1\ 4)(2\ 3)\rangle$ , luego  $\langle(1\ 4)(2\ 3)\rangle \not\triangleleft A_4$ , luego  $\langle(1\ 4)(2\ 3)\rangle \neq [A_4, A_4]$ .

- $\langle(1\ 2\ 3)\rangle$ .

$$[(1\ 2)(3\ 4)(1\ 2\ 3)(1\ 2)^{-1}(3\ 4)^{-1}](1) = [(1\ 2)(3\ 4)(1\ 2\ 3)(1\ 2)(3\ 4)](1) = 4$$

Por tanto,  $(1\ 2)(3\ 4)(1\ 2\ 3)(1\ 2)(3\ 4) \notin \langle(1\ 2\ 3)\rangle$ , luego  $\langle(1\ 2\ 3)\rangle \not\triangleleft A_4$ , luego  $\langle(1\ 2\ 3)\rangle \neq [A_4, A_4]$ .

- $\langle (2\ 3\ 4) \rangle$ .

$$[(1\ 2)(3\ 4)(2\ 3\ 4)(1\ 2)^{-1}(3\ 4)^{-1}](1) = [(1\ 2)(3\ 4)(2\ 3\ 4)(1\ 2)(3\ 4)](1) = 4$$

Por tanto,  $(1\ 2)(3\ 4)(2\ 3\ 4)(1\ 2)(3\ 4) \notin \langle (2\ 3\ 4) \rangle$ , luego  $\langle (2\ 3\ 4) \rangle \not\triangleleft A_4$ , luego  $\langle (2\ 3\ 4) \rangle \neq [A_4, A_4]$ .

- $\langle (1\ 3\ 4) \rangle$ .

$$[(1\ 2)(3\ 4)(1\ 3\ 4)(1\ 2)^{-1}(3\ 4)^{-1}](2) = [(1\ 2)(3\ 4)(1\ 3\ 4)(1\ 2)(3\ 4)](2) = 4$$

Por tanto,  $(1\ 2)(3\ 4)(1\ 3\ 4)(1\ 2)(3\ 4) \notin \langle (1\ 3\ 4) \rangle$ , luego  $\langle (1\ 3\ 4) \rangle \not\triangleleft A_4$ , luego  $\langle (1\ 3\ 4) \rangle \neq [A_4, A_4]$ .

- $\langle (1\ 2\ 4) \rangle$ .

$$[(1\ 3)(2\ 4)(1\ 2\ 4)(1\ 3)^{-1}(2\ 4)^{-1}](3) = [(1\ 3)(2\ 4)(1\ 2\ 4)(1\ 3)(2\ 4)](3) = 4$$

Por tanto,  $(1\ 3)(2\ 4)(1\ 2\ 4)(1\ 3)(2\ 4) \notin \langle (1\ 2\ 4) \rangle$ , luego  $\langle (1\ 2\ 4) \rangle \not\triangleleft A_4$ , luego  $\langle (1\ 2\ 4) \rangle \neq [A_4, A_4]$ .

- $V$ .

En Teoría vimos que el subgrupo de Klein  $V$  es normal en  $A_4$ . Veamos que  $A_4/V$  es abeliano:

$$\left| \frac{A_4}{V} \right| = \frac{|A_4|}{|V|} = \frac{12}{4} = 3 \implies \frac{A_4}{V} \cong C_3$$

Por tanto,  $A_4/V$  es abeliano, luego:

$$[A_4, A_4] = V$$

c)  $D_4$ :

El diagrama de Hasse de  $D_4$  conviene tenerlo presente, y se encuentra en la Figura 1.49. Comprobemos cada subgrupo de  $D_4$ , de menor a mayor orden:

- $\{1\}$  efectivamente cumple que  $\{1\} \triangleleft D_4$ , pero:

$$D_4/\{1\} \cong D_4$$

Por tanto, el cociente no es abeliano, luego  $\{1\} \neq [D_4, D_4]$ .

- $\langle r^2 \rangle$ .

En el Ejercicio 1.4.5 vimos que:

$$Z(D_4) = \langle r^2 \rangle$$

Como además  $Z(D_4) \triangleleft D_4$ , tenemos que  $\langle r^2 \rangle \triangleleft D_4$ . Veamos que  $D_4/\langle r^2 \rangle$  es abeliano:

$$\left| \frac{D_4}{\langle r^2 \rangle} \right| = \frac{|D_4|}{|\langle r^2 \rangle|} = \frac{8}{2} = 4$$

Por tanto, es isomorfo a  $C_4$  o a  $V$ , ambos abelianos. Por tanto,  $D_4/\langle r^2 \rangle$  es abeliano, luego:

$$[D_4, D_4] = \langle r^2 \rangle$$

d)  $Q_2$ :

El diagrama de Hasse de  $Q_2$  conviene tenerlo presente, y se encuentra en la Figura 1.50. Comprobemos cada subgrupo de  $Q_2$ , de menor a mayor orden:

- $\{1\}$  efectivamente cumple que  $\{1\} \triangleleft Q_2$ , pero:

$$Q_2/\{1\} \cong Q_2$$

Por tanto, el cociente no es abeliano, luego  $\{1\} \neq [Q_2, Q_2]$ .

- $\langle -1 \rangle = \{1, -1\}$ .  
Sea  $g \in Q_2$ . Entonces:

$$g(-1)g^{-1} = -(gg^{-1}) = -1 \in \langle -1 \rangle$$

Por tanto,  $\langle -1 \rangle \triangleleft Q_2$ . Veamos que  $Q_2/\langle -1 \rangle$  es abeliano:

$$\left| \frac{Q_2}{\langle -1 \rangle} \right| = \frac{|Q_2|}{|\langle -1 \rangle|} = \frac{8}{2} = 4$$

Por tanto, es isomorfo a  $C_4$  o a  $V$ , ambos abelianos. Por tanto,  $Q_2/\langle -1 \rangle$  es abeliano, luego:

$$[Q_2, Q_2] = \langle -1 \rangle$$

2. Demostrar que, para  $n \geq 3$ , el subgrupo conmutador de  $S_n$  es  $A_n$  y que éste es el único subgrupo de  $S_n$  de orden  $n!/2$ .

Veamos que  $[S_n, S_n] = A_n$ .

⊃) Tenemos que  $[S_n : A_n] = 2$ , luego  $A_n \triangleleft S_n$ . Por tanto,  $[S_n, S_n] \subseteq A_n$ .

⊃) Sean  $i, j, k \in \{1, \dots, n\}$  tres naturales distintos. Entonces:

$$(i j k) = (i j)(j k) = (i j)(i k)(i j)(i k) = (i j)(i k)(i j)^{-1}(i k)^{-1} = [(i j), (i k)]$$

Por tanto, como los 3-ciclos son generadores de  $A_n$ , entonces se tiene que  $A_n \subseteq [S_n, S_n]$ .

Por tanto,  $[S_n, S_n] = A_n$ . Supongamos ahora que  $H$  es un subgrupo de  $S_n$  tal que  $|H| = n!/2$ . Entonces:

$$[S_n : H] = \frac{|S_n|}{|H|} = \frac{n!}{n!/2} = 2 \implies H \triangleleft S_n$$

Además, el cociente  $S_n/H$  es un grupo de orden 2, luego es cíclico, y por tanto abeliano. Por tanto,  $A_n = [S_n, S_n] < H$  Y  $|H| = |[S_n, S_n]| = |A_n|$ , luego  $H = A_n$ . Por tanto,  $A_n$  es el único subgrupo de  $S_n$  de orden  $n!/2$ .

## 1.5. Grupos resolubles

**Ejercicio 1.5.1.** Sea  $N \triangleleft G$  un subgrupo normal y simple de un grupo  $G$ . Demostrar que si  $G/N$  tiene una serie de composición entonces  $G$  tiene una serie de composición.

Consideramos la serie de composición de  $G/N$ :

$$G/N = N_0 \triangleright N_1 \triangleright \cdots \triangleright N_{r-1} \triangleright N_r = \{1N\}.$$

Por el Tercer Teorema de Isomorfía, como  $N_i < G/N$  para todo  $i \in \{0, 1, \dots, r\}$  existe  $G_i < G$  tal que  $N \triangleleft G_i$  cumpliendo que:

$$N_i = G_i/N \quad \forall i \in \{0, 1, \dots, r\}.$$

Para considerar la serie buscada, hemos de probar que  $G_i < G_{i-1}$  para todo  $i \in \{1, \dots, r\}$ . Como  $N_i \subset N_{i-1}$  por la biyección del Tercer Teorema de Isomorfía se tiene que  $G_i \subset G_{i-1}$ ; y como  $G_i$  es un grupo, se tiene que  $G_i < G_{i-1}$ . Consideramos por tanto la siguiente serie (donde notemos que hemos añadido el  $\{1\}$ ):

$$G = G_0 > G_1 > \cdots > G_{r-1} > G_r = N > \{1\}$$

Nos falta ahora por ver que  $G_i \triangleleft G_{i-1}$  para todo  $i \in \{1, \dots, r\}$ . Por el Tercer Teorema de Isomorfía, como  $G_i/N \triangleleft G/N$ , se tiene que  $G_i \triangleleft G$ . Como además  $G_i < G_{i-1}$ , se tiene que  $G_i \triangleleft G_{i-1}$ . Por último, sabemos que  $\{1\} \triangleleft N$ . Por tanto, consideramos la siguiente serie normal:

$$G = G_0 \triangleright G_1 \triangleright \cdots \triangleright G_{r-1} \triangleright G_r = N \triangleright \{1\}.$$

Veamos que dicha serie es de composición. Para ello, hemos de ver que los factores son simples. Por ser la serie de partida de composición, sabemos que el siguiente grupo cociente es simple:

$$\frac{G_{i-1}/N}{G_i/N} \quad \forall i \in \{1, \dots, r\}$$

Por el Tercer Teorema de Isomorfía, se tiene que:

$$\frac{G_{i-1}}{G_i} \cong \frac{G_{i-1}/N}{G_i/N} \quad \forall i \in \{1, \dots, r\}$$

Como el “ser simple” es una propiedad que se conserva bajo isomorfismos, se tiene que:

$$G_{i-1}/G_i \text{ es simple } \forall i \in \{1, \dots, r\}.$$

Falta por comprobar que  $N/\{1\}$  es simple, algo que se tiene de forma directa puesto que  $N/\{1\} \cong N$  y  $N$  es simple. Por tanto, la serie

$$G = G_0 \triangleright G_1 \triangleright \cdots \triangleright G_{r-1} \triangleright G_r = N \triangleright \{1\}$$

tiene todos sus factores simples, y por tanto es de composición. Notemos además que  $l(G) = l(G/N) + 1$ .

**Ejercicio 1.5.2.** Sea  $G$  un grupo abeliano. Demostrar que  $G$  tiene series de composición si y sólo si  $G$  es finito.

$\Leftarrow$ ) Si  $G$  es finito, entonces hemos visto que  $G$  tiene series de composición.

$\Rightarrow$ ) Si  $G$  tiene una serie de composición, veamos ahora que  $G$  es finito. Consideramos la serie de composición:

$$G = G_0 \triangleright G_1 \triangleright \cdots \triangleright G_{r-1} \triangleright G_r = \{1\}.$$

Como  $G$  es abeliano, todos sus subgrupos son abelianos, y por tanto todos sus factores son abelianos. Además, por ser serie de composición, todos los factores son simples. Por la caracterización de los grupos abelianos y simples, todos los factores son de orden primo (en particular, finitos).

A continuación, desarrollamos la siguiente idea. Dado un grupo  $A$  y un subgrupo suyo  $B \triangleleft A$ , si  $B$  es finito y  $A/B$  es finito, entonces  $A$  es finito. Notemos que a priori no podemos aplicar el Teorema de Lagrange, puesto que  $A$  no es necesariamente finito. Sin embargo como las clases de equivalencia del cociente  $A/B$  forman una partición de  $A$ , se tiene que:

$$A = \bigcup_{i=1}^{|A/B|} a_i B$$

Como  $B$  es finito, entonces  $|a_i B| = |B|$  para todo  $i \in \{1, \dots, |A/B|\}$ ; luego  $|A| = |B| \cdot |A/B|$ , y en particular  $A$  es finito.

Aplicando esta idea a la serie de composición de  $G$ , obtenemos en primer que  $G_{r-1}$  es finito, puesto que  $G_{r-1}/\{1\}$  y  $\{1\}$  son finitos. Análogamente,  $G_{r-2}$  es finito, puesto que  $G_{r-2}/G_{r-1}$  y  $G_{r-1}$  son finitos. Por inducción sobre  $r$ , se tiene que  $G_0 = G$  es finito.

**Ejercicio 1.5.3.** Sea  $H$  un subgrupo normal de un grupo finito  $G$ . Demostrar que existe una serie de composición de  $G$  uno de cuyos términos es  $H$ .

Como  $G$  es finito, entonces  $G$  tiene una serie de composición. Consideramos ahora la siguiente serie normal:

$$G \triangleright H \triangleright \{1\}.$$

Como  $G$  admite una serie de composición, por el Teorema de Jordan-Holder dicha serie normal puede refinarse a una serie de composición.

**Ejercicio 1.5.4.** Se define la longitud de un grupo finito  $G$ , denotada  $l(G)$ , como la longitud de cualquiera de sus series de composición. Demostrar que si  $H$  es un subgrupo normal de  $G$  entonces:

$$l(G) = l(H) + l(G/H) \quad \text{fact}(G) = \text{fact}(H) \cup \text{fact}(G/H).$$

*Observación.* Notemos que los factores de composición de  $G$  no tienen por qué ser únicos, por lo que a priori no podemos hablar de  $\text{fact}(G)$  como un conjunto. No obstante, son únicos salvo isomorfismos (y reordenamientos, pero al trabajar con conjuntos no es necesario tener en cuenta el orden). Por tanto, dos conjuntos  $\text{fact}(G)$  pueden ser distintos, pero sus elementos son isomorfos entre sí.

Por el Ejercicio 1.5.3,  $G$  tiene una serie de composición que contiene a  $H$ . Consideramos la serie de composición:

$$G = G_0 \triangleright G_1 \triangleright \cdots \triangleright G_{r-1} \triangleright G_r = H \triangleright G_{r+1} \triangleright \cdots \triangleright G_{r+m-1} \triangleright G_{r+m} = \{1\}.$$

Vemos claramente que  $l(G) = r + m$  y  $l(H) = r + m - r = m$ . Además:

$$\text{fact}(H) = \bigcup_{i=r+1}^{r+m-1} G_i/G_{i+1} \quad \text{fact}(G) = \bigcup_{i=0}^{r+m-1} G_i/G_{i+1}.$$

Hemos de calcular ahora una serie de composición de  $G/H$ . Como  $H \triangleleft G$  se tiene que  $H \triangleleft G_i$  para todo  $i \in \{0, 1, \dots, r\}$ . Por el Tercer Teorema de Isomorfía, como  $G_{i-1} \triangleright G_i$ , se tiene que  $G_{i-1}/H \triangleright G_i/H$  para todo  $i \in \{1, \dots, r\}$ . Por tanto, la serie

$$G/H = G_0/H \triangleright G_1/H \triangleright \cdots \triangleright G_{r-1}/H \triangleright G_r/H = H/H = \{1H\}$$

es una serie normal de  $G/H$ . Además, por el Tercer Teorema de Isomorfía, se tiene que:

$$\frac{G_{i-1}/H}{G_i/H} \cong G_{i-1}/G_i \quad \forall i \in \{1, \dots, r\}.$$

Como  $G_{i-1}/G_i$  es simple por ser un factor de composición, y los factores se conservan bajo isomorfismos, se tiene que los factores de la serie de composición de  $G/H$  son simples. Por tanto, la serie de  $G/H$  es de composición, luego se cumple que  $l(G/H) = r$  y se tiene que:

$$l(H) + l(G/H) = m + r = l(G).$$

Por otro lado, los factores de la serie de composición de  $G/H$  son isomorfos por el Tercer Teorema de Isomorfía a:

$$\text{fact}(G/H) = \bigcup_{i=0}^r G_i/G_{i+1}$$

Por tanto, se tiene que:

$$\text{fact}(G/H) \cup \text{fact}(H) = \bigcup_{i=0}^{r+m-1} G_i/G_{i+1} = \text{fact}(G).$$

**Ejercicio 1.5.5.** Encontrar todas las series de composición, calcular la longitud y la lista de factores de composición de los siguientes grupos:

1. El grupo diédrico  $D_4$ .

Conviene tener presente el Diagrama de Hasse de  $D_4$ , presente en la Figura 1.49. Simplemente lo usaremos para buscar todas las series normales de  $D_4$

que no admitan refinamientos, consiguiendo así todas las series de composición. Para ello, iremos desde  $D_4$  hasta  $\{1\}$  por el grafo del retículo sin saltarnos vértices (evitando así los refinamientos) y yendo solo por los subgrupos normales en el anterior.

En este caso, como todos los índices de un grupo en su subgrupo adyacente son 2, todas las relaciones de inclusión dadas en el grafo son en realidad de normalidad. De hecho, todas las series de composición son las siguientes:

$$\begin{aligned} D_4 &\triangleright \langle r^2, s \rangle \triangleright \langle s \rangle \triangleright \{1\} \\ D_4 &\triangleright \langle r^2, s \rangle \triangleright \langle sr^2 \rangle \triangleright \{1\} \\ D_4 &\triangleright \langle r^2, s \rangle \triangleright \langle r^2 \rangle \triangleright \{1\} \\ D_4 &\triangleright \langle r^2, sr \rangle \triangleright \langle r^2 \rangle \triangleright \{1\} \\ D_4 &\triangleright \langle r^2, sr \rangle \triangleright \langle sr \rangle \triangleright \{1\} \\ D_4 &\triangleright \langle r^2, sr \rangle \triangleright \langle sr^3 \rangle \triangleright \{1\} \\ D_4 &\triangleright \langle r \rangle \triangleright \langle r^2 \rangle \triangleright \{1\} \end{aligned}$$

Como vemos:

$$\begin{aligned} l(D_4) &= 3 \\ \text{fact}(D_4) &= \{\mathbb{Z}_2, \mathbb{Z}_2, \mathbb{Z}_2\} \end{aligned}$$

## 2. El grupo alternado $A_4$ .

El Diagrama de Hasse de  $A_4$  está presente en la Figura 1.51. Además, se vió que el único subgrupo normal propio de  $A_4$  es  $V$ . Por tanto, las series de composición son las siguientes:

$$\begin{aligned} A_4 &\triangleright V \triangleright \langle (1\ 2)(3\ 4) \rangle \triangleright \{1\} \\ A_4 &\triangleright V \triangleright \langle (1\ 3)(2\ 4) \rangle \triangleright \{1\} \\ A_4 &\triangleright V \triangleright \langle (1\ 4)(2\ 3) \rangle \triangleright \{1\} \end{aligned}$$

Como vemos:

$$\begin{aligned} l(A_4) &= 3 \\ \text{fact}(A_4) &= \{\mathbb{Z}_3, \mathbb{Z}_2, \mathbb{Z}_2\} \end{aligned}$$

## 3. El grupo simétrico $S_4$ .

En primer lugar, sabemos que las siguientes son series de composición de  $S_4$ :

$$\begin{aligned} S_4 &\triangleright A_4 \triangleright V \triangleright \langle (1\ 2)(3\ 4) \rangle \triangleright \{1\} \\ S_4 &\triangleright A_4 \triangleright V \triangleright \langle (1\ 3)(2\ 4) \rangle \triangleright \{1\} \\ S_4 &\triangleright A_4 \triangleright V \triangleright \langle (1\ 4)(2\ 3) \rangle \triangleright \{1\} \end{aligned}$$

No obstante, podría suceder que tuviese más grupos normales. Supongamos que existe  $N \triangleleft S_4$  tal que  $N \neq A_4$  y  $N \neq \{1\}$ .

- Si este contiene a un  $n$ -ciclo  $\gamma \in N$ , veamos que contiene a todos los  $n$ -ciclos. Dado otro  $n$ -ciclo  $\sigma \in S_4$ , sean:

$$\begin{aligned}\gamma &= (x_1 \dots x_n) \in N \\ \sigma &= (y_1 \dots y_n) \in S_4\end{aligned}$$

Definimos ahora  $\tau \in S_4$  como:

$$\begin{aligned}\tau(x_k) &= y_k & \forall k \in \{1, \dots, n\} \\ \tau(k) &= k & \forall k \in \{1, \dots, 4\} \setminus \{x_1, \dots, x_n\}\end{aligned}$$

De esta forma, tenemos que  $\sigma = \tau\gamma\tau^{-1}$ . Como  $N$  es normal, se tiene que  $\sigma = \tau\gamma\tau^{-1} \in N$ . Por tanto,  $N$  contiene todos los  $n$ -ciclos.

- Si  $N$  contiene un producto de dos transposiciones disjuntas  $\gamma \in N$ , veamos que contiene a todos los productos de dos transposiciones disjuntas. Sea  $\gamma = \gamma_1\gamma_2 \in N$  un producto de dos transposiciones disjuntas, y sea  $\sigma = \sigma_1\sigma_2 \in S_4$  un producto de dos transposiciones disjuntas.

$$\begin{aligned}\gamma &= \gamma_1\gamma_2 = (x_1 \ x_2)(x_3 \ x_4) \in N \\ \sigma &= \sigma_1\sigma_2 = (y_1 \ y_2)(y_3 \ y_4) \in S_4\end{aligned}$$

Definimos  $\tau \in S_4$  como:

$$\begin{aligned}\tau(x_n) &= y_n & \forall n \in \{1, \dots, 4\} \\ \tau(k) &= k & \forall k \in \{1, \dots, 4\} \setminus \{x_1, x_2, y_1, y_2\}\end{aligned}$$

De esta forma, tenemos que:

$$\tau\gamma\tau^{-1} = \tau\gamma_1\tau^{-1}\tau\gamma_2\tau^{-1} = (\tau(x_1) \ \tau(x_2))(\tau(x_3) \ \tau(x_4)) = (y_1 \ y_2)(y_3 \ y_4) = \sigma \in N.$$

Por tanto,  $N$  contiene todos los productos de dos transposiciones disjuntas.

Este es el concepto de clase de conjugación, concepto que no se ha tratado pero no es difícil de entender. En  $S_4$  hay:

- 1 1-ciclo (la identidad).
- 6 2-ciclos.
- 8 3-ciclos.
- 6 4-ciclos.
- 3 productos de dos transposiciones disjuntas.

Efectivamente, se tiene que  $|A_4| = 12 = 1+8+3$ . Sea entonces  $N$  un subgrupo normal propio de  $S_4$ .

- Supongamos que  $N$  contiene un 2-ciclo. Entonces,  $|N| \geq 1+6 = 7$ . Como  $|N|$  es divisor de  $|S_4| = 24$ , se tiene que  $|N| = 12$ , luego faltarían 5 elementos. No obstante, esto no es posible (puesto que no hay ninguna clase de conjugación con 5 elementos). Por tanto, ningún 2-ciclo pertenece a  $N$ .




Figura 1.57: Diagrama de Hasse para los subgrupos del grupo  $D_5$ .

- De forma análoga, se ve que no hay 4-ciclos en  $N$ .

Como no hay 2-ciclos ni 4-ciclos, se tiene que  $N \subset A_4$ . Como  $N$  es un grupo, se tiene que  $N < A_4$ . Si  $N$  no es normal en  $A_4$ , entonces tampoco lo es en  $S_4$ , por lo que  $N$  es normal en  $A_4$  y entonces será necesario pasar por  $A_4$  en la serie de composición. Por tanto, las únicas series de composición de  $S_4$  son las anteriormente vistas:

$$\begin{aligned} S_4 \triangleright A_4 \triangleright V \triangleright \langle (1\ 2)(3\ 4) \rangle \triangleright \{1\} \\ S_4 \triangleright A_4 \triangleright V \triangleright \langle (1\ 3)(2\ 4) \rangle \triangleright \{1\} \\ S_4 \triangleright A_4 \triangleright V \triangleright \langle (1\ 4)(2\ 3) \rangle \triangleright \{1\} \end{aligned}$$

Como vemos:

$$\begin{aligned} l(S_4) &= 4 \\ \text{fact}(S_4) &= \{\mathbb{Z}_3, \mathbb{Z}_2, \mathbb{Z}_2, \mathbb{Z}_2\} \end{aligned}$$

#### 4. El grupo diédrico $D_5$ .

Calculamos el orden de cada elemento de  $D_5$ :

$$\begin{aligned} O(r) &= O(r^2) = O(r^3) = O(r^4) = 5 \\ O(s) &= O(sr) = O(sr^2) = O(sr^3) = O(sr^4) = 2 \end{aligned}$$

Todo subgrupo de  $D_5$  será de orden primo, luego será cíclico. El diagrama de Hasse de  $D_5$  está presente en la Figura 1.57.

Veamos que los de orden 2 no son normales.

- $r s r^4 = sr^3 \notin \langle s \rangle$ .
- $r sr r^4 = sr^4 \notin \langle sr \rangle$ .
- $r sr^2 r^4 = sr^{10} = s \notin \langle sr^2 \rangle$ .
- $r sr^3 r^4 = sr^{11} = sr \notin \langle sr^3 \rangle$ .
- $r sr^4 r^4 = sr^{12} = sr^2 \notin \langle sr^4 \rangle$ .

Por tanto, el único subgrupo normal de  $D_5$  es  $\langle r \rangle$ . Por tanto, la única serie de composición es la siguiente:

$$D_5 \triangleright \langle r \rangle \triangleright \{1\}$$

Como vemos:

$$l(D_5) = 2$$

$$\text{fact}(D_5) = \{\mathbb{Z}_2, \mathbb{Z}_5\}$$

5. El grupo de cuaterniones  $Q_2$ .

El Diagrama de Hasse de  $Q_2$  está presente en la Figura 1.50. Como todos los índices son 2, todas las relaciones de inclusión son de normalidad. Por tanto, las series de composición son las siguientes:

$$Q_2 \triangleright \langle i \rangle \triangleright \{-1\} \triangleright \{1\}$$

$$Q_2 \triangleright \langle j \rangle \triangleright \{-1\} \triangleright \{1\}$$

$$Q_2 \triangleright \langle k \rangle \triangleright \{-1\} \triangleright \{1\}$$

Como vemos:

$$l(Q_2) = 3$$

$$\text{fact}(Q_2) = \{\mathbb{Z}_2, \mathbb{Z}_2, \mathbb{Z}_2\}$$

6. El grupo cíclico  $C_{24}$ .

Sabemos que los subgrupos de  $C_{24}$  son cíclicos, y por tanto abelianos. Por tanto, todos los subgrupos son normales. El Diagrama de Hasse de  $C_{24}$  está presente en la Figura 1.58.

Las series de composición son, por tanto, las siguientes:

$$C_{24} \triangleright \langle C_{12} \rangle \triangleright \langle C_6 \rangle \triangleright \langle C_3 \rangle \triangleright \{1\}$$

$$C_{24} \triangleright \langle C_{12} \rangle \triangleright \langle C_6 \rangle \triangleright \langle C_2 \rangle \triangleright \{1\}$$

$$C_{24} \triangleright \langle C_{12} \rangle \triangleright \langle C_4 \rangle \triangleright \langle C_2 \rangle \triangleright \{1\}$$

$$C_{24} \triangleright \langle C_8 \rangle \triangleright \langle C_4 \rangle \triangleright \langle C_2 \rangle \triangleright \{1\}$$

Como vemos:

$$l(C_{24}) = 4$$

$$\text{fact}(C_{24}) = \{\mathbb{Z}_2, \mathbb{Z}_2, \mathbb{Z}_2, \mathbb{Z}_3\}$$

7. El grupo simétrico  $S_5$ .

Como  $A_5$  es normal en  $S_5$ , se tiene que la siguiente es una serie normal:

$$S_5 \triangleright A_5 \triangleright \{1\}$$




Figura 1.58: Diagrama de Hasse para los subgrupos del grupo  $C_{24}$ .

Además,  $S_5/A_5$  es simple por ser de orden primo, mientras que  $A_5/\{1\} \cong A_5$  es simple por el Lema de Abel. Por tanto, la serie es de composición.

No obstante, podría suceder que tuviese más grupos normales. Supongamos que existe  $N \triangleleft S_5$  tal que  $N \neq A_5$  y  $N \neq \{1\}$ . Por una demostración análoga a la de  $S_4$ , las clases de conjugación de  $S_5$  son las siguientes:

- 1 1–ciclo (la identidad).
- 10 2–ciclos.
- 20 3–ciclos.
- 30 4–ciclos.
- 24 5–ciclos.
- 15 productos de dos transposiciones disjuntas.
- 20 productos de un 2–ciclo y un 3–ciclo.

Efectivamente, se tiene que  $|A_5| = 60 = 1 + 20 + 24 + 15$ . Sea entonces  $N$  un subgrupo normal propio de  $S_4$ .

- Supongamos que  $N$  contiene un 2–ciclo. Entonces,  $|N| \geq 1 + 10 = 11$ , que no divide a 120. Como la siguiente clase de conjugación más pequeña es de 15 elementos, sabemos que  $|N| > 26$ . Por tanto,  $|N| \in \{30, 40, 60\}$ . Para, desde 11 podemos sumár un múltiplo de 10, es necesario que contenga a los 24 5–ciclos y a los 15 productos de dos transposiciones disjuntas, luego  $|N| \geq 11 + 15 + 24 = 50$ , luego  $|N| = 60$ , por lo que tan solo nos falta por determinar 10 elementos. No obstante, todas las clases restantes son de más de 10 elementos. Por tanto, no puede contener ningún 2–ciclo.
- Supongamos que  $N$  contiene un 4–ciclo. Entonces,  $|N| \geq 1 + 30 = 31$ , que no divide a 120. Por tanto,  $|N| \in \{40, 60\}$ . Para, desde 31 podemos

sumar un múltiplo de 10, es necesario que contenga a los 24 5-ciclos y a los 15 productos de dos transposiciones disjuntas, pero  $31 + 24 + 15 > 60$ . Por tanto, no puede contener ningún 4-ciclo.

- Supongamos que  $N$  contiene un producto de un 2-ciclo y un 3-ciclo. Entonces,  $|N| \geq 1 + 20 = 21$ , que no divide a 120. Como la siguiente clase de conjugación más pequeña es de 10 elementos, sabemos que  $|N| > 31$ . Por tanto,  $|N| \in \{40, 60\}$ . Para, desde 21 podemos sumar un múltiplo de 10, es necesario que contenga a los 24 5-ciclos y a los 15 productos de dos transposiciones disjuntas, luego  $|N| \geq 21 + 15 + 24 = 60$ , luego  $|N| = 60$ . Por tanto,  $N$  está formado por:

- 1 1-ciclo (la identidad).
- 20 productos de un 2-ciclo y un 3-ciclo.
- 24 5-ciclos.
- 15 productos de dos transposiciones disjuntas.

No obstante, veamos que  $N$  no es un subgrupo de  $S_5$  puesto que no es cerrado por producto:

$$(1\ 2)(3\ 4\ 5) (1\ 2)(3\ 4) = (1\ 2)(1\ 2)(3\ 4\ 5)(3\ 4) = (3\ 4\ 5)(3\ 4) = (3\ 5) \notin N$$

Por tanto, no puede contener ningún producto de un 2-ciclo y un 3-ciclo.

Por tanto,  $N \subset A_5$ . Como  $N$  es un grupo, se tiene que  $N < A_5$ . Si  $N$  no es normal en  $A_5$ , entonces tampoco lo es en  $S_5$ , por lo que  $N$  es normal en  $A_5$ . No obstante,  $A_5$  es simple, luego  $N = A_5$ . Por tanto, la única serie de composición de  $S_5$  es la siguiente:

$$S_5 \triangleright A_5 \triangleright \{1\}$$

Como vemos:

$$l(S_5) = 2$$

$$\text{fact}(S_5) = \{\mathbb{Z}_2, A_5\}$$

**Ejercicio 1.5.6.** Sea  $G$  un grupo finito, y

$$G = G_0 \triangleright G_1 \triangleright \cdots \triangleright G_{r-1} \triangleright G_r = \{1\}$$

una serie normal de  $G$ . Demostrar que

$$l(G) = \sum_{i=0}^{r-1} l\left(\frac{G_i}{G_{i+1}}\right), \quad \text{fact}(G) = \bigcup_{i=0}^{r-1} \text{fact}\left(\frac{G_i}{G_{i+1}}\right).$$

Como  $G$  es finito y  $G_1 \triangleleft G$ , por el Ejercicio 1.5.4 se tiene que:

$$l(G) = l(G_1) + l(G/G_1)$$

$$\text{fact}(G) = \text{fact}(G_1) \cup \text{fact}(G/G_1).$$

Como  $G_1$  es finito y  $G_2 \triangleleft G_1$ , por el Ejercicio 1.5.4 se tiene que:

$$\begin{aligned} l(G) &= l(G_1) + l(G/G_1) = l(G_2) + l(G_1/G_2) + l(G/G_1) \\ &= l(G_2) + l(G_1/G_2) + l(G/G_1) \\ \text{fact}(G) &= \text{fact}(G_1) \cup \text{fact}(G/G_1) = \text{fact}(G_2) \cup \text{fact}(G_1/G_2) \cup \text{fact}(G/G_1). \end{aligned}$$

Iterando hasta usar que  $G_r \triangleleft G_{r-1}$ , se tiene que:

$$\begin{aligned} l(G) &= \sum_{i=0}^{r-1} l(G_i/G_{i+1}) + \cancel{l(G_r)} \\ \text{fact}(G) &= \bigcup_{i=0}^{r-1} \text{fact}(G_i/G_{i+1}) \cup \cancel{\text{fact}(G_r)}. \end{aligned}$$

**Ejercicio 1.5.7.** Si  $G_1, G_2, \dots, G_r$  son grupos finitos, demostrar que

$$l(G_1 \times G_2 \times \dots \times G_r) = \sum_{i=1}^r l(G_i), \quad \text{fact}(G_1 \times G_2 \times \dots \times G_r) = \bigcup_{i=1}^r \text{fact}(G_i).$$

Demostramos por inducción sobre  $r$ .

- Para  $r = 1$  se tiene trivialmente.
- Supuesto cierto para  $r$ , demostrémoslo para  $r + 1$ .

Buscamos demostrarlo aplicando el Ejercicio 1.5.4. Para ello, necesitamos un subgrupo normal de  $G_1 \times \dots \times G_r \times G_{r+1}$ . Definimos:

$$\begin{aligned} \pi : G_1 \times \dots \times G_r \times G_{r+1} &\longrightarrow G_1 \times \dots \times G_r \\ (g_1, g_2, \dots, g_r, g_{r+1}) &\longmapsto (g_1, g_2, \dots, g_r) \end{aligned}$$

Tenemos que  $\pi$  es un homomorfismo con:

$$\begin{aligned} \ker(\pi) &= \{1\} \times \dots \times \{1\} \times G_{r+1} \\ \text{Im}(\pi) &= G_1 \times \dots \times G_r. \end{aligned}$$

Por el Primer Teorema de Isomorfía, se tiene que:

$$\frac{G_1 \times \dots \times G_r \times G_{r+1}}{\{1\} \times \dots \times \{1\} \times G_{r+1}} \cong G_1 \times \dots \times G_r.$$

Veamos ahora que  $\{1\} \times \dots \times \{1\} \times G_{r+1}$  es isomorfo a  $G_{r+1}$ . Definimos:

$$\begin{aligned} \phi : \{1\} \times \dots \times \{1\} \times G_{r+1} &\longrightarrow G_{r+1} \\ (1, \dots, 1, g_{r+1}) &\longmapsto g_{r+1} \end{aligned}$$

Vemos claramente que  $\phi$  es un isomorfismo, luego  $\{1\} \times \dots \times \{1\} \times G_{r+1} \cong G_{r+1}$ .

Vistos ambos aspectos, como  $\{1\} \times \cdots \times \{1\} \times G_{r+1} = \ker(\pi) \triangleleft G_1 \times \cdots \times G_r \times G_{r+1}$  por el Ejercicio 1.5.4, se tiene que:

$$l(G_1 \times \cdots \times G_r \times G_{r+1}) = l(\{1\} \times \cdots \times \{1\} \times G_{r+1}) + l\left(\frac{G_1 \times \cdots \times G_r \times G_{r+1}}{\{1\} \times \cdots \times \{1\} \times G_{r+1}}\right)$$

Como las series de composición de dos grupos isomorfas son isomorfas, tenemos que:

$$l(G_1 \times \cdots \times G_r \times G_{r+1}) = l(G_{r+1}) + l(G_1 \times \cdots \times G_r) \stackrel{(*)}{=} l(G_{r+1}) + \sum_{i=1}^r l(G_i) = \sum_{i=1}^{r+1} l(G_i).$$

donde en (\*) hemos usado la hipótesis de inducción.

De igual forma, usando de nuevo el Ejercicio 1.5.4 se tiene que:

$$\begin{aligned} \text{fact}(G_1 \times \cdots \times G_r \times G_{r+1}) &= \text{fact}(\{1\} \times \cdots \times \{1\} \times G_{r+1}) \cup \text{fact}\left(\frac{G_1 \times \cdots \times G_r \times G_{r+1}}{\{1\} \times \cdots \times \{1\} \times G_{r+1}}\right) \\ &\stackrel{(*)}{=} \text{fact}(G_{r+1}) \cup \text{fact}(G_1 \times \cdots \times G_r) \\ &\stackrel{(**)}{=} \text{fact}(G_{r+1}) \cup \bigcup_{i=1}^r \text{fact}(G_i) = \bigcup_{i=1}^{r+1} \text{fact}(G_i). \end{aligned}$$

donde en (\*\*) hemos usado la hipótesis de inducción y en (\*) hemos empleado que las series de composición de dos grupos isomorfas son isomorfas, luego sus factores de composición son isomorfos y por tanto el conjunto fact de ambos grupos es el mismo (salvo la observación que hicimos de isomorfismos en el Ejercicio 1.5.4).

Por tanto, se ha demostrado el resultado por inducción.

**Ejercicio 1.5.8.** Sea  $G$  un grupo cíclico de orden  $p^n$  con  $p$  primo. Demostrar que  $l(G) = n$  y que  $\text{fact}(G) = (\mathbb{Z}_p, \mathbb{Z}_p, \dots, \mathbb{Z}_p)$  ( $n$  veces).

Conviene tener presente el diagrama de Hasse de los subgrupos de  $G = \langle g \rangle$ , presente en la Figura 1.52. Además, como  $G$  es cíclico, en particular es abeliano y todos sus subgrupos son abelianos, luego todas las relaciones de inclusión son de normalidad. Por tanto, la única serie de composición es la siguiente:

$$G = \langle g^{p^0} \rangle \triangleright \langle g^p \rangle \triangleright \langle g^{p^2} \rangle \triangleright \cdots \triangleright \langle g^{p^{n-1}} \rangle \triangleright \langle g^{p^n} \rangle = \{1\}$$

De esta serie de composición se deduce que  $l(G) = n$ . Veamos cuáles son los factores de composición:

$$\left| \frac{\langle g^{p^i} \rangle}{\langle g^{p^{i+1}} \rangle} \right| = \frac{|\langle g^{p^i} \rangle|}{|\langle g^{p^{i+1}} \rangle|} = \frac{O(g^{p^i})}{O(g^{p^{i+1}})} = \frac{p^n / \text{mcd}(p^n, p^i)}{p^n / \text{mcd}(p^n, p^{i+1})} = \frac{\text{mcd}(p^n, p^{i+1})}{\text{mcd}(p^n, p^i)} = \frac{p^{i+1}}{p^i} = p. \quad \forall i \in \{0, \dots, n-1\}$$

Por tanto, se tiene que:

$$\frac{\langle g^{p^i} \rangle}{\langle g^{p^{i+1}} \rangle} \cong \mathbb{Z}_p \quad \forall i \in \{0, \dots, n-1\}$$

Por tanto, los factores de composición son:

$$\text{fact}(G) = \left( \mathbb{Z}_p, \mathbb{Z}_p, \dots, \mathbb{Z}_p \right)^{(n)}.$$

**Ejercicio 1.5.9.** Sea  $G$  un grupo cíclico de orden  $n$ . Si la descomposición de  $n$  en factores primos es  $n = p_1^{e_1} p_2^{e_2} \cdots p_r^{e_r}$ , demostrar que

$$l(G) = e_1 + e_2 + \cdots + e_r,$$

y que

$$\text{fact}(G) = \left( \mathbb{Z}_{p_1}, \dots, \mathbb{Z}_{p_1} \right)^{(e_1)}, \dots, \left( \mathbb{Z}_{p_r}, \dots, \mathbb{Z}_{p_r} \right)^{(e_r)}.$$

Aplica el resultado cuando  $n = 12$  y compara su longitud y factores de composición con los del grupo  $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_6$ .

Sabemos que  $\text{mcd}(p_1, \dots, p_r) = 1$ , luego  $\text{mcd}(p_1^{e_1}, \dots, p_r^{e_r}) = 1$ . Por tanto, se tiene que:

$$\prod_{i=1}^r C_{p_i^{e_i}} \quad \text{es cíclico}$$

Además, se tiene que:

$$\left| \prod_{i=1}^r C_{p_i^{e_i}} \right| = \prod_{i=1}^r |C_{p_i^{e_i}}| = \prod_{i=1}^r p_i^{e_i} = n.$$

Por tanto,  $G \cong \prod_{i=1}^r C_{p_i^{e_i}}$ . Como dos grupos isomorfos tienen series de composición isomorfas, se tiene que:

$$l(G) = l\left(\prod_{i=1}^r C_{p_i^{e_i}}\right) \stackrel{(*)}{=} \sum_{i=1}^r l(C_{p_i^{e_i}}) \stackrel{(**)}{=} \sum_{i=1}^r e_i$$

donde en (\*) hemos usado el Ejercicio 1.5.7 y en (\*\*) el Ejercicio 1.5.8.

Veamos ahora cuáles son los factores de composición. Como las series de composición de dos grupos isomorfos son isomorfas y, por tanto, sus factores de composición son isomorfos, se tiene que:

$$\begin{aligned} \text{fact}(G) &= \text{fact}\left(\prod_{i=1}^r C_{p_i^{e_i}}\right) \stackrel{(*)}{=} \bigcup_{i=1}^r \text{fact}(C_{p_i^{e_i}}) \stackrel{(**)}{=} \bigcup_{i=1}^r \left( \mathbb{Z}_{p_i}, \mathbb{Z}_{p_i}, \dots, \mathbb{Z}_{p_i} \right)^{(e_i)} \\ &= \left( \mathbb{Z}_{p_1}, \dots, \mathbb{Z}_{p_1} \right)^{(e_1)}, \dots, \left( \mathbb{Z}_{p_r}, \dots, \mathbb{Z}_{p_r} \right)^{(e_r)}. \end{aligned}$$

donde en (\*) hemos usado el Ejercicio 1.5.7 y en (\*\*) el Ejercicio 1.5.8. Por tanto, se ha demostrado el resultado.

Aplicándolo ahora a  $n = 12$ , se tiene que  $12 = 2^2 \cdot 3^1$ , luego:

$$\begin{aligned} l(\mathbb{Z}_{12}) &= 2 + 1 = 3 \\ \text{fact}(\mathbb{Z}_{12}) &= (\mathbb{Z}_2, \mathbb{Z}_2, \mathbb{Z}_3). \end{aligned}$$

Queremos calcular ahora la longitud y factores de composición de  $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_6$ . Como este no es cíclico, calculamos su longitud y factores de composición usando el Ejercicio 1.5.7:

$$l(\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_6) = l(\mathbb{Z}_2) + l(\mathbb{Z}_6) = 1 + 1 + 1 = 3$$

$$\text{fact}(\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_6) = \text{fact}(\mathbb{Z}_2) \cup \text{fact}(\mathbb{Z}_6) = (\mathbb{Z}_2) \cup (\mathbb{Z}_2, \mathbb{Z}_3) = (\mathbb{Z}_2, \mathbb{Z}_2, \mathbb{Z}_3).$$

Comprobamos por tanto que, aun no siendo isomorfos (puesto que uno es cíclico y el otro no), se cumple que:

$$l(\mathbb{Z}_{12}) = l(\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_6) = 3$$

$$\text{fact}(\mathbb{Z}_{12}) = \text{fact}(\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_6) = (\mathbb{Z}_2, \mathbb{Z}_2, \mathbb{Z}_3).$$

Notemos que si dos grupos son isomorfos entonces tienen la misma longitud y los mismos factores de composición, pero el recíproco no es cierto.

**Ejercicio 1.5.10.** Sea  $D_n$  el grupo diédrico de orden  $2n$ . Si la descomposición de  $n$  en factores primos es  $n = p_1^{e_1} p_2^{e_2} \cdots p_r^{e_r}$ , demostrar que

$$l(D_n) = e_1 + e_2 + \cdots + e_r + 1,$$

y que

$$\text{fact}(D_n) = (\mathbb{Z}_{p_1}, \overset{(e_1)}{\cdot\cdot\cdot} \mathbb{Z}_{p_1}, \dots, \mathbb{Z}_{p_r}, \overset{(e_r)}{\cdot\cdot\cdot}, \mathbb{Z}_{p_r}, \mathbb{Z}_2).$$

Sabemos que la siguiente serie es una serie normal de  $D_n$ :

$$D_n \triangleright \langle r \rangle \triangleright \{1\}$$

Por tanto, por el Ejercicio 1.5.6 se tiene que:

$$l(D_n) = l\left(\frac{D_n}{\langle r \rangle}\right) + l\left(\frac{\langle r \rangle}{\{1\}}\right)$$

$$\text{fact}(D_n) = \text{fact}\left(\frac{D_n}{\langle r \rangle}\right) \cup \text{fact}\left(\frac{\langle r \rangle}{\{1\}}\right)$$

Sabemos que  $|D_n/\langle r \rangle| = 2n/n = 2$ , luego  $D_n/\langle r \rangle \cong \mathbb{Z}_2$ . Por otro lado, sabemos que  $\langle r \rangle$  es cíclico de orden  $n$ , luego  $\langle r \rangle \cong \mathbb{Z}_n$ . Como la longitud y los factores se mantienen bajo isomorfismos, y usando el Ejercicio 1.5.9 con  $n = p_1^{e_1} p_2^{e_2} \cdots p_r^{e_r}$  y 2 primo, se tiene que:

$$l(D_n) = l\left(\frac{D_n}{\langle r \rangle}\right) + l\left(\frac{\langle r \rangle}{\{1\}}\right) = l(\mathbb{Z}_2) + l(\mathbb{Z}_n) = 1 + (e_1 + e_2 + \cdots + e_r)$$

$$= e_1 + e_2 + \cdots + e_r + 1$$

$$\text{fact}(D_n) = \text{fact}\left(\frac{D_n}{\langle r \rangle}\right) \cup \text{fact}\left(\frac{\langle r \rangle}{\{1\}}\right) = \text{fact}(\mathbb{Z}_2) \cup \text{fact}(\mathbb{Z}_n)$$

$$= (\mathbb{Z}_2) \cup \left(\mathbb{Z}_{p_1}, \overset{(e_1)}{\cdot\cdot\cdot} \mathbb{Z}_{p_1}, \dots, \mathbb{Z}_{p_r}, \overset{(e_r)}{\cdot\cdot\cdot}, \mathbb{Z}_{p_r}\right)$$

$$= (\mathbb{Z}_{p_1}, \overset{(e_1)}{\cdot\cdot\cdot} \mathbb{Z}_{p_1}, \dots, \mathbb{Z}_{p_r}, \overset{(e_r)}{\cdot\cdot\cdot}, \mathbb{Z}_{p_r}, \mathbb{Z}_2).$$

**Ejercicio 1.5.11.** Demostrar que  $D_n$ ,  $S_2$ ,  $S_3$  y  $S_4$  son grupos resolubles.

1.  $D_n$ .

Una serie normal de  $D_n$  es la siguiente:

$$D_n \triangleright \langle r \rangle \triangleright \{1\}$$

Sus factores son:

$$\begin{aligned} \frac{D_n}{\langle r \rangle} &\cong \mathbb{Z}_2 \\ \frac{\langle r \rangle}{\{1\}} &\cong \langle r \rangle \cong \mathbb{Z}_n \end{aligned}$$

Por tanto, todos sus factores son abelianos, luego  $D_n$  es resoluble.

2.  $S_2$ .

La serie derivada de  $S_2$  es la siguiente:

$$S_2 \triangleright \{1\}$$

Donde he empleado que  $S_2 \cong C_2$  es abeliano, luego  $[S_2, S_2] = \{1\}$ . Por tanto,  $S_2$  es resoluble.

3.  $S_3$ .

Sabemos que  $S_3' = [S_3, S_3] = A_3 \cong C_3$  abeliano, luego la serie derivada de  $S_3$  es la siguiente:

$$S_3 \triangleright A_3 \triangleright \{1\}$$

Por tanto,  $S_3$  es resoluble.

4.  $S_4$ .

Una serie normal de  $S_4$  es la siguiente:

$$S_4 \triangleright A_4 \triangleright V \triangleright \{1\}$$

Sus factores son:

$$\begin{aligned} \frac{S_4}{A_4} &\cong \mathbb{Z}_2 \\ \frac{A_4}{V} &\cong \mathbb{Z}_3 \\ \frac{V}{\{1\}} &\cong V \end{aligned}$$

Donde  $V$  es el grupo de Klein, que es abeliano. Por tanto, todos sus factores son abelianos, luego  $S_4$  es resoluble.

**Ejercicio 1.5.12.** Sean  $H$  y  $K$  subgrupos normales de un grupo  $G$  tales que  $G/H$  y  $G/K$  son ambos resolubles. Demostrar que  $G/(H \cap K)$  también es resoluble.

Por el Segundo Teorema de Isomorfía, como  $H \triangleleft G$ , tenemos  $(H \cap K) \triangleleft K$  y:

$$\frac{K}{H \cap K} \cong \frac{KH}{H}$$

Este Teorema también afirma que  $KH < G$ , luego  $KH/H < G/H$ . Como  $G/H$  es resoluble, se tiene que  $KH/H$  es resoluble. Por tanto,  $K/(H \cap K)$  es resoluble.

Por otro lado, como  $K, H \triangleleft G$ , se tiene que  $(H \cap K) \triangleleft G$ . Como  $(H \cap K) \subset K$  y  $K \triangleleft G$ , por el Tercer Teorema de Isomorfía se tiene que  $H/(H \cap K) \triangleleft G/(H \cap K)$  y:

$$\frac{G/(H \cap K)}{K/(H \cap K)} \cong \frac{G}{K}$$

Como  $G/K$  es resoluble, se tiene que  $G/(H \cap K)/K/(H \cap K)$  es resoluble (puesto que esta propiedad se mantiene por isomorfismo).

Como  $\frac{G/(H \cap K)}{K/(H \cap K)}$  y  $K/(H \cap K)$  son ambos resolubles, entonces  $G/(H \cap K)$  es resoluble.

**Ejercicio 1.5.13.** Sea  $G$  un grupo resoluble y sea  $H$  un subgrupo normal no trivial de  $G$ . Demostrar que existe un subgrupo no trivial  $A$  de  $H$  que es abeliano y normal en  $G$ .

Como  $H < G$ , entonces  $H$  es resoluble. Consideramos su serie derivada:

$$H \triangleright H' \triangleright H'' \triangleright \dots \triangleright H^{(n)} = \{1\}$$

Como  $H \neq \{1\}$ ,  $n \neq 0$ . Sea ahora  $A = H^{(n-1)}$  (que podemos considerarlo puesto que  $n \neq 0$ ). Como  $[A, A] = [H^{(n-1)}, H^{(n-1)}] = H^{(n)} = \{1\}$ , se tiene que  $A$  es abeliano. Nos falta por ver que  $A \triangleleft G$ .

Consideramos la siguiente serie normal de  $G$ :

$$G \triangleright H \triangleright H' \triangleright H'' \triangleright \dots \triangleright H^{(n)} = \{1\}$$

Veamos que  $H^{(i)} \triangleleft G$  para todo  $i \in \{0, \dots, n\}$ .

- Para  $i = 0$ ,  $G \triangleleft H$ , luego se tiene que  $H^0 \triangleleft G$ .
- Supuesto cierto para  $i$ , veamos que se cumple para  $i + 1$ .

Sabemos que  $H^{(i)} \triangleleft G$ , y queremos ver que  $[H^{(i)}, H^{(i)}] \triangleleft G$ . Como se tiene que  $[H^{(i)}, H^{(i)}] = \langle [x, y] \mid x, y \in H^{(i)} \rangle$  y  $[x, y]^{-1} = [y, x]$ , tan solo es necesario comprobarlo sobre los generadores. Por tanto, sea  $x, y \in H^{(i)}$ ,  $g \in G$ . Entonces:

$$g[x, y]g^{-1} = [gxg^{-1}, gyg^{-1}]$$

Como  $H^{(i)} \triangleleft G$ , se tiene que  $gxg^{-1}, gyg^{-1} \in H^{(i)}$ , luego concluimos que  $[gxg^{-1}, gyg^{-1}] \in [H^{(i)}, H^{(i)}]$ . Por tanto,  $H^{(i+1)} = [H^{(i)}, H^{(i)}] \triangleleft G$ .

Por tanto,  $H^{(i)} \triangleleft G$  para todo  $i \in \{0, \dots, n\}$ . En particular,  $A = H^{(n-1)} \triangleleft G$ .

**Ejercicio 1.5.14.** Demuestra que todo  $p$ -grupo finito es resoluble.

**Ejercicio 1.5.15.** Demuestra que todo grupo de orden  $pq$ , con  $p$  y  $q$  primos, es un grupo resoluble.

**Ejercicio 1.5.16.** Demuestra que todo grupo de orden  $p^2q$ , con  $p$  y  $q$  primos, es un grupo resoluble.

**Ejercicio 1.5.17.** Demuestra que si  $p_1, p_2, p_3$  son tres primos tales que  $p_3 > p_1p_2$  entonces cualquier grupo de orden  $p_1p_2p_3$  es resoluble.

**Ejercicio 1.5.18.**

1. Demuestra que todo grupo de orden 70 es resoluble.
2. Demuestra que todo grupo de orden 24 es resoluble.
3. Demuestra que todo grupo de orden 100 es resoluble.
4. Demuestra que todo grupo de orden 48 es resoluble.
5. Sea  $G$  un grupo de orden 200. Demuestra que  $G \times D_{41}$  es resoluble.
6. Demuestra que todo grupo de orden 63 es soluble (sin usar que es un caso particular de un grupo de orden  $p^2q$  con  $p$  y  $q$  primos).

## 1.6. $G$ -conjuntos y $p$ -grupos

**Ejercicio 1.6.1.** Si  $X$  es un  $G$ -conjunto, demostrar que  $x^g = g^{-1}x$ ,  $x \in X, g \in G$ , define una acción por la derecha de  $G$  sobre  $X$ .

En primer lugar, vemos que se trata de una aplicación de  $G \times X$  en  $X$ . Veamos ahora que cumple las condiciones necesarias para ser una acción por la derecha:

- $x^1 = x$  para todo  $x \in X$ .

$$x^1 = {}^{1^{-1}}x = {}^1x = x$$

- $(x^g)^h = x^{gh}$  para todo  $x \in X$  y  $g, h \in G$ .

$$(x^g)^h = {}^{h^{-1}}(x^g) = {}^{h^{-1}}(g^{-1}x) = {}^{h^{-1}g^{-1}}x = (gh)^{-1}x = x^{gh}$$

Por tanto, se trata de una acción por la derecha de  $G$  sobre  $X$ .

**Ejercicio 1.6.2.** Sea  $G$  un grupo y  $N$  un subgrupo normal abeliano de  $G$ . Demostrar que  $G/N$  actúa sobre  $N$  por conjugación y obtener entonces un homomorfismo  $\varphi : G/N \rightarrow \text{Aut}(N)$ .

Veamos en primer lugar que  $G/N$  actúa sobre  $N$  por conjugación. Es decir, que la siguiente aplicación es una acción de  $G/N$  sobre  $N$ :

$$\begin{aligned} ac : G/N \times N &\longrightarrow N \\ (gN, n) &\longmapsto {}^{gN}n = gng^{-1} \end{aligned}$$

Veamos en primer lugar que está bien definida. Sean  $g_1, g_2 \in G$  de forma que  $g_1N = g_2N$ . Entonces  $\exists n' \in N$  tal que  $g_1 = g_2n'$ . Entonces:

$${}^{g_1N}n = g_1ng_1^{-1} = g_2n'n(g_2n')^{-1} = g_2n'n(n')^{-1}g_2^{-1} \stackrel{(*)}{=} g_2n'(n')^{-1}ng_2^{-1} = g_2ng_2^{-1} = {}^{g_2N}n$$

donde en (\*) hemos usado que  $N$  es abeliano. Por tanto, la acción está bien definida. Veamos ahora que se trata de una acción.

- ${}^{1N}n = 1n1^{-1} = n$  para todo  $n \in N$ .

- Comprobemos la segunda propiedad:

$${}^{(g_1N)(g_2N)}n = {}^{g_1g_2N}n = g_1g_2ng_2^{-1}g_1^{-1} = g_1({}^{g_2N}n)g_1^{-1} = {}^{g_1N}({}^{g_2N}n).$$

Buscamos ahora el homomorfismo  $\varphi : G/N \rightarrow \text{Aut}(N)$ . En primer lugar, consideramos el siguiente homomorfismo:

$$\begin{aligned} \Phi : G/N &\longrightarrow \text{Perm}(N) \\ gN &\longmapsto {}^{gN}(\cdot) = ac(gN, \cdot) \end{aligned}$$

Es necesario ver que, fijado  $gN \in G/N$ , la aplicación siguiente, además de pertenecer a  $\text{Perm}(N)$ , pertenece a  $\text{Aut}(N)$ :

$$\begin{aligned} f : N &\longrightarrow N \\ n &\longmapsto {}^{gN}n = gng^{-1} \end{aligned}$$

Sabemos que es biyectiva, por lo que tan solo nos queda probar que es un homomorfismo. Sean  $n_1, n_2 \in N$ :

$$f(n_1n_2) = {}^{gN}(n_1n_2) = g(n_1n_2)g^{-1} = gn_1g^{-1}gn_2g^{-1} = f(n_1)f(n_2).$$

Por tanto,  $f$  es un homomorfismo. La aplicación  $\varphi$  pedida entonces es:

$$\begin{aligned} \varphi : G/N &\longrightarrow \text{Aut}(N) \\ gN &\longmapsto f = {}^{gN}(\cdot) \end{aligned}$$

**Ejercicio 1.6.3.** Sean  $S$  y  $T$  dos  $G$ -conjuntos. Se define la *acción diagonal* de  $G$  sobre el producto cartesiano  $S \times T$  mediante  ${}^x(s, t) = ({}^xs, {}^xt)$ . Demostrar que, para la acción diagonal, el estabilizador de  $(s, t)$  es la intersección de los estabilizadores de  $s$  y  $t$  en las acciones dadas.

Fijados  $s \in S$  y  $t \in T$ , el estabilizador de  $(s, t)$  es:

$$\begin{aligned} \text{Stab}_G(s, t) &= \{g \in G \mid {}^g(s, t) = (s, t)\} = \{g \in G \mid ({}^gs, {}^gt) = (s, t)\} \\ &= \{g \in G \mid {}^gs = s \wedge {}^gt = t\} = \{g \in G \mid {}^gs = s\} \cap \{g \in G \mid {}^gt = t\} \\ &= \text{Stab}_G(s) \cap \text{Stab}_G(t). \end{aligned}$$

**Ejercicio 1.6.4.** Demostrar que si  $G$  contiene un elemento  $x$  que tiene exactamente dos conjugados, entonces  $G$  tiene un subgrupo normal propio.

*Observación.* Considerar el centralizador de  $x$ .

Consideramos la acción por conjugación de  $G$  sobre sí mismo:

$$\begin{aligned} ac : G \times G &\longrightarrow G \\ (g, h) &\longmapsto {}^gh = ghg^{-1} \end{aligned}$$

Calculamos el centralizador de  $x$ :

$$C_G(\{x\}) = \{g \in G \mid gx = xg\} = \{g \in G \mid gxg^{-1} = x\} = \{g \in G \mid {}^gx = x\} = \text{Stab}_G(x)$$

Por tanto,  $C_G(\{x\}) = \text{Stab}_G(x) < G$ . Veamos ahora que es normal en  $G$ . Para ello, tenemos que:

$$[G : C_G(\{x\})] = [G : \text{Stab}_G(x)] = |\text{Orb}(x)|$$

Calculemos la órbita de  $x$ :

$$\text{Orb}(x) = \{y \in G \mid \exists g \in G \text{ tal que } y = {}^gx\} = \{y \in G \mid \exists g \in G \text{ tal que } y = gxg^{-1}\} = \text{Cl}_G(x)$$

Como  $x$  tiene exactamente dos conjugados (él mismo y otro elemento  $y \in G$ ), tenemos que  $|\text{Orb}(x)| = 2$ . Por tanto:

$$[G : C_G(\{x\})] = |\text{Orb}(x)| = 2 \implies C_G(\{x\}) \triangleleft G$$

Por tanto,  $C_G(\{x\})$  es un subgrupo normal de  $G$ . Tan solo falta por comprobar que es propio.

- Si  $C_G(\{x\}) = G$ , entonces:

$$2 = |\text{Orb}(x)| = [G : \text{Stab}_G(x)] = [G : C_G(\{x\})] = 1 \implies \text{Contradicción.}$$

- Si  $C_G(\{x\}) = \{1\}$ , entonces:

$$2 = |\text{Orb}(x)| = [G : \text{Stab}_G(x)] = [G : C_G(\{x\})] = |G|$$

Por tanto,  $G = \{1, x\}$ . Calculemos el número de conjugados de 1 y de  $x$ :

$$\text{Cl}_G(1) = \{g1g^{-1} \mid g \in G\} = \{1\}$$

$$\text{Cl}_G(x) = \{g x g^{-1} \mid g \in G\} = \{1x1, xxx^{-1}\} = \{x\}$$

Por tanto, ambos tienen un único conjugado. Por tanto, no se puede dar este caso.

**Ejercicio 1.6.5.** Encontrar todos los grupos finitos que tienen exactamente dos clases de conjugación.

Sea  $G$  un grupo finito con  $|G| = n$  que tiene exactamente dos clases de conjugación; a saber,  $\exists x_1, x_2 \in G$  tales que  $\text{Cl}_G(x_1) \neq \text{Cl}_G(x_2)$ . Considerando la acción de  $G$  sobre sí mismo por conjugación, tenemos que:

$$\text{Orb}(x) = \text{Cl}_G(x) \quad \forall x \in G$$

Como las órbitas forman una partición de  $G$ , tenemos que:

$$|G| = |\text{Orb}(x_1)| + |\text{Orb}(x_2)| = |\text{Cl}_G(x_1)| + |\text{Cl}_G(x_2)|$$

Calculamos no obstante la clase de conjugación del  $1 \in G$ :

$$\text{Cl}_G(1) = \{g1g^{-1} \mid g \in G\} = \{gg^{-1} \mid g \in G\} = \{1\}$$

Por tanto,  $|\text{Cl}_G(1)| = 1$ . Supongamos sin pérdida de generalidad que  $1 \in \text{Cl}_G(x_1)$ . Entonces:

$$n = |\text{Cl}_G(x_1)| + |\text{Cl}_G(x_2)| = 1 + |\text{Cl}_G(x_2)| \implies |\text{Cl}_G(x_2)| = n - 1$$

Por otro lado, como  $|\text{Cl}_G(x_2)| = [G : \text{Stab}_G(x_2)]$ , tenemos que  $|\text{Cl}_G(x_2)|$  divide a  $|G|$ ; es decir,  $(n - 1) \mid n$ . Por tanto,  $n = 2$ , y tenemos por tanto que:

$$G \cong \mathbb{Z}_2$$

**Ejercicio 1.6.6.** Describir explícitamente las clases de conjugación del grupo  $D_4$ .

Consideramos el grupo  $D_4$ :

$$\begin{aligned} D_4 &= \{1, r, r^2, r^3, s, sr, sr^2, sr^3\} \\ &= \{s^i r^j \mid i = 0, 1, j = 0, 1, 2, 3\} \end{aligned}$$

Tenemos que:

$$\text{Cl}_{D_4}(1) = \{(s^i r^j)1(s^i r^j)^{-1} \mid i = 0, 1, j = 0, 1, 2, 3\} = \{1\}$$

$$\begin{aligned} \text{Cl}_{D_4}(r) &= \{(s^i r^j)r(s^i r^j)^{-1} \mid i = 0, 1, j = 0, 1, 2, 3\} = \{s^i r^j r r^{-j} s^{-i} \mid i = 0, 1, j = 0, 1, 2, 3\} \\ &= \{s^i r s^i \mid i = 0, 1\} = \{r, r^3\} = \text{Cl}_{D_4}(r^3) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Cl}_{D_4}(r^2) &= \{(s^i r^j)r^2(s^i r^j)^{-1} \mid i = 0, 1, j = 0, 1, 2, 3\} = \{s^i r^j r^2 r^{-j} s^{-i} \mid i = 0, 1, j = 0, 1, 2, 3\} \\ &= \{s^i r^2 s^{-i} \mid i = 0, 1\} = \{r^2\} \end{aligned}$$

$$\text{Cl}_{D_4}(s) = \{(s^i r^j)s(s^i r^j)^{-1} \mid i = 0, 1, j = 0, 1, 2, 3\} = \{s^i r^j s r^{-j} s^{-i} \mid i = 0, 1, j = 0, 1, 2, 3\}$$

Este último no es tan sencillo, puesto que  $r$  y  $s$  no conmutan. Calculamos en primer lugar para  $s = 0$ , sabiendo que las clases de conjugación son cerradas para inversos.

$$\begin{aligned} r s r^{-1} &= r s r^3 = sr^6 = sr^2 \in \text{Cl}_{D_4}(s) \\ r^2 s r^{-2} &= r^2 s r^2 = sr^6 r^2 = s \in \text{Cl}_{D_4}(s) \\ r^3 s r^{-3} &= r^3 s r = sr^9 r = sr^2 \in \text{Cl}_{D_4}(s) \end{aligned}$$

Por otro lado, para  $s = 1$ , tenemos que:

$$s s s = s \quad \text{y} \quad s s r^2 s = r^2 s = sr^6 = sr^2$$

Por tanto,  $\text{Cl}_{D_4}(s) = \{s, sr^2\} = \text{Cl}_{D_4}(sr^2)$ . Tan solo queda por tanto calcular la clase de conjugación de  $sr$  y de  $sr^3$ .

$$r sr r^{-1} = r sr r^3 = rs = sr^3 \in \text{Cl}_{D_4}(sr)$$

Por tanto, tenemos que  $\text{Cl}_{D_4}(sr) = \text{Cl}_{D_4}(sr^3)$ . Como las clases de conjugación forman una partición de  $D_4$ , tenemos que:

$$\begin{aligned} \text{Cl}_{D_4}(1) &= \{1\} \\ \text{Cl}_{D_4}(r) &= \{r, r^3\} \\ \text{Cl}_{D_4}(r^2) &= \{r^2\} \\ \text{Cl}_{D_4}(s) &= \{s, sr^2\} \\ \text{Cl}_{D_4}(sr) &= \{sr, sr^3\} \end{aligned}$$

**Ejercicio 1.6.7.** Se dice que la acción de un grupo finito  $G$  sobre un conjunto  $X$  es *transitiva* si hay una sola órbita para esta acción (es decir, si para cada  $x, y \in X$  existe algún  $g \in G$  tal que  $g x = y$ ). Demostrar que si  $G$  actúa transitivamente sobre un conjunto  $X$  con  $n$  elementos, entonces  $|G|$  es un múltiplo de  $n$ .

**Ejercicio 1.6.8.** Un subgrupo  $G \leq S_n$  se dice *transitivo* si la acción de  $G$  sobre  $\{1, 2, \dots, n\}$  es transitiva. Encontrar todos los subgrupos transitivos de  $S_3$  y  $S_4$ .

**Ejercicio 1.6.9.** Sea  $n \in \mathbb{N}$ . Una *partición* de  $n$  es una sucesión no decreciente de enteros positivos cuya suma es  $n$ . Dada una permutación  $\sigma \in S_n$ , la descomposición en ciclos disjuntos (incluyendo los ciclos de longitud 1) de  $\sigma = \gamma_1 \gamma_2 \cdots \gamma_r$  determina una partición  $n_1, n_2, \dots, n_r$  de  $n$  donde cada  $n_i$  es la longitud del ciclo  $\gamma_i$ . Dos permutaciones en  $S_n$  se dice que son del mismo tipo si determinan la misma partición de  $n$ . Demostrar:

1. Dos elementos de  $S_n$  son conjugados si y solo si son del mismo tipo.
2. El número de clases de conjugación de  $S_n$  es igual al número de particiones de  $n$ .

**Ejercicio 1.6.10.** Calcular el número de clases de conjugación de  $S_5$ . Dar un representante de cada una y encontrar el orden de cada clase. Calcular el estabilizador de  $(1\ 2\ 3)$  bajo la acción de conjugación de  $S_5$  sobre sí mismo.

**Ejercicio 1.6.11.** Sea  $G$  un grupo finito y  $\Phi : G \rightarrow \text{Perm}(G)$  la representación regular izquierda (que corresponde a la acción de  $G$  sobre sí mismo por traslación por la izquierda).

1. Demostrar que si  $x$  es un elemento de  $G$  de orden  $n$  y  $|G| = nm$ , entonces  $\Phi(x)$  es un producto de  $n$ -ciclos. Deducir que  $\Phi(x)$  es una permutación impar si y solo si el orden de  $x$  es par y el cociente del orden de  $G$  y el de  $x$  es impar.
2. Demostrar que si  $\text{Im}(\Phi)$  contiene una permutación impar entonces  $G$  tiene un subgrupo de índice 2.
3. Demostrar que si  $|G| = 2^k$  con  $k$  impar, entonces  $G$  tiene un subgrupo de índice 2.

*Observación.* Usar el Teorema de Cauchy para obtener un elemento de orden 2 y entonces usar los dos apartados anteriores.

**Ejercicio 1.6.12.** Sea  $G$  un  $p$ -grupo actuando sobre un conjunto finito  $X$ . Demostrar que

$$|X| \equiv |\text{Fix}_G(X)| \pmod{p}.$$

**Ejercicio 1.6.13.** Sea  $G$  un 2-grupo finito que actúa sobre un conjunto finito  $X$  cuya cardinalidad es un número impar. ¿Podemos afirmar que existe al menos un punto de  $X$  que queda fijo bajo la acción de  $G$ ? ¿Podemos decir lo mismo si  $|X|$  es par?

**Ejercicio 1.6.14.** Sea  $C_n = \langle a \mid a^n = 1 \rangle$  un grupo cíclico de orden  $n$ . Describir sus subgrupos de Sylow.

**Ejercicio 1.6.15.** Sea  $G$  un grupo finito y  $|G| = pn$  con  $p$  primo y  $p > n$ . Demostrar que  $G$  contiene un subgrupo normal de orden  $p$  y que todo subgrupo de  $G$  de orden  $p$  es normal en  $G$ .

**Ejercicio 1.6.16.** Sea  $H$  un subgrupo de un grupo finito  $G$  con  $[G : H] = p$  primo y  $p$  el menor primo que divide a  $|G|$ . Demostrar que entonces  $H$  es normal en  $G$ .

**Ejercicio 1.6.17.** Sea  $p$  un número primo. Demostrar:

1. Todo grupo no abeliano de orden  $p^3$  tiene un centro de orden  $p$ .
2. Existen únicamente dos grupos no isomorfos de orden  $p^2$ .
3. Todo subgrupo normal de orden  $p$  de un  $p$ -grupo finito está contenido en el centro.

**Ejercicio 1.6.18.** Demostrar que si  $N \triangleleft G$  y  $N$  y  $G/N$  son  $p$ -grupos entonces  $G$  es un  $p$ -grupo.

**Ejercicio 1.6.19.** Si  $G$  es un grupo de orden  $p^n$ ,  $p$  primo, demostrar que para todo  $k$ ,  $0 \leq k \leq n$ , existe un subgrupo normal de  $G$  de orden  $p^k$ .

**Ejercicio 1.6.20.** Hallar todos los subgrupos de Sylow de los grupos  $S_3$  y  $S_4$ .

*Observación.* Para los 2-subgrupos de Sylow de  $S_4$ , observar primero que todos deben contener al subgrupo de Klein  $V$ , y, al menos, una trasposición  $\tau$ , y que como consecuencia se pueden obtener como producto de  $V$  por el grupo cíclico generado por  $\tau$ .

**Ejercicio 1.6.21.** Hallar todos los subgrupos de Sylow de los grupos  $\mathbb{Z}_{600}$ ,  $Q_2$ ,  $D_5$ ,  $D_6$ ,  $A_4$ ,  $A_5$ ,  $S_5$ .

**Ejercicio 1.6.22.** Demostrar que  $D_4$  es isomorfo a los 2-subgrupos de Sylow de  $S_4$ .

*Observación.* Considerar la representación asociada a la acción de  $D_4$  sobre los vértices del cuadrado.

**Ejercicio 1.6.23.** Demostrar que todo grupo de orden 12 con más de un 3-subgrupo de Sylow es isomorfo al grupo alternado  $A_4$ .

*Observación.* Considerar la acción por traslación de un tal grupo sobre el conjunto de clases módulo  $P$ , siendo  $P$  un 3-subgrupo de Sylow. Probar que dicha acción es fiel.

**Ejercicio 1.6.24.**

1. Demostrar que no existen grupos simples de orden 12. Más concretamente, demostrar que todo grupo de orden 12 admite un subgrupo normal de orden 3 o de orden 4.
2. Demostrar que no existen grupos simples de orden 28. Más concretamente, probar que todo grupo de orden 28 contiene un subgrupo normal de orden 7.
3. Demostrar que no existen grupos simples de orden 56. Más concretamente, probar que todo grupo de orden 56 contiene un subgrupo normal de orden 7 o de orden 8.
4. Demostrar que no existen grupos simples de orden 148 ni de orden 200 ni de orden 351.

**Ejercicio 1.6.25.** Calcular el número de elementos de orden 7 que tiene un grupo simple de orden 168.

## 1.7. Clasificación de grupos abelianos finitos

**Ejercicio 1.7.1.** Calcular los órdenes de todos los elementos de los distintos grupos abelianos de orden 8, 12, 16 y 24.

**Ejercicio 1.7.2.** Para los siguientes grupos calcular sus descomposiciones cíclicas.

1.  $G_1 = \{1, 8, 12, 14, 18, 21, 27, 31, 34, 38, 44, 47, 51, 53, 57, 64\}$  con operación dada por multiplicación módulo 65.
2.  $G_2 = \{1, 8, 17, 19, 26, 28, 37, 44, 46, 53, 62, 64, 71, 73, 82, 89, 91, 98, 107, 109, 116, 118, 127, 134\}$  con operación dada por multiplicación módulo 135.
3.  $G_3 = \{1, 7, 17, 23, 49, 55, 65, 71\}$  con operación dada por multiplicación módulo 96.
4.  $G_4 = \{1, 4, 11, 14, 16, 19, 26, 29, 31, 34, 41, 44\}$  con operación dada por multiplicación módulo 45.

**Ejercicio 1.7.3.** Calcular la descomposición cíclica y cíclica primaria de los grupos abelianos  $C_{24} \times C_{40} \times C_{35}$  y  $C_{14} \times C_{100} \times C_{40}$ . ¿Son isomorfos?

**Ejercicio 1.7.4.** Sea  $G$  el grupo de las simetrías de un rectángulo (no cuadrado). Probar que  $G$  es un grupo abeliano. Calcular sus descomposiciones cíclica y cíclica primaria.

**Ejercicio 1.7.5.** Sea  $G$  un grupo abeliano de orden  $n$  y  $l(G)$  su longitud. Si la descomposición de  $n$  en factores primos es  $n = p_1^{e_1} \cdots p_r^{e_r}$ , demostrar que

$$l(G) = e_1 + \cdots + e_r,$$

y que

$$\text{fact}(G) = (C_{p_1, \binom{e_1}{\cdot}}, C_{p_1}, \dots, C_{p_r, \binom{e_r}{\cdot}}, C_{p_r}).$$

En particular, todos los grupos abelianos del mismo orden tienen la misma longitud y la misma lista de factores de composición.

**Ejercicio 1.7.6.** Listar todos los grupos abelianos no isomorfos de orden 10, 16, 20, 30, 40, 108 y 360, dando sus factores invariantes, divisores elementales y descomposiciones cíclicas y cíclicas primarias.

**Ejercicio 1.7.7.** Calcular la forma normal, los factores invariantes y los divisores elementales de las siguientes matrices:

$$A_1 = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ -6 & -4 & -6 \\ 6 & 6 & 6 \\ 7 & 10 & 6 \end{pmatrix}, \quad A_2 = \begin{pmatrix} -22 & -48 & -267 \\ -4 & -4 & 31 \\ -4 & -24 & 105 \\ 4 & -6 & -6 \end{pmatrix},$$

$$A_3 = \begin{pmatrix} 9 & 4 & 5 \\ -4 & 0 & -3 \\ -6 & -4 & -2 \end{pmatrix}, \quad A_4 = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 8 \end{pmatrix}.$$

**Ejercicio 1.7.8.** Para los siguientes grupos abelianos calcular sus rangos y sus descomposiciones cíclicas y cíclicas primarias. ¿Son algunos de estos grupos isomorfos?

$$1. G_1 = \left\langle a, b, c \mid \begin{array}{l} 3a + 9b + 9c = 0 \\ 9a - 3b + 9c = 0 \end{array} \right\rangle.$$

$$2. G_2 = \left\langle a, b, c \mid \begin{array}{l} 2a + 2b + 3c = 0 \\ 5a + 2b - 3c = 0 \end{array} \right\rangle.$$

$$3. G_3 = \left\langle a, b, c, d \mid \begin{array}{l} a + 3b + 2c = 0 \\ 5a + 17b + 12c = 0 \\ 6a + 4c = 0 \end{array} \right\rangle.$$

$$4. G_4 = \left\langle a, b, c \mid \begin{array}{l} 12a + 4b + 6c = 0 \\ -4a + 2b + 8c = 0 \\ -2a + 16b + 34c = 0 \end{array} \right\rangle.$$

$$5. G_5 = \mathbb{Z}_{24} \oplus \mathbb{Z}_{40} \oplus \mathbb{Z}_{35}.$$

**Ejercicio 1.7.9.** Dados los grupos abelianos:

$$G = \left\langle a, b, c, d \mid \begin{array}{l} a + 2c - d = 0 \\ a + 5c + 5d = 0 \\ 2a + 4c + 2d = 0 \end{array} \right\rangle,$$

$$H = \mathbb{Z}^3 / K,$$

donde  $K$  es el subgrupo con generadores  $\{(1, 2, 7), (1, 4, 7), (-1, 0, 2)\}$ . Calcular:

1. El rango, los factores invariantes y los divisores elementales de cada uno de ellos.
2. Sus descomposiciones cíclicas y cíclicas primarias.
3. Las descomposiciones cíclica y cíclica primaria de  $G \oplus H$ .

**Ejercicio 1.7.10.**

1. Encuentra todos los grupos abelianos distintos, salvo isomorfismo, de orden 500. Da para cada uno de ellos sus descomposiciones cíclica y cíclica primaria.
2. Calcula las descomposiciones cíclica y cíclica primaria de

$$G = \left\langle a, b, c \mid \begin{array}{l} 3a - 3b + 9c = 0 \\ 6a + 12b - 9c = 0 \\ 12b + 9c = 0 \end{array} \right\rangle.$$

¿Cuántos elementos tiene  $G$ ? ¿Tiene algún elemento de orden 6?

**Ejercicio 1.7.11.** Dados los grupos abelianos

$$G = \left\langle a, b, c \mid \begin{array}{l} 2a - 6b + 18c = 0 \\ 6a + 6c = 0 \end{array} \right\rangle,$$

$$H = \mathbb{Z}^3 / \langle (1, -9, 3), (1, -7, 1), (1, -1, 1) \rangle.$$

1. Calcula sus rangos, descomposiciones cíclicas y cíclicas primarias.
2. ¿Son isomorfos? ¿Lo son sus subgrupos de torsión?
3. ¿Cuántos elementos de orden 6 tiene  $H$ ? ¿Y  $G$ ?
4. ¿Cuántos grupos hay, salvo isomorfismos, con los mismos elementos que  $H$ ?

**Ejercicio 1.7.12.**

1. Calcula la descomposición cíclica y cíclica primaria de todos los grupos abelianos no isomorfos de orden 484.
2. Sea

$$G = \left\langle a, b, c \mid \begin{array}{l} 2a + b + 4c = 0 \\ 2a + 2b + 6c = 0 \end{array} \right\rangle,$$

y  $H = \mathbb{Z}^2/K$ , con  $K$  el subgrupo de  $\mathbb{Z}^2$  generado por los pares  $(2, 3)$  y  $(6, 3)$ . Razona, calculando las descomposiciones cíclica y cíclica primaria de ambos, que no son isomorfos.

**Ejercicio 1.7.13.**

1. Encuentra todos los grupos abelianos distintos, salvo isomorfismo, de orden 1176. Da para cada uno de ellos sus descomposiciones cíclica y cíclica primaria.
2. Calcula las descomposiciones cíclica y cíclica primaria del grupo abeliano dado en términos de generadores y relaciones siguiente:

$$G = \left\langle x, y, z \mid \begin{array}{l} 2x = 5y \\ 2y = 5z \\ 2z = 5x \end{array} \right\rangle.$$

¿Qué tipo de órdenes tienen sus elementos?

**Ejercicio 1.7.14.** Calcular las descomposiciones cíclica y cíclica primaria del siguiente grupo abeliano dados en términos de generadores y relaciones:

$$G = \left\langle a, b, c, d \mid \begin{array}{l} 9a + 9b + c + 8d = 0 \\ 63a - b + 63c + 64d = 0 \\ 56a - 8b + 64c + 56d = 0 \end{array} \right\rangle.$$

¿Tiene  $G$  elementos de orden infinito? ¿Y de orden finito? Calcular cuántos grupos abelianos no isomorfos hay con el mismo orden que la torsión de  $G$ .

**Ejercicio 1.7.15.** Calcular las descomposiciones cíclica y cíclica primaria de todos los grupos abelianos no isomorfos de orden 13916. Identifica la componente 3-primaria de cualquiera de esos grupos.