

# Lógica y Teoría Descriptiva de Conjuntos

FACULTAD  
DE  
CIENCIAS  
UNIVERSIDAD DE GRANADA



Los Del DGIIM, [losdeldgiim.github.io](https://losdeldgiim.github.io)

Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas  
Universidad de Granada



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0).

Eres libre de compartir y redistribuir el contenido de esta obra en cualquier medio o formato, siempre y cuando des el crédito adecuado a los autores originales y no persigas fines comerciales.

# Lógica y Teoría Descriptiva de Conjuntos

Los Del DGIIM, [losdeldgiim.github.io](https://losdeldgiim.github.io)

José Juan Urrutia Milán

Granada, 2025



# Índice general

<b>1. Lógica Proposicional</b>	<b>5</b>
1.1. Semántica . . . . .	5
1.2. Demostraciones . . . . .	8
1.2.1. Resultados útiles a la hora de realizar demostraciones . . . . .	11
1.3. Teoremas de coherencia y adecuación . . . . .	13
<b>2. Lógica de Primer Orden</b>	<b>15</b>
2.1. Semántica . . . . .	17
2.2. Demostraciones . . . . .	19
2.2.1. Definición de una demostración . . . . .	19
2.2.2. Primeros resultados . . . . .	21
2.3. Teoremas de adecuación y coherencia . . . . .	22
2.4. Sistemas matemáticos . . . . .	23
2.4.1. Lenguajes de Primer Orden con Igualdad . . . . .	23
2.4.2. Aritmética de Primer Orden . . . . .	24
2.4.3. Teoría de conjuntos (de Zermelo-Fraenkel) . . . . .	25
<b>3. Introducción a la Teoría Descriptiva de Conjuntos</b>	<b>29</b>
3.1. Construcción de fórmulas . . . . .	29
3.2. Conjunto de Cantor . . . . .	35
3.3. Jerarquía de Borel . . . . .	37
3.3.1. Conjunto de Vitali . . . . .	39
3.4. Jerarquía generalizada . . . . .	41

El presente documento es un resumen del microcredencial de “Lógica y Teoría Descriptiva de Conjuntos”, que recoge los principales conceptos que se impartieron en el mismo. Si cursa el microcredencial se recomienda ver los recursos proporcionados por el profesorado. Si está cursando actualmente la asignatura de “Lógica y Métodos Discretos” del grado de Informática, los dos primeros capítulos pueden serle de gran ayuda.

A lo largo del curso trabajaremos en  $\mathbb{Z}_2$ , por lo que se recomienda al lector repasar los apuntes de Álgebra I en caso de no estar familiarizado con dicho cuerpo.

# 1. Lógica Proposicional

Consideraremos un conjunto finito de proposiciones atómicas, que serán para nosotros enunciados indivisibles. Nos interesará la veracidad o falsedad de cada una de estas proposiciones. Consideraremos sobre estas las conectivas  $\neg$ ,  $\wedge$ ,  $\vee$ ,  $\rightarrow$  y  $\leftrightarrow$ . De esta forma, somos capaces de definir lo que es una proposición en nuestro lenguaje.

**Definición 1.1** (Proposición). Definimos las proposiciones de forma recursiva<sup>1</sup>:

1. Las proposiciones atómicas son proposiciones.
2. Si  $\alpha$  y  $\beta$  son proposiciones, también lo son:

$$\neg\alpha, \alpha \wedge \beta, \alpha \vee \beta, \alpha \rightarrow \beta, \alpha \leftrightarrow \beta$$

3. No hay más proposiciones que las que se puedan obtener siguiendo una secuencia finita de pasos a partir de las enunciadas.

## 1.1. Semántica

Una vez definida lo que es una proposición, pasamos a lo que nos interesa, asignar un valor de verdad o de falsedad a cada una de las proposiciones que nos encontremos. Para ello, consideraremos una aplicación del conjunto de las proposiciones en  $\mathbb{Z}_2$ , e interpretaremos el valor de 0 como falso y el valor de 1 como verdad.

**Definición 1.2** (Interpretación). Sea  $\mathcal{P}$  el conjunto de todas las proposiciones de un lenguaje proposicional, una interpretación sobre el mismo es una aplicación  $I : \mathcal{P} \rightarrow \mathbb{Z}_2$  que verifica:

1.  $I(\neg a) = 1 + I(a)$ .
2.  $I(a \wedge b) = I(a)I(b)$ .
3.  $I(a \vee b) = I(a) + I(b) + I(a)I(b)$ .
4.  $I(a \rightarrow b) = 1 + I(a) + I(a)I(b)$ .
5.  $I(a \leftrightarrow b) = 1 + I(a) + I(b)$ .

Para cualesquiera proposiciones  $a, b \in \mathcal{P}$ .

---

<sup>1</sup>Algo que será habitual en este curso.

*Observación.* Observemos que, gracias a la naturaleza recursiva de las interpretaciones, basta dar un valor de  $\mathbb{Z}_2$  a cada proposición atómica para obtener una interpretación: conocidos los valores de las proposiciones atómicas conocemos el valor de cualquier proposición y viceversa.

**Definición 1.3.** Sea  $\alpha$  y  $\beta$  dos proposiciones de forma que  $I(\alpha) = I(\beta)$  para cualquier interpretación  $I$ , entonces escribiremos que  $\alpha \equiv \beta$  y podemos decir que  $\alpha$  y  $\beta$  son semánticamente equivalentes.

**Definición 1.4.** Sea  $\alpha$  una proposición:

- Si existe una interpretación  $I$  de forma que  $I(\alpha) = 1$ , diremos que  $\alpha$  es **satisfacible**.
- Si existe una interpretación  $I$  de forma que  $I(\alpha) = 0$ , diremos que  $\alpha$  es **refutable**.
- Si  $I(\alpha) = 1$  para cualquier interpretación  $I$ , diremos que  $\alpha$  es una **tautología**.
- Si  $I(\alpha) = 0$  para cualquier interpretación  $I$ , diremos que  $\alpha$  es una **contradicción**.

**Definición 1.5** (Consecuencia lógica). Sea  $\Gamma \cup \{p\}$  un conjunto de proposiciones, decimos que  $p$  es consecuencia lógica de  $\Gamma$  (notado por  $\Gamma \vDash p$ ), si dada una interpretación  $I$ , siempre que se tenga que  $I(\gamma) = 1$  para cualquier  $\gamma \in \Gamma$ , entonces se tiene que  $I(p) = 1$ .

**Notación.** Por comodidad, si  $p$  es una proposición de forma que  $\emptyset \vDash p$ , entonces notaremos:

$$\vDash p$$

Notemos que en este caso  $p$  es una tautología, ya que estamos diciendo que  $I(p) = 1$  para cualquier<sup>2</sup> interpretación  $I$ .

**Proposición 1.1.** Se verifica que  $\Gamma \vDash p$  si y solo si  $(1 + I(p)) \prod_{\gamma \in \Gamma} I(\gamma) = 0$ .

*Demostración.* Veamos las dos implicaciones:

$\implies$ ) Sea  $I$  una interpretación:

- Si existe un  $\gamma \in \Gamma$  de forma que  $I(\gamma) = 0$ , entonces tenemos el resultado.
- En caso contrario, tendremos que  $I(\gamma) = 1$  para cualquier  $\gamma \in \Gamma$ . En dicho caso, como  $\Gamma \vDash p$ , se tendrá que  $I(p) = 1$ , por lo que:

$$1 + I(p) = 0 \implies (1 + I(p)) \prod_{\gamma \in \Gamma} I(\gamma) = 0$$

$\impliedby$ ) Sea  $I$  una interpretación que verifica  $I(\gamma) = 1$  para cualquier  $\gamma \in \Gamma$ , como  $\mathbb{Z}_2$  es un dominio de integridad, de  $(1 + I(p)) \prod_{\gamma \in \Gamma} I(\gamma) = 0$  deducimos que  $I(p) + 1 = 0$ , por lo que  $I(p) = 1$  y entonces se tiene que  $\Gamma \vDash p$ .

<sup>2</sup>Cualquiera que haga ciertos todos los elementos del vacío.

□

**Teorema 1.2** (de la deducción). *Sea  $\Gamma \cup \{\alpha, \beta\}$  un conjunto de proposiciones, equivalentes:*

1.  $\Gamma \models \alpha \rightarrow \beta$
2.  $\Gamma \cup \{\alpha\} \models \beta$

*Demostración.* Demostramos las dos implicaciones:

1)  $\implies$  2) Sea  $I$  una interpretación de forma que  $I(\alpha) = 1$  y que  $I(\gamma) = 1$  para todo  $\gamma \in \Gamma$ , entonces (por 1) deducimos que  $I(\alpha \rightarrow \beta) = 1$ , luego:

$$1 = I(\alpha \rightarrow \beta) = 1 + \cancel{I(\alpha)}^1 + \cancel{I(\alpha)}^1 I(\beta) = 1 + 1 + I(\beta) = I(\beta)$$

2)  $\implies$  1) Sea  $I$  una interpretación de forma que  $I(\gamma) = 1$  para todo  $\gamma \in \Gamma$ :

- Si  $I(\alpha) = 0$ , entonces:

$$I(\alpha \rightarrow \beta) = 1 + I(\alpha) + I(\alpha)I(\beta) = 1$$

Por lo que se tiene 1.

- Si  $I(\alpha) = 1$ , como  $\Gamma \cup \{\alpha\} \models \beta$ , entonces  $I(\beta) = 1$ , por lo que:

$$I(\alpha \rightarrow \beta) = 1 + I(\alpha) + I(\alpha)I(\beta) = 1 + 1 + 1 = 1$$

□

**Ejemplo.** Demostraremos ahora que varias proposiciones son tautologías:

$\models \alpha \rightarrow \alpha$

Por el Teorema de la deducción (1.2),  $\models \alpha \rightarrow \alpha$  es equivalente a ver que  $\{\alpha\} \models \alpha$ . En efecto, sea  $I$  una interpretación de forma que  $I(\alpha) = 1$ , tenemos que  $I(\alpha) = 1$ .

$\models \alpha \rightarrow (\beta \rightarrow \alpha)$

Por el Teorema de la deducción, es equivalente ver que  $\{\alpha\} \models \beta \rightarrow \alpha$ ; que nuevamente por el Teorema de la deducción es equivalente ver que  $\{\alpha, \beta\} \models \alpha$ . En efecto, sea  $I$  una interpretación de forma que  $I(\alpha) = I(\beta) = 1$ , entonces  $I(\alpha) = 1$ .

$\models (\alpha \rightarrow (\beta \rightarrow \gamma)) \rightarrow ((\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow (\alpha \rightarrow \gamma))$

Por el Teorema de la deducción aplicado 3 veces, es equivalente ver que:

$$\{\alpha \rightarrow (\beta \rightarrow \gamma), \alpha \rightarrow \beta, \alpha\} \models \gamma$$

Sea  $I$  una interpretación de forma que:

$$1 = I(\alpha \rightarrow (\beta \rightarrow \gamma)) = I(\alpha \rightarrow \beta) = I(\alpha)$$

Entonces:

$$\begin{aligned} 1 &= I(\alpha \rightarrow \beta) = 1 + I(\alpha) + I(\alpha)I(\beta) = 1 + 1 + I(\beta) = I(\beta) \implies I(\beta) = 1 \\ 1 &= I(\alpha \rightarrow (\beta \rightarrow \gamma)) = 1 + I(\alpha) + I(\alpha)I(\beta \rightarrow \gamma) \\ &= 1 + I(\alpha) + I(\alpha)(1 + I(\beta) + I(\beta)I(\gamma)) = 1 + 1 + 1(1 + 1 + I(\gamma)) \\ &= I(\gamma) \implies \underline{I(\gamma) = 1} \end{aligned}$$

$$\models (\neg\alpha \rightarrow \neg\beta) \rightarrow ((\neg\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow \alpha)$$

Por el Teorema de la deducción aplicado 2 veces, es equivalente ver que:

$$\{\neg\alpha \rightarrow \neg\beta, \neg\alpha \rightarrow \beta\} \models \alpha$$

Sea  $I$  una interpretación de forma que:

$$1 = I(\neg\alpha \rightarrow \neg\beta) = 1 + I(\neg\alpha) + I(\neg\alpha)I(\neg\beta)$$

$$1 = I(\neg\alpha \rightarrow \beta) = 1 + I(\neg\alpha) + I(\neg\alpha)I(\beta)$$

Entonces (sumando):

$$0 = I(\neg\alpha \rightarrow \neg\beta) + I(\neg\alpha \rightarrow \beta) = I(\neg\alpha)(I(\neg\beta) + I(\beta)) \stackrel{(*)}{=} I(\neg\alpha)$$

Donde en (\*) hemos usado que  $I(\neg\beta) = 1 + I(\beta) \implies I(\neg\beta) + I(\beta) = 1$ .

Como  $I(\neg\alpha) = 0$ , se tiene que  $I(\alpha) = 1$ , como queríamos demostrar.

**Definición 1.6.** Sea  $\Gamma$  un conjunto de proposiciones, decimos que  $\Gamma$  es **inconsistente** si para toda interpretación  $I$  existe  $\gamma \in \Gamma$  de forma que  $I(\gamma) = 0$ .

**Proposición 1.3.** Sea  $\Gamma \cup \{\alpha\}$  un conjunto de proposiciones, equivalen:

1.  $\Gamma \models \alpha$ .
2.  $\Gamma \cup \{\neg\alpha\}$  es inconsistente.

*Demostración.* Demostramos las dos implicaciones:

1)  $\implies$  2) Sea  $I$  una interpretación:

- Si existe un  $\gamma \in \Gamma$  de forma que  $I(\gamma) = 0$ , entonces  $\Gamma$  es inconsistente, de donde  $\Gamma \cup \{\neg\alpha\}$  también lo es.
- Si  $I(\gamma) = 1$  para cualquier  $\gamma \in \Gamma$ , aplicando que  $\Gamma \models \alpha$  deducimos que  $I(\alpha) = 1 \implies I(\neg\alpha) = 1 + I(\alpha) = 0$ , por lo que  $\Gamma \cup \{\neg\alpha\}$  es inconsistente.

2)  $\implies$  1) Sea  $I$  una interpretación de forma que  $I(\gamma) = 1$  para cualquier  $\gamma \in \Gamma$ , como  $\Gamma \cup \{\neg\alpha\}$  es inconsistente, deducimos que  $I(\neg\alpha) = 0$ , luego  $I(\alpha) = 1$ .  $\square$

## 1.2. Demostraciones

**Definición 1.7** (Demostración). Sean  $\mathcal{A}$  y  $\Gamma \cup \{p\}$  dos conjuntos de proposiciones (nos referiremos al conjunto  $\mathcal{A}$  como “conjunto de axiomas” y a  $\Gamma$  como “conjunto de hipótesis”), una demostración de  $p$  a partir de  $\Gamma$  (notado por  $\Gamma \vdash p$ ) es una secuencia de proposiciones  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$  de forma que  $\alpha_n = p$  y se verifica para todo  $i$  menor o igual que  $n$ :

- bien  $\alpha_i \in \mathcal{A} \cup \Gamma$ .
- bien existen  $j, k$  naturales con  $j < k < i$  siendo  $\alpha_k = \alpha_j \rightarrow \alpha_i$ .

En este caso, diremos que se tiene  $\alpha_i$  por modus ponens de  $j$  y  $k$ .

**Notación.** Si  $p$  es una proposición de forma que  $\emptyset \vdash p$ , podremos notar  $\vdash p$  y diremos que  $p$  es un teorema.

**Ejemplo.** Como ejemplo de demostración, veamos que  $\{\alpha, \alpha \rightarrow \beta\} \vdash \beta$  (regla conocida como “Modus ponens”). Para ello, consideramos:

$$\begin{aligned}\alpha_1 &= \alpha \\ \alpha_2 &= \alpha \rightarrow \beta \\ \alpha_3 &= \beta\end{aligned}$$

Como vemos, es una demostración de  $\beta$  a partir de  $\{\alpha, \alpha \rightarrow \beta\}$  porque  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  son proposiciones,  $\alpha_3 = \beta$  y:

- $\alpha_1 \in \Gamma$ .
- $\alpha_2 \in \Gamma$ .
- $1, 2 < 3$  y  $\alpha_2 = \alpha_1 \rightarrow \alpha_3$ .

**Notación.** Para abreviar las demostraciones, a partir de ahora no daremos una secuencia numerada de proposiciones  $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ , sino que numeraremos los pasos de la demostración y entenderemos que para formalizarla totalmente debemos coger como  $\alpha_i$  el paso  $i$ -ésimo de la demostración.

Más aún, para no pararnos a comprobar las condiciones abstractas que han de cumplir cada una de las propiedades de la demostración, incluiremos junto a los pasos de la demostración un comentario sobre por qué dicho paso es válido.

Con esta notación, la demostración de  $\{\alpha, \alpha \rightarrow \beta\} \vdash \beta$  quedaría de la forma:

1.  $\alpha$  es una hipótesis.
2.  $\alpha \rightarrow \beta$  es una hipótesis.
3.  $\beta$  por Modus Ponens de 1 y 2.

Finalmente, como conjunto  $\mathcal{A}$  de axiomas, consideraremos:

$$\mathcal{A} = \mathcal{A}_1 \cup \mathcal{A}_2 \cup \mathcal{A}_3$$

Con:

$$\begin{aligned}\mathcal{A}_1 &= \{\alpha \rightarrow (\beta \rightarrow \alpha) : \alpha, \beta \text{ son proposiciones}\} \\ \mathcal{A}_2 &= \{(\alpha \rightarrow (\beta \rightarrow \gamma)) \rightarrow ((\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow (\alpha \rightarrow \gamma)) : \alpha, \beta, \gamma \text{ son proposiciones}\} \\ \mathcal{A}_3 &= \{(\neg\alpha \rightarrow \neg\beta) \rightarrow ((\neg\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow \alpha) : \alpha, \beta \text{ son proposiciones}\}\end{aligned}$$

**Ejemplo.** Ejemplos de algunas demostraciones:

- $\{\alpha\} \vdash \beta \rightarrow \alpha$ 
  1.  $\alpha \rightarrow (\beta \rightarrow \alpha) \in \mathcal{A}_1$
  2.  $\alpha$  es una hipótesis

3.  $\beta \rightarrow \alpha$  Modus ponens de 1 y 2.

■  $\vdash \alpha \rightarrow \alpha$

1.  $(\alpha \rightarrow ((\alpha \rightarrow \alpha) \rightarrow \alpha)) \rightarrow ((\alpha \rightarrow (\alpha \rightarrow \alpha)) \rightarrow (\alpha \rightarrow \alpha)) \in \mathcal{A}_2$

2.  $\alpha \rightarrow ((\alpha \rightarrow \alpha) \rightarrow \alpha) \in \mathcal{A}_1$

3.  $(\alpha \rightarrow (\alpha \rightarrow \alpha)) \rightarrow (\alpha \rightarrow \alpha)$  Modus ponens de 1 y 2

4.  $\alpha \rightarrow (\alpha \rightarrow \alpha) \in \mathcal{A}_1$

5.  $\alpha \rightarrow \alpha$  Modus ponens de 3 y 4

**Teorema 1.4** (de Herbrand o de la deducción). *Sea  $\Gamma \cup \{\alpha, \beta\}$  un conjunto de proposiciones, equivalen:*

1.  $\Gamma \vdash \alpha \rightarrow \beta$

2.  $\Gamma \cup \{\alpha\} \vdash \beta$

*Demostración.* Demostramos las dos implicaciones:

1)  $\implies$  2) Como  $\Gamma \vdash \alpha \rightarrow \beta$ , podemos construir una demostración de  $n$  pasos de la proposición  $\alpha \rightarrow \beta$  a partir de  $\Gamma$ . En cuyo caso, podemos añadir 2 pasos más a su demostración, de forma que:

1. ...  
 $\vdots$

$n$ .  $\alpha \rightarrow \beta$

$n + 1$ .  $\alpha$  es hipótesis

$n + 2$ .  $\beta$  por Modus ponens de  $n$  y  $n + 1$

Como en los  $n$  primeros pasos solo hemos usado como hipótesis  $\Gamma$ , hemos conseguido demostrar en  $n + 2$  pasos que  $\Gamma \cup \{\alpha\} \vdash \beta$ .

2)  $\implies$  1) Como  $\Gamma \cup \{\alpha\} \vdash \beta$ , podemos obtener una demostración  $\beta$  a partir de  $\Gamma \cup \{\alpha\}$  de  $n$  pasos:  $\beta_1, \dots, \beta_n$  (con  $\beta_n = \beta$ ). Por inducción sobre  $n$  (el número de pasos de la demostración):

■ Si  $n = 1$ : Como  $\Gamma \cup \{\alpha\} \vdash \beta$  gracias a la demostración  $\beta_1 = \beta$ , distinguimos casos:

(a)  $\beta_1 \in \mathcal{A}$ . En dicho caso, podemos considerar la demostración:

1.  $\beta_1 \in \mathcal{A}$

2.  $\beta_1 \rightarrow (\alpha \rightarrow \beta_1) \in \mathcal{A}_1$

3.  $\alpha \rightarrow \beta_1$  por Modus ponens de 1 y 2

Y con esto tenemos que  $\Gamma \vdash \alpha \rightarrow \beta$ .

(b)  $\beta_1 \in \Gamma$ . En dicho caso, podemos considerar una demostración similar al caso anterior:

1.  $\beta_1 \in \Gamma$

2.  $\beta_1 \rightarrow (\alpha \rightarrow \beta_1) \in \mathcal{A}_1$

3.  $\alpha \rightarrow \beta_1$  por Modus ponens de 1 y 2

Y con esto también tenemos que  $\Gamma \vdash \alpha \rightarrow \beta$ .

(c)  $\beta_1 = \alpha$ . En dicho caso, podemos copiar la demostración de  $\vdash \beta \rightarrow \beta$  del ejemplo anterior, llegando a que  $\Gamma \vdash \alpha \rightarrow \beta$ .

- En el paso de inducción, supuesto que de  $\Gamma \cup \{\alpha\} \vdash \beta_m$  podemos deducir que  $\Gamma \vdash \alpha \rightarrow \beta_m$  para todo  $m \leq n$ , suponemos ahora que  $\Gamma \cup \{\alpha\} \vdash \beta_{n+1}$  y queremos ver que  $\Gamma \vdash \alpha \rightarrow \beta_{n+1}$ .

En dicho caso, supuesto que  $\beta_{m+1} \notin \mathcal{A} \cup \Gamma \cup \{\alpha\}$  (ya que si no la demostración es análoga al caso  $n = 1$ ), la única posibilidad es que hayan de existir  $i, j < n + 1$  con  $\beta_i = \gamma$  y  $\beta_j = \gamma \rightarrow \beta_{m+1}$ .

Si ahora consideramos los  $i$  primeros pasos de la demostración, tenemos que  $\Gamma \cup \{\alpha\} \vdash \gamma$  y si consideramos los  $j$  primeros pasos, tenemos que  $\Gamma \cup \{\alpha\} \vdash \gamma \rightarrow \beta_{n+1}$ . Por hipótesis de inducción, como  $i, j < n + 1$ , tenemos que  $\Gamma \vdash \alpha \rightarrow \gamma$  y que  $\Gamma \vdash \alpha \rightarrow (\gamma \rightarrow \beta_{n+1})$ . En este momento, podemos realizar la demostración (con hipótesis  $\Gamma$ ):

1. ...
- ⋮
- $p$ .  $\alpha \rightarrow \gamma$
- $p + 1$ . ...
- ⋮
- $q$ .  $\alpha \rightarrow (\gamma \rightarrow \beta_{n+1})$
- $q + 1$ .  $(\alpha \rightarrow (\gamma \rightarrow \beta_{n+1})) \rightarrow ((\alpha \rightarrow \gamma) \rightarrow (\alpha \rightarrow \beta_{n+1})) \in \mathcal{A}_2$
- $q + 2$ .  $(\alpha \rightarrow \gamma) \rightarrow (\alpha \rightarrow \beta_{n+1})$  por Modus ponens de  $q$  y  $q + 1$ .
- $q + 3$ .  $\alpha \rightarrow \beta_{n+1}$  por Modus ponens de  $p$  y  $q + 2$ .

□

### 1.2.1. Resultados útiles a la hora de realizar demostraciones

**Proposición 1.5** (Regla de reducción al absurdo clásica). *Sea  $\Gamma \cup \{\alpha, \beta\}$  un conjunto de proposiciones: si  $\Gamma \cup \{\neg\alpha\} \vdash \beta$  y  $\Gamma \cup \{\neg\alpha\} \vdash \neg\beta$ , entonces  $\Gamma \vdash \alpha$ .*

*Demostración.* Supuesto que  $\Gamma \cup \{\neg\alpha\} \vdash \beta$  y que  $\Gamma \cup \{\neg\alpha\} \vdash \neg\beta$ , por el Teorema de Herbrand (1.4), se tiene que  $\Gamma \vdash \neg\alpha \rightarrow \beta$  y que  $\Gamma \vdash \neg\alpha \rightarrow \neg\beta$ . En dicho caso:

1. ...
- ⋮
- $p$ .  $\neg\alpha \rightarrow \neg\beta$
- $p + 1$ . ...
- ⋮
- $q$ .  $\neg\alpha \rightarrow \beta$
- $q + 1$ .  $(\neg\alpha \rightarrow \neg\beta) \rightarrow ((\neg\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow \alpha) \in \mathcal{A}_3$

$q + 2$ .  $((\neg\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow \alpha)$  por Modus ponens de  $q + 1$  y  $p$ .

$q + 3$ .  $\alpha$  por Modus ponens de  $q + 2$  y  $q$ .

Como desde el paso 1 hasta el  $q$  solo hemos usado como hipótesis  $\Gamma$ , deducimos que  $\Gamma \vdash \alpha$ . □

**Proposición 1.6** (Leyes de silogismo o transitividad de la flecha). *Sean  $\alpha$ ,  $\beta$  y  $\gamma$  proposiciones, se verifican:*

1.  $\vdash (\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow ((\beta \rightarrow \gamma) \rightarrow (\alpha \rightarrow \gamma))$
2.  $\vdash (\beta \rightarrow \gamma) \rightarrow ((\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow (\alpha \rightarrow \gamma))$

*Demostración.* Demostraremos la primera y dejamos la segunda como ejercicio. Para ello, aplicando el Teorema de Herbrand 3 veces, llegamos a que 1 es equivalente a ver que:

$$\{\alpha \rightarrow \beta, \beta \rightarrow \gamma, \alpha\} \vdash \gamma$$

Para ello, nos sirve con la demostración:

1.  $\alpha \rightarrow \beta$  es una hipótesis
2.  $\alpha$  es una hipótesis
3.  $\beta$  por Modus ponens de 1 y 2
4.  $\beta \rightarrow \gamma$  es una hipótesis
5.  $\gamma$  por Modus ponens de 3 y 4

□

**Corolario 1.6.1** (Regla del silogismo). *Sea  $\Gamma \cup \{\alpha, \beta\}$  un conjunto de proposiciones, si  $\Gamma \vdash \alpha \rightarrow \beta$  y  $\Gamma \vdash \beta \rightarrow \gamma$ , entonces  $\Gamma \vdash \alpha \rightarrow \gamma$ .*

**Proposición 1.7** (Ley de conmutación de premisas). *Sean  $\alpha$ ,  $\beta$  y  $\gamma$  proposiciones:*

$$\vdash (\alpha \rightarrow (\beta \rightarrow \gamma)) \rightarrow (\beta \rightarrow (\alpha \rightarrow \gamma))$$

*Demostración.* Aplicando el Teorema de Herbrand 3 veces, es equivalente a ver que:

$$\{\alpha \rightarrow (\beta \rightarrow \gamma), \beta, \alpha\} \vdash \gamma$$

Para ello, nos sirve con:

1.  $\alpha \rightarrow (\beta \rightarrow \gamma)$  es una hipótesis
2.  $\alpha$  es una hipótesis
3.  $\beta \rightarrow \gamma$  por Modus ponens de 1 y 2
4.  $\beta$  es una hipótesis
5.  $\gamma$  por Modus ponens de 3 y 4

□

**Corolario 1.7.1** (Regla de conmutación de premisas). *Sea  $\Gamma \cup \{\alpha, \beta, \gamma\}$  un conjunto de proposiciones, si  $\Gamma \vdash \alpha \rightarrow (\beta \rightarrow \gamma)$ , entonces  $\Gamma \vdash \beta \rightarrow (\alpha \rightarrow \gamma)$ .*

**Proposición 1.8** (Ley de la doble negación). *Sea  $\alpha$  una proposición:*

$$\vdash \neg\neg\alpha \rightarrow \alpha$$

*Demostración.* Por el Teorema de Herbrand, es equivalente a ver que  $\{\neg\neg\alpha\} \vdash \alpha$ . Para ello, usamos la regla de la reducción al absurdo clásica, ya que:

1.  $\{\neg\neg\alpha, \neg\alpha\} \vdash \neg\neg\alpha$
2.  $\{\neg\neg\alpha, \neg\alpha\} \vdash \neg\alpha$

Luego concluimos que  $\{\neg\neg\alpha\} \vdash \alpha$ . □

**Proposición 1.9** (Ley débil de la doble negación). *Sea  $\alpha$  una proposición:*

$$\vdash \alpha \rightarrow \neg\neg\alpha$$

*Demostración.* Por el Teorema de Herbrand, es equivalente a ver que  $\{\alpha\} \vdash \neg\neg\alpha$ . Para ello, usamos la regla de la reducción al absurdo clásica, con lo que partimos que  $\{\alpha, \neg\neg\alpha\}$  y tenemos que demostrar una proposición y su negación. Para ello:

1.  $\neg\neg\alpha \rightarrow \neg\alpha$  por la ley de la doble negación
2.  $\neg\neg\alpha$  es una hipótesis
3.  $\neg\alpha$  por Modus ponens de 1 y 2
4.  $\alpha$  es una hipótesis

Concluimos por la regla de la reducción al absurdo que  $\{\alpha\} \vdash \neg\neg\alpha$ . □

### 1.3. Teoremas de coherencia y adecuación

A lo largo de este capítulo hemos manejado en los lenguajes proposicionales dos conceptos fundamentales: las tautologías ( $\models \alpha$ ), relacionadas con las interpretaciones; y los teoremas ( $\vdash \alpha$ ), relacionados con las demostraciones. Las primeras tienen un gran interés en informática y ciencias de la computación, gracias a las consecuencias semánticas que podemos realizar de forma automática, tal y como vimos con el Algoritmo de Davis & Putnam. Por otra parte, las segundas tienen un gran interés matemático, por ser la principal herramienta que sustentan todo el conocimiento matemático. Veremos ahora dos teoremas que nos permiten relacionar las tautologías con los teoremas, de gran importancia en los lenguajes de primer orden.

**Teorema 1.10** (de coherencia). *Sea  $\alpha$  una proposición, si  $\vdash \alpha$ , entonces  $\models \alpha$ . Es decir, todo teorema es una tautología.*

*Demostración.* Si  $\alpha$  es un teorema, por definición este tendrá una demostración de  $n$  pasos  $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ :

- $\alpha_1$  será un axioma y anteriormente probamos que todo axioma era una tautología.
- A  $\alpha_2$  le ocurrirá lo mismo.
- $\alpha_i$  para  $i \geq 3$  podrá ser un axioma, en cuyo caso ya sabemos cómo proceder o resultado de aplicar modus ponens sobre dos pasos anteriores. Sin embargo, anteriormente vimos que si  $a$  y  $a \rightarrow b$  eran tautologías, entonces  $b$  era una tautología, por lo que  $\alpha_i$  será una tautología.

Finalmente, llegaremos a  $\alpha_n = \alpha$ , con lo que podemos concluir que  $\alpha$  es una tautología. □

Y además la otra implicación también es cierta, aunque su demostración excede los objetivos del curso.

**Teorema 1.11** (de adecuación). *Sea  $\alpha$  una proposición, si  $\models \alpha$ , entonces  $\vdash \alpha$ . Es decir, toda tautología es un teorema.*

## 2. Lógica de Primer Orden

Es necesario introducir ahora lenguajes en los que podamos cuantificar cosas. Como primer ejemplo, si sabemos que “Todo hombre es mortal” y que “Sócrates es un hombre”, nos gustaría deducir que, entonces, “Sócrates es mortal”. Sin embargo, para esto hemos de poder cuantificar, cosa que no es posible con los lenguajes proposicionales pero sí con los lenguajes de primer orden.

Los lenguajes de primer orden estarán formados por:

- Constantes:  $c_1, c_2, \dots, a, b, c, \dots$
- Variables:  $x_1, x_2, \dots, x, y, z, \dots$
- Símbolos de función:  $f_1, f_2, \dots, f, g, h, \dots$
- Símbolos de relación:  $R_1, R_2, \dots, R, S, T, \dots$
- Conectivas lógicas:  $\vee, \wedge, \neg, \rightarrow, \leftrightarrow$
- Cuantificadores:  $\forall, \exists$

A los conjuntos de todas las constantes, de todas las variables y de todos los símbolos de función los notaremos por  $Cons(\mathcal{L}), Var(\mathcal{L}), Fun(\mathcal{L})$ , si  $\mathcal{L}$  es nuestro lenguaje de primer orden.

**Notación.** En otros libros o contextos, en vez de denotar a los símbolos de función o variables con una letra que pueda llevar o no superíndice, estos las denotan con un superíndice:

- $f_1^{n_1}, f_2^{n_2}, \dots$
- $R_1^{m_1}, R_2^{m_2}, \dots$

En este caso, el superíndice indica la aridad de la función o relación. Por ejemplo, si consideramos  $f^3$ , tenemos un símbolo de función que se aplica a 3 variables.

**Definición 2.1** (Término). Un término es:

1. Cualquier constante.
2. Cualquier variable.
3. Si  $t_1, t_2, \dots, t_n$  son términos y  $f$  es un símbolo de función  $n$ -ario, entonces  $f(t_1, t_2, \dots, t_n)$  es un término.

4. No hay más términos que los que se puedan obtener siguiendo una secuencia finita de pasos a partir de las enunciadas.

Al conjunto de todos los términos de nuestro lenguaje  $\mathcal{L}$  lo denotamos por  $Term(\mathcal{L})$ .

**Ejemplo.**

- $f(x, f(x, y))$  es un término.
- $f(x, f(x))$  no es un término, ya que usamos un mismo símbolo de función,  $f$ , para denotar dos objetos: una función unaria y una función binaria.

**Definición 2.2** (Fórmulas atómicas). Si  $t_1, \dots, t_n$  son términos y  $R$  es un símbolo de relación  $n$ -ario, entonces  $R(t_1, \dots, t_n)$  es una fórmula atómica (o simplemente, un átomo).

**Definición 2.3** (Fórmulas). Son fórmulas:

1. Las fórmulas atómicas.
2. Si  $\varphi$  y  $\psi$  son fórmulas, también lo son:

$$\neg\varphi, \varphi \wedge \psi, \varphi \vee \psi, \varphi \rightarrow \psi, \varphi \leftrightarrow \psi$$

3. Si  $x$  es una variable y  $\varphi$  es una fórmula, también lo son:  $\forall x\varphi, \exists x\varphi$ .
4. No hay más fórmulas que las que se puedan obtener siguiendo una secuencia finita de pasos a partir de las enunciadas.

Al conjunto de todas las fórmulas de nuestro lenguaje  $\mathcal{L}$  lo denotamos por  $Form(\mathcal{L})$ .

**Definición 2.4.** Una ocurrencia de una variable en una fórmula es una aparición de su escritura.

- En la fórmula  $\forall x\varphi$ , diremos que  $\varphi$  es el radio de acción de  $\forall x$ .
- En la fórmula  $\exists x\varphi$ , diremos que  $\varphi$  es el radio de acción de  $\exists x$ .

Diremos que  $x$  se encuentra cuantificada al ver  $\forall x$  o  $\exists x$ .

Diremos que una ocurrencia de una variable  $x$  es ligada si aparece cuantificada o en el radio de acción de  $\forall x$  o de  $\exists x$ .

Finalmente, diremos que una variable es libre si no aparece ligada. Si  $\varphi$  es una fórmula en la que las variables  $x_1, \dots, x_n$  aparecen libres, será usual denotar:

$$\varphi(x_1, \dots, x_n)$$

Que no debe confundirse con un término de una función o relación  $n$ -aria, ya que  $\varphi$  no es ni un símbolo de función o relación, sino una fórmula.

**Ejemplo.** En la siguiente fórmula:

$$\forall x(\exists yR(x, y) \rightarrow Q(y))$$

- $x$  aparece cuantificada en su primera ocurrencia.

- $y$  aparece cuantificada en su primera ocurrencia.
- $x$  aparece ligada en su segunda ocurrencia.
- $y$  aparece ligada en su segunda ocurrencia.
- $y$  aparece como variable libre en su tercera ocurrencia.

**Definición 2.5** (Sentencia). Una sentencia es una fórmula sin ocurrencias de variables libres.

## 2.1. Semántica

Trataremos de generalizar el concepto de “interpretación”, ya visto para lenguajes proposicionales. Para ello, será necesario primero definir los conceptos de “estructura” y de “asignación”.

**Definición 2.6** (Estructura). Una estructura  $\varepsilon$  en un lenguaje  $\mathcal{L}$  es una cuádrupla

$$\varepsilon = (D, \{c_i^\varepsilon\}_{n \in \mathbb{N}}, \{f_i^\varepsilon\}_{n \in \mathbb{N}}, \{R_i^\varepsilon\}_{n \in \mathbb{N}})$$

de forma que:

- $D$  es un conjunto no vacío al que llamamos universo o dominio.
- A cada constante  $c_i$  de  $\mathcal{L}$  le corresponde un elemento  $c_i^\varepsilon$  de  $D$ .
- A cada símbolo de función  $f_i$  de  $\mathcal{L}$  le corresponde una función  $f_i^\varepsilon : D^n \rightarrow D$ .
- A cada símbolo de relación  $R_i$  de  $\mathcal{L}$  le corresponde una aplicación  $R_i^\varepsilon : D^m \rightarrow \mathbb{Z}_2$ , de forma que  $R_i^\varepsilon(c_1^\varepsilon, c_2^\varepsilon) = 1$  si  $c_1^\varepsilon$  y  $c_2^\varepsilon$  están relacionados y 0 en caso contrario.

**Definición 2.7** (Asignación). Una asignación  $v$  en  $\varepsilon$  es una aplicación  $v : Var(\mathcal{L}) \rightarrow D$ . Dada una asignación  $v$ , podremos extenderla a  $v' : Term(\mathcal{L}) \rightarrow D$  de la forma:

$$v'(t) = \begin{cases} c^\varepsilon & \text{si } t = c \text{ una constante} \\ v(x) & \text{si } t = x \text{ una variable} \\ f^\varepsilon(v'(t_1), \dots, v'(t_n)) & \text{si } t = f(t_1, \dots, t_n) \end{cases}$$

**Definición 2.8** (Interpretación). Una interpretación es una tupla  $(\varepsilon, v)$  con  $\varepsilon$  una estructura y  $v$  una asignación que tiene asociada una aplicación<sup>1</sup>  $I_\varepsilon^v : Form(\mathcal{L}) \rightarrow \mathbb{Z}_2$  que cumple para cualesquiera fórmulas  $\varphi$  y  $\psi$ :

1.  $I^v(\neg\varphi) = 1 + I^v(\varphi)$ .
2.  $I^v(\varphi \wedge \psi) = I^v(\varphi)I^v(\psi)$ .
3.  $I^v(\varphi \vee \psi) = I^v(\varphi) + I^v(\psi) + I^v(\varphi)I^v(\psi)$ .
4.  $I^v(\varphi \rightarrow \psi) = 1 + I^v(\varphi) + I^v(\varphi)I^v(\psi)$ .

<sup>1</sup>A la que próximamente denotaremos simplemente como  $I^v$ , por simplicidad, entendiendo que la estructura  $\varepsilon$  viene dada por el contexto.

$$5. I^v(\varphi \leftrightarrow \psi) = 1 + I^v(\varphi) + I^v(\psi).$$

$$6. I^v(R(t_1, \dots, t_n)) = R^e(v(t_1), \dots, v(t_n))$$

Con  $R$  un símbolo de relación  $n$ -ario y  $t_1, \dots, t_n$  términos.

$$7. I^v(\forall x\varphi) = \begin{cases} 1 & \text{si para todo } a \in D, I^{v(x|a)}(\varphi) = 1 \\ 0 & \text{en caso contrario} \end{cases}$$

$$8. I^v(\exists x\varphi) = \begin{cases} 1 & \text{si existe } a \in D \text{ con } I^{v(x|a)}(\varphi) = 1 \\ 0 & \text{en caso contrario} \end{cases}$$

Siendo:

$$v(x | a)(y) = \begin{cases} v(y) & \text{si } y \neq x \\ a & \text{si } y = x \end{cases}$$

**Definición 2.9.** Sea  $\varphi \in Form(\mathcal{L})$ :

- Dada una estructura  $\varepsilon$ , diremos que  $\varphi$  es válida en  $\varepsilon$  si  $I^v(\varphi) = 1$  para toda asignación  $v$  en  $\varepsilon$ .
- Dada una estructura  $\varepsilon$ , diremos que  $\varphi$  es satisfacible en  $\varepsilon$  si  $I^v(\varphi) = 1$  para alguna asignación  $v$  en  $\varepsilon$ .
- Diremos que  $\varphi$  es universalmente válida si  $\varphi$  es válida en cualquier estructura.
- Diremos que  $\varphi$  es satisfacible si existe una estructura  $\varepsilon$  donde  $\varphi$  es satisfacible.
- Diremos que  $\varphi$  es refutable si  $\neg\varphi$  es satisfacible.
- Diremos que  $\varphi$  es una contradicción si  $\neg\varphi$  es universalmente válida.

**Lema 2.1** (de Coincidencia). Sea  $\varphi \in Form(\mathcal{L})$  de forma que  $x_1, \dots, x_n \in Var(\mathcal{L})$  son las variables con ocurrencias libres en  $\varphi$  y sea  $\varepsilon$  una estructura. Entonces, dada una asignación  $v$  en  $\varepsilon$ :

$$I^v(\varphi) = I^w(\varphi)$$

para toda asignación  $w$  en  $\varepsilon$  tal que  $w(x_i) = v(x_i)$  para todo  $i \in \{1, \dots, n\}$ .

*Observación.* En particular, si  $\varphi$  es una sentencia, entonces  $I^v(\varphi)$  no depende de la asignación  $v$ . Por tanto, si  $\varphi$  es satisfacible en  $\varepsilon$ , entonces  $\varphi$  es válida en  $\varepsilon$ .

**Definición 2.10** (Consecuencia lógica). Sea  $\Gamma \cup \{\varphi\} \subseteq Form(\mathcal{L})$ , diremos que  $\varphi$  es consecuencia lógica de  $\Gamma$ , notado por  $\Gamma \models \varphi$ , si para toda interpretación  $(\varepsilon, v)$  tal que  $I^v(\gamma) = 1$  para toda  $\gamma \in \Gamma$ , fuerza a que  $I^v(\varphi) = 1$ .

**Teorema 2.2** (de la Deducción). Sea  $\Gamma \cup \{\varphi, \psi\} \subseteq Form(\mathcal{L})$ , son equivalentes:

1.  $\Gamma \models \varphi \rightarrow \psi$ .
2.  $\Gamma \cup \{\varphi\} \models \psi$ .

**Definición 2.11** (Inconsistencia). Sea  $\Gamma \subseteq Form(\mathcal{L})$ , diremos que  $\Gamma$  es inconsistente si no existe una interpretación  $(\varepsilon, v)$  tal que  $I^v(\gamma) = 1$  para toda  $\gamma \in \Gamma$ .

**Teorema 2.3.** Sea  $\Gamma \cup \{\varphi\} \subseteq Form(\mathcal{L})$ , son equivalentes:

1.  $\Gamma \models \varphi$ .
2.  $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$  es inconsistente.

**Ejemplo.** Demostremos las siguientes fórmulas universalmente válidas:

1.  $\models \forall x\varphi(x) \leftrightarrow \forall y\varphi(y)$  con<sup>2</sup>  $y$  libre para  $x$  en  $\varphi(x)$ .

Dada cualquier interpretación  $(\varepsilon, v)$ , queremos ver que:

$$I^v(\forall x\varphi(x) \leftrightarrow \forall y\varphi(y)) = 1$$

Y sabemos que eso es equivalente a ver que:

$$I^v(\forall x\varphi(x)) = I^v(\forall y\varphi(y))$$

Que se puede ver a partir de su definición:

$$\begin{aligned} I^v(\forall x\varphi(x)) &= \begin{cases} 1 & \text{si } I^{v(x|a)}(\varphi(x)) = 1 \text{ para todo } a \in D \\ 0 & \text{en caso contrario} \end{cases} \\ &\stackrel{(*)}{=} \begin{cases} 1 & \text{si } I^{v(y|a)}(\varphi(y)) = 1 \text{ para todo } a \in D \\ 0 & \text{en caso contrario} \end{cases} \\ &= I^v(\forall y\varphi(y)) \end{aligned}$$

Donde en (\*) debemos tener cuidado y usar que  $y$  es libre para  $x$  en  $\varphi(x)$ , ya que  $x$  aparecía libre en  $\varphi$  y como  $y$  es libre para  $x$  en  $\varphi(x)$ , al hacer la sustitución de  $x$  por  $y$  no estaremos cambiando variables libres en  $\varphi$ , por lo que a partir del Lema de Coincidencia (Lema 2.1), al no cambiar variables libres en  $\varphi$ , no cambiamos su condición de verdad.

2.  $\models \forall x\varphi(x) \rightarrow \varphi(t)$  con  $t$  libre para  $x$  en  $\varphi(x)$ .

Por el Teorema de la Deducción, probar esto es equivalente a ver que:

$$\{\forall x\varphi(x)\} \models \varphi(t)$$

Por tanto, sea  $(\varepsilon, v)$  una interpretación de forma que  $I^v(\forall x\varphi(x)) = 1$ , entonces para todo  $a \in D$ , se tendrá  $I^{v(x|a)}(\varphi(x)) = 1$ . Si tomamos  $a = v(t)$ , entonces tendremos que:

$$I^{v(x|a)}(\varphi(x)) = I^v(\varphi(t))$$

## 2.2. Demostraciones

Trataremos ahora de generalizar lo que hicimos ya para la demostraciones en el caso de los lenguajes proposicionales, para que cualquier demostración hecha con lenguajes proposicionales siga siendo válida ahora.

### 2.2.1. Definición de una demostración

En lugar de dar directamente la definición de demostración, daremos primero los axiomas de nuestro sistema y las reglas de inferencia que usaremos, para posteriormente dar la definición de demostración.

<sup>2</sup>Estamos usando una notación que se introduce en la siguiente sección.

### Axiomas

Sobre nuestro lenguaje  $\mathcal{L}$  consideraremos los 3 primeros conjuntos de axiomas, que son los que ya teníamos en lenguajes proposicionales:

$$\mathcal{A}_1 = \{\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \varphi) : \varphi, \psi \in Form(\mathcal{L})\}$$

$$\mathcal{A}_2 = \{(\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi)) \rightarrow ((\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi)) : \varphi, \psi, \chi \in Form(\mathcal{L})\}$$

$$\mathcal{A}_3 = \{(\neg\varphi \rightarrow \neg\psi) \rightarrow ((\neg\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow \varphi) : \varphi, \psi \in Form(\mathcal{L})\}$$

Ahora, será necesario considerar nuevos axiomas que nos permitan generalizar lo ya visto para lenguajes proposicionales a lenguajes de primer orden. Como el lector puede deducir, estos axiomas tendrán que contener cuantificadores, ya que es el concepto principal que introducimos en los lenguajes de primer orden. Antes de dar el cuarto axioma<sup>3</sup>, introduciremos la siguiente notación:

**Notación.** Sea  $\varphi \in Form(\mathcal{L})$  y  $x_1, \dots, x_n \in Var(\mathcal{L})$ , al notar:

$$\varphi(x_1, \dots, x_n)$$

Estamos diciendo que, si  $x_1, \dots, x_n$  son variables que aparecen en  $\varphi$ , entonces tienen todas sus ocurrencias libres en  $\varphi$ .

**Notación.** Sea  $\varphi \in Form(\mathcal{L})$ ,  $x \in Var(\mathcal{L})$  y  $t \in Term(\mathcal{L})$ , cuando aparezca:

$$“t \text{ libre para } x \text{ en } \varphi(x)”$$

Y notemos  $\varphi(t)$ , significará que estamos cambiando las ocurrencias libres de  $x$  que había en  $\varphi$  por  $t$ . Por ser  $t$  un término, este puede depender de otras variables, por lo que en este proceso no se permite que variables de  $t$  se queden ligadas, sino que deben aparecer libres.

Podemos dar ya el cuarto axioma:

$$\mathcal{A}_4 = \{\forall x\varphi(x) \rightarrow \varphi(t) \mid \varphi \in Form(\mathcal{L}), x \in Var(\mathcal{L}), t \text{ libre para } x \text{ en } \varphi(x)\}$$

Observemos que casos particulares interesantes de este axioma son:

- $\forall x\varphi \rightarrow \varphi$
- $\forall x\varphi(x) \rightarrow \varphi(x)$

Y podemos finalmente dar el quinto axioma<sup>4</sup>:

$$\mathcal{A}_5 = \{\forall x(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \forall x\psi) \mid \varphi, \psi \in Form(\mathcal{L}), x \text{ no aparece libre en } \varphi\}$$

De esta forma, nuestro conjunto de axiomas vendrá dado por:

$$\mathcal{A} = \mathcal{A}_1 \cup \mathcal{A}_2 \cup \mathcal{A}_3 \cup \mathcal{A}_4 \cup \mathcal{A}_5$$

Notemos que en estos 5 axiomas no aparecen los conectores  $\wedge$ ,  $\vee$ ,  $\leftrightarrow$  ni el cuantificador  $\exists$ . En caso de querer usarlos:

- Los conectores los expresaremos como fórmulas semánticamente equivalentes pero usando  $\neg$  y  $\rightarrow$ .
- Usaremos que  $\exists x\varphi$  es semánticamente equivalente a  $\neg\forall x\neg\varphi$ , siendo  $\varphi \in Form(\mathcal{L})$ .

<sup>3</sup>Algunos autores dividen este axioma en dos, ya que no consideran la notación que vamos a considerar para poder dar este axioma.

<sup>4</sup>Que en aquellos autores que dividen el cuarto axioma en dos, aparece como el sexto.

### Reglas de inferencia

Las reglas de inferencia que consideraremos en nuestro sistema serán las siguientes, las cuales tendremos en cuenta a la hora de realizar la definición de lo que será una demostración:

Modus ponens	Generalización
$\varphi \rightarrow \psi$	$\varphi$
$\varphi$	
-----	-----
$\psi$	$\forall x\varphi$

**Definición 2.12** (Demostración). Si consideramos el conjunto de fórmulas  $\mathcal{A}$  previamente definido y sea  $\Gamma \cup \{\varphi\} \subseteq Form(\mathcal{L})$ , una demostración de  $p$  a partir de  $\Gamma$  (notado por  $\Gamma \vdash p$ ) es una secuencia de fórmulas  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$  de forma que  $\alpha_n = p$  y se verifica para todo  $i$  menor o igual que  $n$  alguna de las tres condiciones siguientes:

- $\alpha_i \in \mathcal{A} \cup \Gamma$ .
- Existen  $j, k$  naturales con  $j < k < i$  siendo  $\alpha_k = \alpha_j \rightarrow \alpha_i$  (Modus ponens).
- Existe un natural  $j$  con  $j < i$  siendo  $\alpha_i = \forall x\alpha_j$  (Generalización).

### 2.2.2. Primeros resultados

Como primer resultado a destacar, como los lenguajes de primer orden generalizan los lenguajes proposicionales, cualquier demostración para los lenguajes proposicionales seguirán siendo válidas para los lenguajes de primer orden.

**Teorema 2.4** (de la Deducción). Sean  $\Gamma \cup \{\varphi, \psi\} \subseteq Form(\mathcal{L})$ . Si tenemos que  $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \psi$  y en su demostración no usamos la regla de generalización sobre un paso en que haya intervenido  $\varphi$  con una variable libre en  $\varphi$ , entonces:

$$\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$$

*Observación.* Ha sido necesario introducir la condición extra que no teníamos en lenguajes proposicionales ya que vamos a poder demostrar, por ejemplo,  $\{A(x)\} \vdash \forall xA(x)$ :

1.  $A(x)$  es hipótesis.
2.  $\forall xA(x)$  por generalización

Sin embargo,  $\not\vdash A(x) \rightarrow \forall xA(x)$ , ya si que si consideramos por ejemplo el dominio  $D = \mathbb{Z}_2$  y  $A$  es “ser igual a 0”, de  $A(0)$  no podemos concluir que todo elemento de  $\mathbb{Z}_2$  sea 0. Esto se debe a que semánticamente:

$$\{A(x)\} \not\vdash \forall xA(x)$$

El lector podría sospechar que la regla de generalización carece de sentido o contradice lo enunciado, pero si somos capaces de demostrar algo para un elemento  $x$  arbitrario en un cierto conjunto, entonces seremos capaces de afirmar que  $\forall x$  en dicho conjunto, tendremos la proposición conseguida para el elemento arbitrario anterior. Esta es la intuición detrás de la regla de generalización.

**Proposición 2.5.** Sean  $\Gamma \cup \{\varphi, \psi\} \subseteq \text{Form}(\mathcal{L})$ , si tenemos que  $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$ , entonces  $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \psi$ .

**Teorema 2.6** (Regla de reducción al Absurdo). Sean  $\Gamma \cup \{\varphi, \psi\} \subseteq \text{Form}(\mathcal{L})$  si tenemos que  $\Gamma \cup \{\neg\varphi\} \vdash \psi$  y  $\Gamma \cup \{\neg\varphi\} \vdash \neg\psi$  y en esas demostraciones no usamos la regla de generalización sobre un paso en el que haya intervenido  $\neg\varphi$  con una variable libre en  $\neg\varphi$ , entonces:

$$\Gamma \vdash \varphi$$

**Ejemplo.** Buscamos demostrar  $\vdash (\varphi \rightarrow \forall x\psi) \rightarrow \forall x(\varphi \rightarrow \psi)$  con  $x$  no libre en  $\varphi$ .

Buscamos demostrar con precaución<sup>5</sup> que:

$$\{\varphi \rightarrow \forall x\psi\} \vdash \forall x(\varphi \rightarrow \psi)$$

Para ello:

1.  $\varphi \rightarrow \forall x\psi$  es una hipótesis.
2.  $\forall x\psi \rightarrow \psi \in \mathcal{A}_4$
3.  $\varphi \rightarrow \psi$  por silogismo de 1 y 2.
4.  $\forall x(\varphi \rightarrow \psi)$  generalización de 3.

Como  $x$  no está libre en  $\varphi$ , tampoco lo estará en  $\varphi \rightarrow \forall x\psi$ , por lo que en esta demostración no hemos usado la regla de generalización sobre un paso en el que haya intervenido  $\varphi \rightarrow \forall x\psi$  con una variable libre en la misma, por lo que podremos aplicar el Teorema de la Deducción, obteniendo lo que queríamos probar.

### 2.3. Teoremas de adecuación y coherencia

Una parte positiva de los lenguajes de primer orden es que a pesar de ser más generales que los proposicionales, seguimos contando con los teoremas de adecuación y de coherencia:

**Teorema 2.7** (de coherencia). Sea  $\varphi \in \text{Form}(\mathcal{L})$ , si  $\vdash \varphi$ , entonces  $\models \varphi$ .

*Demostración.* La demostración es similar a la del Teorema de coherencia para lenguajes proposicionales, pero ahora hemos de tener en cuenta más axiomas, así como la regla de generalización.  $\square$

**Teorema 2.8** (de consistencia). Nuestro conjunto de axiomas  $\mathcal{A}$  junto con las reglas de inferencia es consistente, es decir, no existe  $\varphi \in \text{Form}(\mathcal{L})$  de forma que  $\vdash \varphi$  y  $\not\vdash \varphi$ .

**Teorema 2.9** (de adecuación). Sea  $\varphi \in \text{Form}(\mathcal{L})$ , si  $\models \varphi$ , entonces  $\vdash \varphi$ .

<sup>5</sup>Para poder aplicar luego el Teorema de la Deducción bajo las hipótesis correctas con la limitación extra.

## 2.4. Sistemas matemáticos

### 2.4.1. Lenguajes de Primer Orden con Igualdad

Un lenguaje de primer orden con igualdad es un lenguaje de primer orden  $\mathcal{L}$  en el que habrá un símbolo de relación destacado  $A$ .

**Notación.** Aceptaremos las siguientes notaciones con el fin de abreviar los enunciados:

1. Si  $s, t \in Term(\mathcal{L})$ , usaremos con frecuencia:

$$s = t$$

Para denotar  $A(s, t)$ .

2. En el caso de tener  $\neg(s = t)$ , podremos notar:  $s \neq t$ .
3. Usaremos  $\exists_1 x \varphi(x)$  como abreviatura de:

$$\exists x \varphi(x) \wedge \forall y (\varphi(y) \rightarrow x = y)$$

La única diferencia con los lenguajes de primer orden corrientes será que tendremos dos conjuntos de axiomas extras:

$$\mathcal{A}_6 = \{\forall x (x = x) \mid x \in Var(\mathcal{L})\}$$

Y para introducir el último axioma, hace falta introducir más notación:

**Notación.** Sea  $\varphi \in Form(\mathcal{L})$ , y  $x, y \in Var(\mathcal{L})$ , si notamos  $\varphi(x, y)$  tras notar  $\varphi(x, x)$ , significará que estamos reemplazando algunas ocurrencias libres de  $x$  por  $y$  en la fórmula  $\varphi$ .

El último axioma será:

$$\mathcal{A}_7 = \{(x = y) \rightarrow (\varphi(x, x) \rightarrow \varphi(x, y)) \mid x, y \in Var(\mathcal{L})\}$$

*Observación.* Notemos que con dos conjuntos de axiomas que hemos añadido, tenemos que “=” es una relación de equivalencia:

- $\mathcal{A}_6$  nos da la relación reflexiva.
- De  $\mathcal{A}_7$  deducimos la simétrica y la transitiva.

Sin embargo, “=” es mucho más que eso, ya que de  $\mathcal{A}_7$  no solo deducimos esas propiedades, sino muchas más, tal y como vemos en el siguiente ejemplo.

**Ejemplo.** Demostraremos que:

$$\vdash (x = y) \rightarrow (f(t_1, \dots, x, \dots, t_n) = f(t_1, \dots, y, \dots, t_n))$$

Para ello, bastará demostrar con cuidado que:

$$\{x = y\} \vdash f(t_1, \dots, x, \dots, t_n) = f(t_1, \dots, y, \dots, t_n)$$

1.  $\forall x(x = x) \in \mathcal{A}_6$
2.  $\forall x(x = x) \rightarrow f(t_1, \dots, x, \dots, t_n) = f(t_1, \dots, x, \dots, t_n) \in \mathcal{A}_4$
3.  $f(t_1, \dots, x, \dots, t_n) = f(t_1, \dots, x, \dots, t_n)$  por modus ponens de 1 y 2.
4.  $(x = y) \rightarrow ((f(t_1, \dots, x, \dots, t_n) = f(t_1, \dots, x, \dots, t_n)) \rightarrow$   
 $\rightarrow (f(t_1, \dots, x, \dots, t_n) = f(t_1, \dots, y, \dots, t_n))) \in \mathcal{A}_7$
5.  $x = y$  es hipótesis.
6.  $(f(t_1, \dots, x, \dots, t_n) = f(t_1, \dots, x, \dots, t_n)) \rightarrow (f(t_1, \dots, x, \dots, t_n) = f(t_1, \dots, y, \dots, t_n))$   
 por modus ponens de 4 y 5.
7.  $f(t_1, \dots, x, \dots, t_n) = f(t_1, \dots, y, \dots, t_n)$  por modus ponens de 3 y 6.

Como no hemos usado ningún paso de generalización, podemos aplicar el Teorema de la Deducción, obteniendo lo que queríamos probar.

### 2.4.2. Aritmética de Primer Orden

En aritmética de primer orden, consideraremos un lenguaje de primer orden  $\mathcal{L}$ , que tendrá:

- Variables.
- Una sola constante, que denotaremos por 0.
- Tres símbolos de función, que denotaremos por<sup>6</sup>  $s$ ,  $+$  y  $\cdot$ .
- Un símbolo de relación que denotaremos por  $=$ .

En aritméticas de primer orden, consideraremos como axiomas  $\mathcal{A}_1, \dots, \mathcal{A}_7$ , junto con los siguientes:

$$\begin{aligned} \mathcal{N}_1 &= \{\forall x(s(x) \neq 0) : x \in Var(\mathcal{L})\} \\ \mathcal{N}_2 &= \{\forall x \forall y(s(x) = s(y) \rightarrow x = y) : x, y \in Var(\mathcal{L})\} \\ \mathcal{N}_3 &= \{\forall x(x + 0 = x) : x \in Var(\mathcal{L})\} \\ \mathcal{N}_4 &= \{\forall x \forall y(x + s(y) = s(x + y)) : x, y \in Var(\mathcal{L})\} \\ \mathcal{N}_5 &= \{\forall x(x \cdot 0 = 0) : x \in Var(\mathcal{L})\} \\ \mathcal{N}_6 &= \{\forall x \forall y(x \cdot s(y) = x \cdot y + x) : x, y \in Var(\mathcal{L})\} \\ \mathcal{N}_7 &= \{\varphi(0) \rightarrow (\forall x(\varphi(x) \rightarrow \varphi(s(x))) \rightarrow \forall x \varphi(x)) : \varphi(x) \in Form(\mathcal{L})\} \end{aligned}$$

La aritmética de primer orden funcionará bien cuando pensemos que estamos en un dominio similar a  $\mathbb{N}$ . Pensando esto, los axiomas  $\mathcal{N}_i$  conviene entenderlos como:

1.  $\mathcal{N}_1$  y  $\mathcal{N}_2$  definen cómo funciona la función  $s$ , que podemos entender por “siguiente”.

---

<sup>6</sup>Y entenderemos que  $\cdot$  tiene mayor prioridad de  $+$ .

2.  $\mathcal{N}_3$  y  $\mathcal{N}_4$  definen de forma inductiva la operación  $+$ .
3.  $\mathcal{N}_5$  y  $\mathcal{N}_6$  definen de forma inductiva la operación  $\cdot$ .
4.  $\mathcal{N}_7$  es una versión más débil del principio de inducción.

Decimos que  $\mathcal{N}_7$  es una versión más débil del principio de inducción porque el principio de inducción (en matemáticas) es el siguiente:

**Proposición 2.10.** *Sea  $A \subseteq \mathbb{N}$ , si  $0 \in A$  y siempre que  $n \in A \implies n + 1 \in A$ , entonces  $A = \mathbb{N}$ .*

Donde hacemos una afirmación sobre cualquier subconjunto de  $\mathbb{N}$ , por lo que estamos considerando elementos dentro de un conjunto no numerable de elementos (el conjunto de todos los subconjuntos de  $\mathbb{N}$ , que no es numerable). Esta idea no se puede expresar en lenguajes de primer orden, por tener solo un conjunto numerable de fórmulas.

### 2.4.3. Teoría de conjuntos (de Zermelo-Fraenkel)

La teoría de conjuntos es un lenguaje de primer orden donde:

- No tenemos constantes ni símbolos de función, por lo que los únicos términos que podremos considerar son las variables.
- Como relaciones solo tendremos dos, que denotaremos por  $\in$  y  $=$  (y usaremos  $\notin$  y  $\neq$  como sus respectivas negaciones).

**Notación.** Dados  $t, s \in Term(\mathcal{L})$ , usaremos  $t \subseteq s$  como abreviatura de:

$$\forall x(x \in t \rightarrow x \in s)$$

En este contexto, consideraremos como axiomas  $\mathcal{A}_1, \dots, \mathcal{A}_7$ , junto con los siguientes (entendiendo que todo lo que sale son variables):

$$\begin{aligned} ZF_1 &= \{x = y \leftrightarrow \forall z(z \in x \leftrightarrow z \in y)\} \\ ZF_2 &= \{\exists x \forall y (y \notin x)\} \\ ZF_3 &= \{\forall x \forall y \exists z \forall u (u \in z \leftrightarrow (u = x \vee u = y))\} \\ ZF_4 &= \{\forall x \exists y \forall z (z \in y \leftrightarrow \exists u (u \in x \wedge z \in u))\} \\ ZF_5 &= \{\forall x \exists y \forall z (z \in y \leftrightarrow z \subseteq x)\} \\ ZF_6 &= \{\forall x_1 \exists_1 x_2 \varphi(x_1, x_2) \rightarrow \forall x_3 \exists_3 x_4 \forall x_5 (x_5 \in x_4 \leftrightarrow \exists x_6 (x_6 \in x_3 \wedge \varphi(x_6, x_5)))\} \\ ZF_7 &= \{\exists x (\emptyset \in x \wedge \forall y (y \in x \rightarrow y \cup \{y\} \in x))\} \\ ZF_8 &= \{\forall x (x \neq \emptyset \rightarrow \exists y (y \in x \wedge \neg \exists z (z \in x \wedge z \in y)))\} \end{aligned}$$

Las variables recibirán usualmente el nombre de “conjuntos” o “elementos” y una forma de entender mejor estos axiomas es la siguiente:

1.  $ZF_1$  recibe el nombre de “extensionalidad” y puede entenderse como una condición de cuándo dos conjuntos son iguales.

2.  $ZF_2$  afirma la existencia de un conjunto sin elementos.

A partir de  $ZF_1$  y  $ZF_2$  puede demostrarse que aquel conjunto sin elementos es único. Por tanto, a partir de ahora nos referiremos a este único conjunto por  $\emptyset$ , y le llamaremos “conjunto vacío”. De esta forma,  $ZF_2$  recibe el nombre de “existencia del conjunto vacío”.

3.  $ZF_3$  recibe el nombre de “emparejamiento”, y afirma que dados dos conjuntos  $x$  e  $y$ , podemos considerar  $z$ , el conjunto formado por estos dos elementos:  $\{x, y\}$ . En el caso  $\{x, x\}$ , notaremos simplemente  $\{x\}$ .
4.  $ZF_4$  nos dice que siempre que tengamos un conjunto  $x$ , existirá un conjunto  $y$  que contendrá todos aquellos elementos que están en algún conjunto de  $x$ . De esta forma, podemos pensar en  $ZF_4$  como en la existencia de las uniones arbitrarias de conjuntos. Si consideramos la unión de un conjunto  $x$ , podremos denotarlo por:

$$\bigcup x$$

Y cuando tengamos dos conjuntos  $t$  y  $s$ , podremos denotar:

$$t \cup s = \bigcup \{t, s\}$$

5.  $ZF_5$  recibe el nombre de “conjunto potencia” y afirma que dado un conjunto  $x$ , existe un conjunto  $y$  que contiene todos aquellos conjuntos que sean subconjuntos de  $x$ . Este conjunto  $y$  recibirá usualmente el nombre de  $\mathcal{P}(x)$ .
6.  $ZF_6$  recibe el nombre de “esquema de reemplazo” y nos permite definir funciones mediante la regla  $\varphi(x_1, x_2)$ : dado cualquier  $x_1$ , existirá un único  $x_2$  de forma que se tenga  $\varphi(x_1, x_2)$ . En cuyo caso, podremos considerar el conjunto imagen de un conjunto por dicha aplicación:

Si pensamos en  $x_3$  como un subconjunto del dominio de la aplicación, entonces existirá un  $x_4$  (imagen de  $x_3$  por la aplicación), y este verificará que un elemento está en él si y solo si hay un elemento de  $x_3$  que se aplicaba en él.

7.  $ZF_7$  recibe el nombre de “axioma del infinito”, y es que afirma la existencia de un conjunto  $x$  que contiene a  $\emptyset$  y es infinito.
8.  $ZF_8$  recibe el nombre de “axioma de regularidad”, y viene a decir que dada conjunto no vacío  $x$  contiene un elemento  $y$  que es disjunto con el propio  $x$  (es decir, que cualquier conjunto no vacío contiene un elemento que no comparte ningún elemento con el propio conjunto no vacío de partida).

Este axioma nos permite no caer en cadenas infinitas de pertenencias. Por ejemplo, si tuviéramos dos conjuntos  $x$  e  $y$  de forma que:

$$x = \{y\} \quad y = \{x\}$$

Entonces, tendríamos:

$$x \ni y \ni x \ni y \ni \dots$$

Pero este axioma no lo permite.

**Axioma de elección (AE).**

Para todo conjunto no vacío  $x$  existe un conjunto  $y$  que tiene un único elemento en común con cada elemento de  $x$ .

**Lema de Zorn.**

Si toda cadena de un conjunto ordenado tiene cota superior, entonces el conjunto tiene un elemento maximal.

**Principio de buena ordenación.**

Todo conjunto no vacío admite un buen orden (un elemento mínimo).

**Hipótesis del continuo (HC).**

Todo subconjunto infinito de  $\mathbb{R}$  es numerable o tiene la misma cardinalidad de que  $\mathbb{R}$ .

(AE) y (HC) no son demostrables con la axiomática de Zermelo-Fraenkel, son independientes entre sí y son consistentes con estos axiomas, así como sus negaciones.



# 3. Introducción a la Teoría Descriptiva de Conjuntos

La Teoría Descriptiva de Conjuntos (TDC a partir de ahora) tiene como un objetivo clasificar enunciados o fórmulas según su complejidad, concepto que luego formalizaremos. Por ejemplo, si consideramos sobre las funciones del intervalo  $[0, 1]$  en  $\mathbb{R}$  la propiedad de “ser continua”:

$$\forall x \in [0, 1] \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \forall x_0 |x - x_0| < \delta \implies |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$$

Como sabemos que toda función continua en  $[0, 1]$  es uniformemente continua y que toda función uniformemente continua es continua, podemos reescribir esta propiedad de una forma “menos compleja”, eliminando en  $\varepsilon$  la dependencia de  $x$

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \forall x_0 |x - x_0| < \delta \implies |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$$

y obteniendo así una fórmula más corta, algo que nos interesará, puesto que intentaremos buscar las fórmulas más cortas (en función de las variables y cuantificadores que aparecen en ellas) que nos definan ciertas propiedades.

## 3.1. Construcción de fórmulas

Sin olvidar que la teoría sobre la que trabajamos (la de Zermelo-Fraenkel) es en particular un lenguaje de primer orden, recordamos que nuestras fórmulas van a estar formadas por, fijado un conjunto  $X$  que contendrá los elementos a los que nos refiramos:

- Términos, referidos a objetos.
- Conectores:  $\neg$ ,  $\wedge$ ,  $\vee$ ,  $\rightarrow$ ,  $\leftrightarrow$ .
- Cuantificadores:  $\forall$ ,  $\exists$ .

De esta forma, una fórmula para nosotros será una composición finita de estos elementos.

Estaremos especialmente interesados en el hecho de que las fórmulas sean composiciones finitas de dichos elementos, así como en estudiar los cuantificadores que aparecen en las fórmulas.

**Ejemplo.** Si consideramos  $X = \mathbb{N}$  y en este contexto consideramos la aplicación “sucesor”  $s : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ , la fórmula:

$$s \leq s(n)$$

Contiene a  $n$  como variable libre, y (en general) podrá ser cierta o falsa en función de las sustituciones de  $n$  realicemos (aunque en este caso hemos considerado una fórmula que ante cualquier sustitución siempre es cierta).

A partir de ahora, lo que nos interesará es dada una fórmula  $P$  en la que hay una variable libre y trabajando sobre un conjunto  $X$ , podremos siempre considerar por el axioma de composición el conjunto formado por aquellos elementos de  $X$  para los cuales la fórmula  $P$  sea cierta:

$$X_P = \{x \in X \mid P(x)\}$$

Sin embargo, el recíproco de esta afirmación (que para cada conjunto siempre podemos encontrar una fórmula que cumplan exclusivamente los elementos del conjunto) no será generalmente cierta. Por ejemplo, si consideramos  $X$  un conjunto finito, como  $\mathcal{P}(X)$  es finito, siempre podremos hacerlo; pero en un caso general con  $X$  cualquier conjunto (posiblemente no numerable), podemos pensar en que la cantidad de fórmulas que podemos construir es un conjunto numerable, por lo que no llegaremos a abarcar todas las posibilidades<sup>1</sup>.

**Ejemplo.** Como primeros ejemplos de conjuntos a destacar, fijado un conjunto  $X$ , consideramos una cantidad numerable de subconjuntos de  $X$ :  $\{X_n\}_{n \in \mathbb{N}}$  con  $X_n \subseteq X$  para todo  $n \in \mathbb{N}$ .

- Si pensamos en la intersección de todos estos conjuntos:

$$\bigcap_{n \in \mathbb{N}} X_n$$

Podemos tratar de buscar una fórmula que defina única y exclusivamente a todos los elementos de este conjunto, como por ejemplo:

$$\forall n(n \in \mathbb{N} \implies x \in X_n)$$

- Si ahora consideramos la unión de todos ellos:

$$\bigcup_{n \in \mathbb{N}} X_n$$

Y tratamos de buscar una fórmula que lo defina, llegamos a:

$$\exists n(n \in \mathbb{N} \wedge x \in X_n)$$

A partir de este primer ejemplo y viendo la relación existente entre los cuantificadores  $\forall$  y  $\exists$  con las operaciones  $\cap$  y  $\cup$ , buscamos ahora cómo podemos expresar ciertas fórmulas sobre algún espacio  $X$  previamente fijado en forma de conjuntos, proceso que ilustraremos con los siguientes ejemplos.

<sup>1</sup>Es mucho más complejo que esto, este argumento no es suficiente para demostrarlo.

**Ejemplo.** En cada caso, consideraremos un conjunto  $X$  distinto.

- En el espacio de las sucesiones de números reales:  $X = \mathbb{R}^{\mathbb{N}} = \{x : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}\}$

Pensamos en la propiedad de que una sucesión sea “casi nula”, que intuitivamente podemos definir como que una sucesión tenga una cantidad infinita de términos nulos. De manera formal, podemos escribir que existe un término a partir del cual todos los términos de la sucesión son cero:

$$\exists n \in \mathbb{N} \forall m \geq n \ x(m) = 0$$

Que podemos escribir de forma más rigurosa como (entendiendo que donde pone  $m \geq n$  deberíamos escribir  $m \geq n \wedge m \in \mathbb{N}$ ):

$$\exists n(n \in \mathbb{N} \wedge \forall m(m \geq n \implies x(m) = 0))$$

Donde observamos que en esta la variable  $x$  aparece libre, por lo que podemos tratar de buscar un conjunto que contenga todos aquellos elementos que cumplan la fórmula para cierto  $x$  y ninguno más, conjunto al que denotaremos por  $C_{00}$ .

Para hayar este conjunto, lo que haremos será en primer lugar considerar los términos que aparecen en la fórmula y en segundo lugar, tratar de relacionarlos con los conectores y cuantificadores que aparecen. Para ello, los términos que aparecen en la fórmula son:

$$n \in \mathbb{N} \quad m \geq n \quad x(m) = 0$$

Y para construir el conjunto que venga definido por la fórmula, lo que haremos será ir poco a poco de dentro hacia afuera, considerando primero el conjunto que cumpla:

$$x(m) = 0$$

De esta forma, fijado  $m$ , definimos:

$$X_m = \{x \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} : x(m) = 0\}$$

Ahora, busquemos el conjunto que venga definido por la fórmula:

$$\forall m(m \geq n \implies x(m) = 0)$$

Que podemos reescribir como:

$$\forall m(m \geq n \implies x \in X_m)$$

Observando el  $\forall$ , podemos pensar en reescribir este conjunto como en una intersección de conjuntos:

$$\bigcap_{m \geq n} X_m$$

Finalmente, la fórmula entera:

$$\exists n(n \in \mathbb{N} \wedge \forall m(m \geq n \implies x(m) = 0))$$

La podemos reescribir como:

$$\exists n \left( n \in \mathbb{N} \wedge x \in \bigcap_{m \geq n} X_m \right)$$

Que podemos expresar ahora como la unión de ciertos conjunto.

$$\bigcup_{n \in \mathbb{N}} \bigcap_{m \geq n} X_m$$

Obteniendo así nuestro conjunto  $C_{00}$ :

$$C_{00} = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \bigcap_{m \geq n} X_m$$

- Sobre el mismo espacio  $X = \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$  podemos ahora considerar la propiedad de “ser convergente a 0”, propiedad definida por:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists m \in \mathbb{N} \forall n \geq m \implies |x(m)| < \varepsilon \quad (3.1)$$

Y que de forma rigurosa puede escribirse como (entendiendo que donde pone  $n \geq m$  deberíamos escribir  $n \geq m \wedge n \in \mathbb{N}$  y que donde pone  $\varepsilon > 0$  deberíamos poner  $\varepsilon \in \mathbb{R}^+$ ):

$$\forall \varepsilon (\varepsilon > 0 \implies \exists m (m \in \mathbb{N} \wedge \forall n (n \geq m \implies |x(m)| < \varepsilon)))$$

Fórmula a partir de la cual podemos extraer un conjunto de igual forma que hicimos anteriormente, identificando que los términos son:

$$\varepsilon > 0 \quad m \in \mathbb{N} \quad n \geq m \quad |x(m)| < \varepsilon$$

Y construyendo la fórmula de dentro hacia afuera. Para ello, en primer lugar, fijados  $m$  y  $\varepsilon$  definimos el conjunto:

$$X_{n,\varepsilon} = \{x \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} : |x(n)| < \varepsilon\}$$

Y posteriormente escribiendo las sucesivas fórmulas como uniones e intersecciones, llegando a:

$$\bigcap_{\varepsilon > 0} \bigcup_{m \in \mathbb{N}} \bigcap_{n \geq m} X_{n,\varepsilon}$$

Sin embargo, hay una diferencia ahora entre la fórmula obtenida anteriormente y esta; resulta que en esta fórmula estamos considerando una intersección no numerable de elementos, al considerar la intersección de todos aquellos elementos de  $\mathbb{R}^+$ , un hecho que nos va a dificultar luego algo en lo que estamos interesados<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup>Que es poder definir una sigma álgebra que contenga uniones e intersecciones numerables de ciertos conjuntos.

A pesar de ello, la solución en este caso es bien sencilla. Resulta que la definición de convergencia a 0 cuya definición escribimos en (3.1) puede caracterizarse en función de una sucesión convergente a cero, pudiendo cambiar la fórmula que describe la propiedad de “ser convergente a cero” por la fórmula:

$$\forall k \in \mathbb{N} \exists m \in \mathbb{N} \forall n \geq m \implies |x(n)| < \frac{1}{k}$$

Si ahora realizamos nuevamente el proceso anterior de reescribir a qué conjunto llegamos, obtenemos ahora sí un conjunto dado por intersecciones y uniones numerables de ciertos conjuntos:

$$\bigcap_{k \in \mathbb{N}} \bigcup_{m \in \mathbb{N}} \bigcap_{n \geq m} X_{n, \frac{1}{k}}$$

- Si ahora consideramos  $X = \{f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : f \text{ continua}\}$  y fijado  $L \in \mathbb{R}^+$ , pensamos en la propiedad de  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$ , definida por:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists M > 0 \forall x > M |f(x) - L| < \varepsilon$$

Se nos plantea el problema anterior de que obtendríamos uniones o intersecciones no numerables de conjuntos. Sin embargo, vemos que es fácil reemplazar  $\varepsilon$  y  $M$  para que esto no suceda, obteniendo una expresión equivalente:

$$\forall k \in \mathbb{N} \exists M \in \mathbb{N} \forall x > M |f(x) - L| < \frac{1}{k}$$

Sin embargo, seguimos teniendo el problema de que  $x \in \mathbb{R}$ , que pensamos en cómo solucionar. Como estamos considerando funciones continuas de  $\mathbb{R}$  en  $\mathbb{R}$  y  $\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$  es denso y numerable, podemos considerar  $x \in \mathbb{Q}$  y reescribir la propiedad de forma equivalente como:

$$\forall k \in \mathbb{N} \exists M \in \mathbb{N} \forall x \in \mathbb{Q}, x > M |f(x) - L| < \frac{1}{k}$$

Así, obtenemos una fórmula:

$$\forall k \left( k \in \mathbb{N} \implies \exists M \left( M \in \mathbb{N} \wedge \forall x \left( x \in \mathbb{Q} \wedge x > M \implies |f(x) - L| < \frac{1}{k} \right) \right) \right)$$

Fijado  $x$  y  $k$ , definimos el conjunto:

$$X_{x,k} = \left\{ f \in C(\mathbb{R}) : |f(x) - L| < \frac{1}{k} \right\}$$

Y la fórmula nos da el conjunto:

$$\bigcap_{k \in \mathbb{N}} \bigcup_{M \in \mathbb{N}} \bigcap_{\substack{x > M \\ x \in \mathbb{Q}}} X_{x,k}$$

- Finalmente, si ahora consideramos el mismo espacio  $X$  y la pensamos en la propiedad de que una función tenga límite en infinito:

$$\forall L \in \mathbb{R} \forall \varepsilon > 0 \exists M > 0 \forall x > M |f(x) - L| < \varepsilon$$

Sabemos que podemos sustituir  $\varepsilon$ ,  $M$  y  $x$  para obtener intersecciones y uniones numerables, pero ¿cómo podemos ahora hacer esto con  $L$ ? Pues bien, podemos usar un resultado bien conocido, y es que  $\mathbb{R}$  es completo, por lo que cualquier sucesión de Cauchy es convergente y viceversa, con lo que podemos reescribir esta fórmula en una equivalente de la forma:

$$\forall k \in \mathbb{N} \exists M \in \mathbb{N} \forall x, y \in \mathbb{Q}, x, y > M |f(x) - f(y)| < \varepsilon$$

Con esta gran cantidad de ejemplos hemos visto cómo podemos obtener conjuntos a partir de fórmulas, así como tratar de buscar siempre una cantidad numerable de intersecciones y uniones, que generalmente obtendremos usando teoremas fundamentales del espacio en el que trabajemos.

En resumen, fijado un conjunto  $X$ , nos interesará dar propiedades mediante fórmulas, a partir de las cuales construir conjuntos mediante intersecciones y uniones (preferiblemente numerables) de conjuntos, las cuales vendrán dadas por los cuantificadores que hemos usado en la fórmula para describir una propiedad específica. De esta forma, dada una cierta propiedad y considerando una cierta topología  $\mathcal{T}$  sobre el espacio  $X$ , los conjuntos que obtengamos podrán ser:

- Abiertos.
- Cerrados.
- Intersecciones numerables de abiertos.
- Uniones arbitrarias de cerrados.
- Uniones numerables de intersecciones numerables de abiertos.
- Intersecciones numerables de uniones numerables de cerrados.
- ...

De esta forma, llegaremos luego a considerar una  $\sigma$ -álgebra de Borel, que será donde podamos trabajar.

Finalmente nos preguntamos si toda fórmula puede reducirse a unos cuantificadores numerables, pregunta cuya respuesta será que no<sup>3</sup>, y esta respuesta nos hará interesarnos por una noción más general de los cardinales de los conjuntos.

---


<sup>3</sup>Se verá un leve razonamiento de por qué.

## 3.2. Conjunto de Cantor

**Definición 3.1** (Conjunto de Cantor). Definimos el conjunto de Cantor como el conjunto de las sucesiones de  $\{0, 1\}$ :

$$2^{\mathbb{N}} = \{f : \mathbb{N} \rightarrow \{0, 1\}\}$$

Las sucesiones de números de  $\{0, 1\}$  podemos entenderlas de forma gráfica como cada una de las elecciones (arriba o abajo) en las bifurcaciones del siguiente dibujo:



**Notación.** Nos interesará también considerar una sucesión finita de elementos de  $\{0, 1\}$ :

$$2^{<\mathbb{N}} = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \{f : \{0, 1, \dots, n\} \rightarrow \{0, 1\}\}$$

Lo que nos interesará será comparar qué tan cercanas están los elementos del conjunto de Cantor entre sí de una forma intuitiva.

**Ejemplo.** Por ejemplo, ante las sucesiones:

$$\begin{aligned} (0, 1, 0, 1, 0, \dots) \\ (0, 1, 1, 0, 0, \dots) \\ (0, 1, 0, 1, 1, \dots) \end{aligned}$$

Nos interesará decir que la tercera sucesión es la que más se parece a la primera. Una analogía es comparar lo que estamos haciendo con los números irracionales, ya que el conjunto de los números irracionales,  $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ , podemos verlo como un entero seguido de una sucesión de naturales del conjunto  $\{0, 1, \dots, 9\}$ :

$$x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}, \quad x = a'n_1n_2n_3 \dots \quad a \in \mathbb{Z}, n_1, n_2, n_3, \dots \in \{0, 1, \dots, 9\}$$

Ante los siguientes números irracionales:

$$\begin{aligned} 3,141529 \dots \\ 3,141578 \dots \\ 3,142386 \dots \end{aligned}$$

Decimos que el segundo es más cercano al primero que el tercero al primero.

**Definición 3.2.** Definimos en el conjunto de Cantor la distancia:  $d : 2^{\mathbb{N}} \times 2^{\mathbb{N}} \rightarrow \mathbb{R}$  dada por:

$$d(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{2^{n+1}} & \text{si } x \neq y, \quad n = \min\{k \in \mathbb{N} \mid x(k) \neq y(k)\} \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

En el conjunto  $2^{<\mathbb{N}}$ , fijado  $s \in 2^{<\mathbb{N}}$  podemos definir el siguiente conjunto de abiertos básicos para  $s$  (siendo  $n$  la longitud de  $s$ ):

$$O_s = \{x \in 2^{\mathbb{N}} \mid x|_{\{0,1,\dots,n\}} = s\} = \left\{x \in 2^{\mathbb{N}} \mid d(s, x) \leq \frac{1}{2^{n+1}}\right\}$$

**Ejercicio 3.2.1.** Demostrar que  $(2^{\mathbb{N}}, d)$  es un espacio completo.

Recordemos que un espacio métrico  $(X, d)$  es completo si toda sucesión de Cauchy es convergente.

**Definición 3.3** (Polaco). Sea  $(X, d)$  un espacio métrico, decimos que es polaco si admite una distancia que lo hace completo e induce un espacio topológico separable.

**Ejemplo.** Un ejemplo de un espacio métrico polaco es el conjunto de los irracionales con la distancia usual de  $\mathbb{R}$  inducida, ya que el espacio métrico que consideramos no es completo (hay sucesiones de irracionales que convergen a racionales), pero con la distancia análoga a la anterior definida sí que es completo.

**Lema 3.1** (de Cantor). *Todo espacio (no numerable) completo<sup>4</sup> separable y sin puntos aislados admite un conjunto homeomorfo al conjunto de Cantor.*

*Demostración.* Sea  $X$  un espacio bajo esas hipótesis, pensamos la demostración como si estuviéramos en  $[0, 1]$ :

1. Cogemos dos puntos suficientemente lejos,  $x_0$  y  $x_1$ , de forma que podamos coger  $\varepsilon_0, \varepsilon_1 \in \mathbb{R}^+$  de forma que<sup>5</sup>:

$$B(x_0, \varepsilon_0) \cap B(x_1, \varepsilon_1) = \emptyset$$

2. Dentro de  $B(x_0, \varepsilon_0)$  volvemos a coger dos puntos en estas condiciones:  $x_{00}$  y  $x_{01}$ , de forma que:

$$B(x_{00}, \varepsilon_{00}) \cap B(x_{01}, \varepsilon_{01}) = \emptyset$$

Repetimos el procedimiento en  $B(x_1, \varepsilon_1)$  y hacemos una inducción.

3. De esta forma, por cada punto de  $2^{\mathbb{N}}$  hemos encontrado una sucesión de bolas abiertas decrecientes. Se verifica que la intersección de todas ellas es un único punto<sup>6</sup>:

$$\bigcap B_x = \{p\} \quad p \in X$$

Hemos conseguido una aplicación  $\Phi : 2^{\mathbb{N}} \rightarrow X$ , entre el conjunto de Cantor y el nuestro.

4. Demostramos que:

- $\Phi$  es inyectiva.
- $2^{\mathbb{N}}$  es compacto.

<sup>4</sup>En realidad, bastaría con ser polaco.

<sup>5</sup>Usar que no hay puntos aislados.

<sup>6</sup>Usar la completitud.

- $\Phi$  es continua<sup>7</sup>.

Con lo que, como  $X$  es Hausdorff, una aplicación continua de un cerrado en Hausdorff es cerrada, con lo que acabamos deduciendo que  $\Phi$  es homeomorfismo sobre su imagen.

□

**Ejercicio 3.2.2.** Formalizar la demostración anterior.

### 3.3. Jerarquía de Borel

Fijado un espacio topológico procedente de una métrica,  $(X, \mathcal{T})$ , definimos:

$$\begin{aligned} \Sigma_0 &= \{U \subseteq X \mid U \text{ abierto}\} & \Sigma_1 &= \left\{ \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \mid \text{cerrado} \right\} \\ \Pi_0 &= \{U \subseteq X \mid U \text{ cerrado}\} & \Pi_1 &= \left\{ \bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n \mid A_n \text{ abierto} \right\} \end{aligned}$$

**Ejercicio 3.3.1.** Sea  $x \in X$  y  $A \subseteq X$ , definimos la distancia entre  $a$  y  $X$  como:

$$d(x, A) = \inf\{d(x, a) \mid a \in A\}$$

Dado  $r > 0$ , se verifica que el conjunto:

$$\{x \in X \mid d(x, A) < r\}$$

es un abierto.

**Proposición 3.2.** *Se verifica que:*

1.  $\Sigma_0 \subseteq \Pi_1$ .
2.  $\Pi_0 \subseteq \Sigma_1$ .
3.  $\Pi_0 \subseteq \Pi_1$ .
4.  $\Sigma_0 \subseteq \Sigma_1$ .

*Demostración.* Vemos las inclusiones:

1. Sea  $A \in \Sigma_0$ :

$$A = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$$

2. Sea  $A \in \Pi_0$ :

$$A = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n$$

---

<sup>7</sup>Usar que es separable.

3. Sea  $C \in \Pi_0$ , veamos que  $C$  puede escribirse como una intersección numerable de abiertos. Para ello, sabemos que:

$$C = \overline{C} = \{x \in X \mid d(x, C) = 0\}$$

Por lo que podemos tomar:

$$C = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \left\{ x \in X \mid d(x, C) < \frac{1}{n} \right\}$$

4. Sea  $C \in \Sigma_0$ , sabemos que  $X \setminus C \in \Pi_0$ , por lo que podemos escribir  $X \setminus C$  como intersección numerable de abiertos:

$$X \setminus C = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n$$

Tomando complementario:

$$C = X \setminus (X \setminus C) = X \setminus \left( \bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n \right) = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} X \setminus A_n$$

Tenemos que  $X \setminus A_n$  es un cerrado,  $\forall n \in \mathbb{N}$ , luego  $C \in \Sigma_1$ .

□

Si seguimos definiendo conjuntos para la jerarquía:

$$\begin{aligned} \Sigma_1 & \quad \Sigma_2 = \left\{ \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \mid A_n \in \Pi_j, j \in \{0, 1\} \right\} \\ \Pi_1 & \quad \Pi_2 = \left\{ \bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n \mid A_n \in \Sigma_j, j \in \{0, 1\} \right\} \end{aligned}$$

Y por inducción, dado  $n \in \mathbb{N}$ , definimos:

$$\begin{aligned} \Sigma_{n-1} & \quad \Sigma_n = \left\{ \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \mid A_n \in \Pi_j, j < n \right\} \\ \Pi_{n-1} & \quad \Pi_n = \left\{ \bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n \mid A_n \in \Sigma_j, j < n \right\} \end{aligned}$$

**Proposición 3.3.** *Se verifica que:*

1.  $\Sigma_j \subseteq \Sigma_n \quad \forall j < n$ .
2.  $\Pi_j \subseteq \Pi_n \quad \forall j < n$ .

**Ejercicio 3.3.2.** Hacer la Proposición anterior.

### 3.3.1. Conjunto de Vitali

Un problema que surgió de forma natural en matemáticas cuando se intentó definir una medida, es decir, una función  $\mu : \cdot \rightarrow \mathbb{R}_0^+$  que verifique unas ciertas propiedades deseables con el fin de obtener una medida del tamaño de cualquier conjunto, propiedades como:

- Que la medida de los intervalos sea la diferencia de los extremos:

$$\mu([a, b]) = b - a$$

- La  $\sigma$ -aditividad de la medida:

$$\mu\left(\bigsqcup_{n \in \mathbb{N}} A_n\right) = \sum_{n=0}^{\infty} \mu(A_n)$$

- La medida es invariante frente a traslaciones:

$$\mu(t(A)) = \mu(A)$$

De estas tres propiedades podía deducirse que si tenemos  $A \subseteq B \subseteq C$ , entonces:

$$\mu(A) \leq \mu(B) \leq \mu(C)$$

Sin embargo, no podemos considerar esta medida sobre todos los conjuntos a considerar, porque tendríamos entonces varias contradicciones en la teoría, tal y como veremos a continuación. Por esta razón, las medidas (como por ejemplo la de Lebesgue, ya estudiada en Análisis Matemático II) se definen sobre ciertos conjuntos restringidos de  $\mathcal{P}(X)$ , no sobre todo este conjunto. En el ejemplo de la medida de Lebesgue, estos conjuntos eran los medibles,  $\mathcal{M}$ . En este caso, los conjuntos borelianos (de la  $\sigma$ -álgebra de Borel) estaban dentro de los medibles.

En teorías matemáticas constructivas se verifica que todos los conjuntos que se consideran son medibles, pero al considerar axiomas o resultados como el Axioma de Elección, empiezan a surgir ejemplos de conjuntos no medibles.

En nuestro caso, la jerarquía definida hasta el momento, el conjunto de todos los  $\Sigma_n$  y  $\Pi_n$  no nos es suficiente. Por ejemplo, la unión de todos los conjuntos  $\Sigma_n$  está dentro del  $\sigma$ -álgebra de Borel, que ni siquiera llega a todos los conjuntos medibles, por lo que queremos extender nuestra jerarquía con el fin de llegar a poder clasificar más tipos de conjuntos.

Lo que haremos en esta sección será dar un ejemplo de un conjunto no medible (es decir, un conjunto que pone en conflicto alguna de las propiedades enunciadas que son buenas para las medidas). Como este conjunto no será medible, en particular no será de Borel, mucho menos puede estar en nuestra jerarquía.

**Definición 3.4** (Conjunto de Vitali). Sea  $V \subseteq \mathbb{R}$ , decimos que  $V$  es un conjunto de Vitali si:

$$V \cap \{x + \mathbb{Q}\} = \{y\} \subseteq \mathbb{R} \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

**Proposición 3.4.** *Todo conjunto de Vitali  $V \subseteq [0, 1]$  verifica:*

1.  $(q + V) \cap (p + V) = \emptyset \quad \forall p, q \in \mathbb{Q}, p \neq q$
2.  $[0, 1] \subseteq \bigcup_{\substack{q \in \mathbb{Q} \\ -1 \leq q \leq 1}} (q + V) \subseteq [-1, 2]$

*Demostración.* Supuesto que tenemos un conjunto de Vitali  $V \subseteq [0, 1]$ , veamos las dos propiedades:

1. Supongamos que tenemos  $p, q \in \mathbb{Q}$  con  $p \neq q$  de forma que:

$$(q + V) \cap (p + V) \neq \emptyset$$

En dicho caso,  $\exists u, v \in V$  de forma que:

$$q + u = p + v$$

En cuyo caso,  $v = u + (q - p)$ , por lo que  $v \neq u$ . Sin embargo, tenemos entonces que:

$$\{u, v\} \subseteq V \cap \{u + \mathbb{Q}\}$$

Por lo que llegamos a una contradicción con que  $V$  era un conjunto de Vitali.

2. Para la primera inclusión, sea  $x \in [0, 1]$ , basta observar que:

$$V \cap (x + \mathbb{Q}) = \{y\} \subseteq \mathbb{R}$$

Para la segunda:

$$\bigcup_{\substack{q \in \mathbb{Q} \\ -1 \leq q \leq 1}} (q + V) \subseteq \bigcup_{\substack{q \in \mathbb{Q} \\ -1 \leq q \leq 1}} (q + [0, 1]) \subseteq [-1, 2]$$

□

Todavía no demostraremos la existencia del mismo, pero supuesta la existencia y vistas estas propiedades, podemos ver por un lado que aplicando la  $\sigma$ -aditividad:

$$\mu \left( \bigcup_{\substack{q \in \mathbb{Q} \\ -1 \leq q \leq 1}} (q + V) \right) = \sum_{\substack{q \in \mathbb{Q} \\ -1 \leq q \leq 1}} \mu(q + V) = \sum_{\substack{q \in \mathbb{Q} \\ -1 \leq q \leq 1}} \mu(V)$$

Pero como esta cantidad ha de ser menor que 3, por estar contenido el conjunto en  $[-1, 2]$ , esta última serie ha de ser finita, luego ha de ser  $\mu(V) = 0$ .

Por otra parte, observamos que:

$$1 = \mu([0, 1]) \leq \mu \left( \bigcup_{\substack{q \in \mathbb{Q} \\ -1 \leq q \leq 1}} (q + V) \right) \leq \mu[-1, 2] = 3$$

Por lo que no puede ser  $\mu(V) = 0$ .

Vemos que supuesta la existencia de este conjunto (algo que no hemos demostrado todavía), llegamos a una contradicción, por lo que este conjunto (en caso de existir), no podrá ser medible, y mucho menos estar en nuestra jerarquía.

*Demostración.* Para probar la existencia de un conjunto de Vitali en  $[0, 1]$ , lo que haremos será definir la siguiente relación de equivalencia:

$$\forall x, y \quad x \sim y \iff \exists q \in \mathbb{Q} : x = q + y$$

Con esta relación de equivalencia, podemos considerar la proyección al cociente:

$$\mathbb{R} \xrightarrow{\pi} \mathbb{R}/\sim$$

Ahora, por el Axioma de Elección, podemos crear una aplicación  $\phi : \mathbb{R}/\sim \rightarrow \mathbb{R}$  que de cada clase de equivalencia nos elija un elemento en  $[0, 1]$ , por lo que componiendo  $\phi \circ \pi$ , obtenemos una aplicación:

$$\mathbb{R} \xrightarrow{\pi} \mathbb{R}/\sim \xrightarrow{\phi} \mathbb{R}$$

Y tomando  $V = (\phi \circ \pi)(\mathbb{R})$ , tenemos un conjunto de Vitali en  $[0, 1]$ . □

### 3.4. Jerarquía generalizada

Con el fin de que cualquier subconjunto que consideremos esté en algún lugar de la jerarquía, tratamos de extender el concepto de los ordinales finitos (los números naturales) a otros ordinales más generosas. Para ello, recordamos cómo se construyeron los números naturales:

$$\begin{aligned} 0 &= \emptyset \\ 1 &= \{\emptyset\} \\ 2 &= \{\emptyset, \{\emptyset\}\} \\ 3 &= \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\} \\ &\vdots \end{aligned}$$

Es decir, a partir del conjunto  $\emptyset$ , cuya existencia suponemos por axioma, y con la aplicación sucesor  $s$ , dada por:

$$s(x) = x \cup \{x\}$$

De esta forma, tenemos que:

$$\begin{aligned} 2 &= 0 \cup 1 \\ 3 &= 0 \cup 1 \cup 2 \\ &\vdots \end{aligned}$$

Y si queremos generalizar estos conceptos para que trasciendan a los naturales, tras todos los números naturales, el siguiente ordinal a considerar será  $\mathbb{N}$ , luego:

$$\mathbb{N} + 1 := \{\mathbb{N}, \{\mathbb{N}\}\} \quad \dots$$

Con esta idea, llegamos a la siguiente definición:

**Definición 3.5** (Ordinal). Un conjunto  $\alpha$  es un ordinal cuando:

1. Es transitivo para  $\in$ :

$$\forall x(x \in \alpha \implies \forall y(y \in x \implies y \in \alpha))$$

2.  $\alpha$  es bien ordenado para  $\in$ .